

code	レジメン名
L010H	R-CHOP
L011H	R-CHOP+MAD
L030H	CHOP
L031H	CHOP+MAD
L040H	R-THP-COP (初回)
L050H	R-THP-COP (2回目以降)
L060S	Ritximab単剤
L090M	アザシチジン療法(静注)
L091M	アザシチジン療法(皮下注)
L092M	アザシチジン療法(静注+皮下注)
L100H	ABVD療法
L110H	COPP療法
L120M	R+BND療法
L130M	Bendamustine単独療法
L140S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(3W)療法(静注)
L141S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(3W)療法(皮下注)
L150S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(5W)療法(静注)
L151S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(5W)療法(皮下注)
L152S	VCD療法
L160H	ESHAP療法
L161H	R-ESHAP療法
L170M	CAG(G:ノイトロジン)療法
L180M	CAG(G:フィルグラスチム)療法
L210S	ネララビン療法
L740L	Brentuximab Vedotin (BV)療法
L750S	モガムリズマブ単独療法
L800M	AI療法
L860S	KLd療法(1サイクル目)
L861S	KLd療法(2-12サイクル目)
L862S	KLd療法(13サイクル目以降)
L870S	E-Ld療法(1,2サイクル目)
L871S	E-Ld療法(3サイクル目以降)
L880M	FCR
L890S	オフアツムマブ 初回
L891S	オフアツムマブ 2~8回目
L892S	オフアツムマブ 9~12回目
L900S	alemtuzumab (3mg)
L901S	alemtuzumab (10mg)
L902S	alemtuzumab (30mg)
L910M	CHASER
L930L	プララトレキサート単独療法
L940S	gemtuzumab ozogamicin
L950M	JLSG-02 Induction A
L951M	JLSG-02 Maintenance A
L952M	JLSG-02 Maintenance C
L970H	G-CHOP (1サイクル目)
L971H	G-CHOP (2サイクル目以降)
L972S	GAZYVA (維持療法)
L980M	G-B (1サイクル目)
L981M	G-B (2サイクル目以降)
L1000H	ドキシソルビシン単剤
L1010H	A+AVD療法
L1020S	Nivolumab単剤 (ホジキンリンパ腫)
L1030S	Pembrolizumab単剤 (ホジキンリンパ腫)

L1040S	D-Ld療法(1サイクル目)
L1041S	D-Ld療法(2サイクル目)
L1042S	D-Ld療法(3-6サイクル目)
L1043S	D-Ld療法(7サイクル目以降)
L1050S	D-Bd療法(1サイクル目)
L1051S	D-Bd療法(2-3サイクル目)
L1052S	D-Bd療法(4-8サイクル目)
L1053S	D-Bd療法(9サイクル目以降)
L1060S	D-VMP療法(1サイクル目)
L1061S	D-VMP療法(2-9サイクル目)
L1062S	D-VMP療法(10サイクル目以降)
L1070M	AraC単剤
L1080S	VLB+PSL(導入)
L1081S	VLB+PSL(維持)
L1090H	CEOP
L1091H	R-CEOP
L1092H	G-CEOP (1サイクル目)
L1093H	G-CEOP (2サイクル目以降)
L1100H	A+CHP
L1120L	ペントスタチン
L1130M	Venetoclax+Azacitidine(静注)
L1131M	Venetoclax+Azacitidine(皮下注)
L1140M	Special C
L1150S	inotuzumab ozogamicin (1サイクル目)
L1151S	inotuzumab ozogamicin (非寛解:2-6サイクル目)
L1152S	inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)
L1170S	Isa-Pd療法 (1コース目)
L1171S	Isa-Pd療法 (2コース目以降)
L1180M	Pola+RB療法(1サイクル目)
L1181M	Pola+RB療法(2-6サイクル目)

レジメン記入フォーマット

登録番号 L010H

診療科
 レジメン名 R-CHOP
 対象疾患名 悪性リンパ腫
 治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²		点滴	2
	オンコピン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴	2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴	2
	プレドニン	100	mg/body		内服	2
	リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴	1
		1mg/mLに調整				

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day(6)	Day()	Day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●							
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ		●						
2	生食	50	mL	点滴静注			●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコピン	1.4	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L011H

診療科
 レジメン名 R-CHOP+MAD
 対象疾患名 悪性リンパ腫
 治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	リツキシマブBS	375	mg/m ²		静注	Day1
	ドキシソルピシン	50	mg/m ²		静注	Day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	静注	Day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		静注	Day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	Day2
	メトレキサート	15	mg		髄腔内	Day2
	シタラビン	40	mg		髄腔内	Day2
	デカドロン	4	mg		髄腔内	Day2

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day(6)	Day()	Day()
0	アタラックSP	25 mg	内服		●							
	カロナール	400 mg	内服		●							
1	リツキシマブBS	375 mg/m ²	側管点滴		●							
	生食	337.5 mL/m ²	側管点滴	25→200mL/hr	●							
1	生食	100 mL	側管点滴	フラッシュ		●						
2	生食	50 mL	点滴静注			●						
	アロキシ	0.75 mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	100 mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4 mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	50 mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500 mL	点滴静注	2時間		●						
6	生食	3 mL				●						
	メトレキサート注5mg	15 mg				●						
	キロサイド注20mg	40 mg				●						
	デカドロン注射液1.65mg	3.3 mg		ゆっくり		●						
	合計	6 mL	髄腔内	2~3分で		●						
	プレドニン	100 mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的

申請医師

備考欄

登録番号

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²		点滴	1
	オンコピン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴	1
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴	1
	プレドニン	100	mg/body		内服	1

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴	フラッシュ	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
4	オンコピン	1.4	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●							
5	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L031H

診療科
 レジメン名 CHOP+MAD
 対象疾患名 悪性リンパ腫
 治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ドキシソルピシン	50	mg/m ²		静注	Day1
	オンコピン	1.4	mg/m ²	2mg	静注	Day1
	エンドキサン	750	mg/m ²		静注	Day1
	プレドニン	100	mg/body		内服	Day1
	メトトレキサート	15	mg		髄腔内	Day1
	シタラビン	40	mg		髄腔内	Day1
	デカドロン	4	mg		髄腔内	Day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
1	生食	50 mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75 mg	点滴静注	15分	●							
2	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	100 mL	点滴静注	30分	●							
3	オンコピン	1.4 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	50 mL	点滴静注	全開	●							
4	エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	500 mL	点滴静注	2時間	●							
5	生食	3 mL			●							
	メトトレキサート注5m	15 mg			●							
	キロサイド注20mg	40 mg			●							
	デカドロン注射液1.65	3.3 mg		ゆっくり	●							
	合計	6 mL	髄腔内	2~3分で	●							
	プレドニン	100 mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L040H

診療科
 レジメン名 R-THP-COP (初回)
 対象疾患名 悪性リンパ腫
 治療目的

申請医師 西澤 昭彦

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ピノルビン	50	mg/m ²		点滴	2
	オンコピン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴	2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴	2
	プレドニン	100	mg/body		内服	2~6
	リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴	1
		1mg/mLに調整				

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day(6)	Day()	Day()
0	ボララミン	2 mg	内服		●							
	ブルフェン	200 mg	内服		●							
1	生食(フラッシュ用)	100 mL	点滴静注	×		●						
2	リツキシマブBS	375 mg/m ²	点滴静注	25mL/hr	●							
	生食	337.5 mL/m ²	点滴静注	50mL/hr	●							
				100mL/hr								
				200mL/hr								
3	生食	50 mL	点滴静注			●						
	アロキシ	0.75 mg	点滴静注			●						
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●						
1	生食(フラッシュ用)	100 mL	点滴静注	フラッシュ		●						
4	ピノルビン	50 mg/m ²	点滴静注			●						
	5%ブドウ糖	100 mL	点滴静注	30分		●						
5	オンコピン	1.4 mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	50 mL	点滴静注	全開		●						
6	エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500 mL	点滴静注	2時間		●						
1	生食(フラッシュ用)	100 mL	点滴静注	フラッシュ		●						
	プレドニン	100 mg/body	内服			●	●	●	●	●		
	アプレピタント	125/80 mg	内服			●125	●80	●80				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L050H

診療科
 レジメン名 R-THP-COP(2回目以降)
 対象疾患名 悪性リンパ腫
 治療目的

申請医師 西澤 昭彦

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ピノルビン	50	mg/m ²		点滴	1
	オンコピン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴	1
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴	1
	プレドニン	100	mg/body		内服	1~5
	リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴	1
		1mg/mLに調整				

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
0	ポラミン	2 mg	内服		●							
	ブルフェン	200 mg	内服		●							
1	生食(フラッシュ用)	100 mL	点滴静注	X	●							
2	生食	50 mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分	●							
1	生食(フラッシュ用)	100 mL	点滴静注	フラッシュ	●							
3	リツキシマブBS	375 mg/m ²	点滴静注	100mL/hr	●							
	生食	337.5 mL/m ²	点滴静注	200mL/hr	●							
1	生食(フラッシュ用)	100 mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	ピノルビン	50 mg/m ²	点滴静注		●							
	5%ブドウ糖	100 mL	点滴静注	30分	●							
5	オンコピン	1.4 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	50 mL	点滴静注	全開	●							
6	エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	500 mL	点滴静注	2時間	●							
1	生食(フラッシュ用)	100 mL	点滴静注	フラッシュ	●							
	プレドニン	100 mg/body	内服		●	●	●	●	●			
	アプレピタント	125/80 mg	内服		●125	●80	●80					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L910M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師	
CHASER		
再発・難治性の悪性リンパ腫		
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	1200	mg/m ²	点滴静注	day3
キロサイド	2	g/m ²	点滴静注	day4-5
ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	day3-5
デカドロン	33	mg/body	点滴静注	day3-5

投与周期 21日
休薬 16日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
						●	●	●	●	●	●	●	●
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	500	mL	点滴静注	6時間	●							
3	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●							
4	ソルデム6	2000	mL	持続点滴			●	●					
	メイロン 7%	80	mL	持続点滴	24時間		●	●					
5	生食	100	mL	点滴静注				●	●	●			
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注				●					
	デカドロン	33	mg	点滴静注	15分			●	●	●			
6	生食	1000	mL	持続点滴	24時間				●	●			
7	生食	500	mL	点滴静注				●					
	エンドキサン	1200	mg/m ²	点滴静注	3時間			●					
8	生食	250	mL	点滴静注				●	●	●			
	ラステット	100	mg/m ²	点滴静注	1時間			●	●	●			
9	生食	500	mL	点滴静注					●	●			
	キロサイド	2	g/m ²	点滴静注	3時間				●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L970H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 G-CHOP (1サイクル目)

対象疾患名 CD20陽性濾胞性リンパ腫

治療目的

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1,8,15
	ドキシソルピシン	50	mg/m ²		点滴静注	day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6

投与周期 21日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3-6)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●		●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注		●			●	●			
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●			●	●			
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●			●	●			
3	アタラックスP	25	mg	内服		●			●	●			
	カロナール	400	mg	内服		●			●	●			
4	生食	210	mL	点滴静注		●			●	●			
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●			●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注			●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキシソルピシン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L971H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 G-CHOP (2サイクル目以降)

対象疾患名 CD20陽性濾胞性リンパ腫

治療目的

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1
	ドキシソルピシン	50	mg/m ²		点滴静注	day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6

投与周期 21日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3-6)	Day()				
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
3	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
4	生食	210	mL	点滴静注		●							
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→100mL/hr	●							
2	生食	50	mL	点滴静注			●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキシソルピシン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 G-B (1サイクル目)
 対象疾患名 CD20陽性濾胞性リンパ腫
 治療目的

申請医師

備考欄

登録番号

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	day1,8,15
トリアキシン	90	mg/m ²	点滴静注	day2,3

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	フラッシュ	●	●	●	●	●			
2	生食	50 mL	点滴静注		●			●	●			
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注	15分	●			●	●			
3	生食	100 mL	点滴静注	1時間	●			●	●			
3	アタラックスP	25 mg	内服		●			●	●			
	カロナール	400 mg	内服		●			●	●			
4	生食	210 mL	点滴静注		●			●	●			
	ガザイバ	1000 mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●			●	●			
2	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	アロキシン	1 V	点滴静注			●						
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●					
3	生食	250 mL	点滴静注			●	●					
	トリアキシン	90 mg/m ²	点滴静注			●	●					
	注射用水	36 mL/m ²	点滴静注	1時間		●	●					

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 G-B (2サイクル目以降)
 対象疾患名 CD20陽性濾胞性リンパ腫
 治療目的

申請医師

備考欄

登録番号

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	day1,8,15
トリアキシン	90	mg/m ²	点滴静注	day2,3

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()				
1	生食	100 mL	点滴静注	フラッシュ	●	●	●					
2	生食	50 mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8 mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100 mL	点滴静注	1時間	●							
3	アタラックスP	25 mg	内服		●							
	カロナール	400 mg	内服		●							
4	生食	210 mL	点滴静注		●							
	ガザイバ	1000 mg	点滴静注	25→100mL/hr	●							
2	生食	50 mL	点滴静注			●	●					
	アロキシン	1 V	点滴静注			●						
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●	●					
3	生食	250 mL	点滴静注			●	●					
	トリアキシン	90 mg/m ²	点滴静注			●	●					
	注射用水	36 mL/m ²	点滴静注	1時間		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1010H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

A+AVD療法	
ホジキンリンパ腫	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
アドセトリス	1.2	mg/kg		静注	Day1、15
ドキシソルピシン	25	mg/m ²		静注	Day1、15
エクザール	6	mg/m ²	10mg	静注	Day1、15
ダカルバジン	375	mg/m ²		静注	Day1、15

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(15)	Day()					
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	アロキシ	1	V	点滴静注		●	●						
	デカドロン注6.6mg	1	V	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	ドキシソルピシン	25	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●						
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	エクザール	6	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ダカルバジン	375	mg/m ²	点滴静注	15分	●	●						
6	生食	50	mL	点滴静注	 	●	●						
7	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	注射用水	0.24	mL/kg	点滴静注		●	●						
	アドセトリス	1.2	mg/kg	点滴静注	30分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1061S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

		申請医師			
D-VMP療法(2-9サイクル目)					
多発性骨髄腫					
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行					

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,22
ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,8,22,29
アルケラン	9	mg/m ²	内服	day1-4
プレドニン	60	mg/m ²	内服	day2-4

投与周期	42日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(8)	Day(22)	Day(29)	Day()	Day()	Day()
						●	●	●	●	●	●	●	●	●
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●				●				
	カロナール	600	mg/body	内服		●				●				
	レナデックス	20	mg/body	内服		●				●				
	(ダラザレックス投与1時間前までに)													
1	生食	100	mL	点滴静注	100→200mL/h	●				●				
2	生食	500	mL	点滴静注		●				●				
	ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	100→200mL/h	●				●				
3	ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注		●			●	●	●			
	生食	0.52	mL/m ²	皮下注		●			●	●	●			
	アルケラン	9	mg/m ²	内服		●	●	●						
	プレドニン	60	mg/m ²	内服			●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1090H

診療科
 レジメン名 GEOP
 対象疾患名 非ホジキンリンパ腫
 治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	Day1
	オンコピン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	Day1
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	Day1
	プレドニン	100	mg/body		内服	Day1-5
	ラステット	100	mg/m ²		内服	Day2-3

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	500	mL	点滴静注		●							
	ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	オンコピン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開	●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
	ラステットCap	100	mg/m ²	内服			●	●					
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1091H

診療科
 レジメン名 R-GEOP
 対象疾患名 非ホジキンリンパ腫
 治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	Day2
	オンコピン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	Day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	Day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	Day2-6
	リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴静注	Day1
		1mg/mLに調整				
	ラステット	100	mg/m ²		内服	Day3-4

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day(6)	Day()	Day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●							
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ		●						
2	生食	50	mL	点滴静注			●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	生食	500	mL	点滴静注			●						
	ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●						
	オンコピン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開		●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
	ラステットCap	100	mg/m ²	内服				●	●				
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 G-CEOP (1サイクル目)
 対象疾患名 非ホジキンリンパ腫
 治療目的

申請医師

備考欄

登録番号

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1,8,15
	ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	day2
	オンコピン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
	ラステット	100	mg/m ²		内服	day3-4

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(8)	day(15)
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●					●	●
2	生食	50	mL	点滴静注		●						●	●
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●						●	●
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●						●	●
3	アタラックスP	25	mg	内服		●						●	●
	カロナール	400	mg	内服		●						●	●
4	生食	210	mL	点滴静注		●						●	●
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●						●	●
2	生食	50	mL	点滴静注			●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	生食	500	mL	点滴静注			●						
	ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●						
	オンコピン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開		●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
	ラステットCap	100	mg/m ²	内服				●	●				
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1093H

診療科
 レジメン名 G-CEOP (2サイクル目以降)
 対象疾患名 非ホジキンリンパ腫
 治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1
	ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	day2
	オンコピン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
	ラステット	100	mg/m ²		内服	day3-4

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
3	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
4	生食	210	mL	点滴静注		●							
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→100mL/hr	●							
2	生食	50	mL	点滴静注			●						
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	生食	500	mL	点滴静注			●						
	ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●						
	オンコピン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開		●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
	ラステットCap	100	mg/m ²	内服				●	●				
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1100H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師 	
レジメン名	A+CHP	
対象疾患名	未治療のCD30陽性末梢性T細胞リンパ腫	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴静注	Day1
ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注	Day1
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	Day1
プレドニン	100	mg/body	内服	Day1-5

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	1	V	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.36	mL/kg	点滴静注		●							
	アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注	30分	●							
7	生食	500	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

