

code	レジメン名
L010H	R-CHOP
L011H	R-CHOP+MAD
L030H	CHOP
L031H	CHOP+MAD
L040H	R-THP-COP (初回)
L050H	R-THP-COP (2回目以降)
L060S	Ritximab単剤
L090M	アザンチジン療法 (静注)
L091M	アザンチジン療法 (皮下注)
L092M	アザンチジン療法 (静注+皮下注)
L100H	ABVD療法
L110H	COPP療法
L120M	R+BND療法
L130M	Bendamustine単独療法
L140S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(3W)療法 (静注)
L141S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(3W)療法 (皮下注)
L150S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(5W)療法 (静注)
L151S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(5W)療法 (皮下注)
L152S	VCD療法
L160H	ESHAP療法
L161H	R-ESHAP療法
L170M	CAG (G:ノイトロジン)療法
L180M	CAG (G:フィルグラスチム)療法
L210S	ネララビン療法
L740L	Brentuximab Vedotin (BV)療法
L750S	モガムリズマブ単独療法
L800M	AI療法
L860S	KLd療法(1サイクル目)
L861S	KLd療法(2-12サイクル目)
L862S	KLd療法(13サイクル目以降)
L870S	E-Ld療法(1,2サイクル目)
L871S	E-Ld療法(3サイクル目以降)
L880M	FCR
L890S	オフアツムマブ 初回
L891S	オフアツムマブ 2~8回目
L892S	オフアツムマブ 9~12回目
L900S	alemtuzumab (3mg)
L901S	alemtuzumab (10mg)
L902S	alemtuzumab (30mg)
L910M	CHASER
L930L	ブララトレキサート単独療法
L940S	gemtuzumab ozogamicin
L950M	JLSG-02 Induction A
L951M	JLSG-02 Maintenance A
L952M	JLSG-02 Maintenance C
L970H	G-CHOP (1サイクル目)
L971H	G-CHOP (2サイクル目以降)
L972S	GAZYVA (維持療法)
L980M	G-B (1サイクル目)
L981M	G-B (2サイクル目以降)
L1000M	ドキソルビシン単剤
L1010H	A+AVD療法
L1020S	Nivolumab単剤 (ホジキンリンパ腫)(2W)
L1030S	Pembrolizumab単剤 (ホジキンリンパ腫)(3W)
L1040S	D-Ld療法(1サイクル目)
L1041S	D-Ld療法(2サイクル目)
L1042S	D-Ld療法(3-6サイクル目)
L1043S	D-Ld療法(7サイクル目以降)
L1050S	D-Bd療法(1サイクル目)
L1051S	D-Bd療法(2-3サイクル目)
L1052S	D-Bd療法(4-8サイクル目)
L1053S	D-Bd療法(9サイクル目以降)

code	レジメン名
L1060S	D-VMP療法(1サイクル目)
L1061S	D-VMP療法(2-9サイクル目)
L1062S	D-VMP療法(10サイクル目以降)
L1070M	AraC単剤
L1080S	VLB+PSL (導入)
L1081S	VLB+PSL (維持)
L1090H	CEOP
L1091H	R-CEOP
L1092H	G-CEOP (1サイクル目)
L1093H	G-CEOP (2サイクル目以降)
L1100H	A+CHP
L1130M	Venetoclax+Azacitidine (静注)
L1131M	Venetoclax+Azacitidine (皮下注)
L1140M	Special C
L1150S	inotuzumab ozogamicin (1サイクル目)
L1151S	inotuzumab ozogamicin (非寛解:2-6サイクル目)
L1152S	inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)
L1170S	Isa-Pd療法 (1コース目)
L1171S	Isa-Pd療法 (2コース目以降)
L1180M	Pola+RB療法(1サイクル目)
L1181M	Pola+RB療法(2-6サイクル目)
L1190S	DKd療法(1サイクル目)
L1191S	DKd療法(2サイクル目)
L1192S	DKd療法(3-6サイクル目)
L1193S	DKd療法(7サイクル目以降)
L1470H	Pola+R-CHP (1-6コース目)2日投与
L1471H	Pola+R-CHP (2-6コース)1日投与
L1472S	Pola+R-CHP (7-8コース目)
L1480S	Venetoclax+LDAC (静注)
L1481S	Venetoclax+LDAC (皮下注)
L1550S	Isa-Kd療法(1サイクル目)
L1551S	Isa-Kd療法(2サイクル目以降)
L1580S	BLd
L1590S	Elranatamab (C1)
L1591S	Elranatamab (C2-6)
L1592S	Elranatamab (C7-)
L1600S	Epcoritamab (C1)
L1601S	Epcoritamab (C2-3)
L1602S	Epcoritamab (C4-9)
L1603S	Epcoritamab (C10-)
L1630M	DCyBorD療法(1-2サイクル目)エンドキサン点滴
L1631M	DCyBorD療法(3-6サイクル目)エンドキサン点滴
L1632S	DCyBorD療法(7サイクル目以降)
L1633M	DCyBorD療法(1-2サイクル目)エンドキサン内服
L1634M	DCyBorD療法(3-6サイクル目)エンドキサン内服
L1640L	Eribulin単剤
L1650S	Mosunetuzumab(C1)
L1651S	Mosunetuzumab(C2)
L1652S	Mosunetuzumab(C3以降)
L1660S	weekly Kd療法(C1)
L1661S	weekly Kd療法 (C2-9)
L1662S	weekly Kd療法(C10以降)
L1670M	Ivosidenib + Azacitidine (静注)
L1680S	Venetoclax + Ritximab (C1)
L1681S	Venetoclax + Ritximab (C2-6)

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	登録番号	L010H
レジメン名	R-CHOP					
対象疾患名	悪性リンパ腫					
治療目的						

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²		点滴	day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
	リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴	day1
		1mg/mLに調整				

投与周期	21日	休薬	
------	-----	----	--

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●							
1	生食	100	mL	×	フラッシュ		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L011H

診療科		
レジメン名	R-CHOP+MAD	
対象疾患名	悪性リンパ腫	
治療目的		

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	リツキシマブBS	375	mg/m ²		静注	day1
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²		静注	day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	静注	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		静注	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
	メトトレキサート	15	mg		髄腔内	day2
	シタラビン	40	mg		髄腔内	day2
	デカドロン	4	mg		髄腔内	day2

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	リツキシマブBS	375	mg/m ²	側管点滴		●							
	生食	337.5	mL/m ²	側管点滴	25→200mL/hr	●							
1	生食	100	mL		フラッシュ		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
6	生食	3	mL				●						
	メソトレキセート注5mg	15	mg				●						
	キロサイド注20mg	40	mg				●						
	デカドロン注射液1.65mg	3.3	mg		ゆっくり		●						
	合計	6	mL	髄腔内	2～3分で		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L030H

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	CHOP			
対象疾患名	悪性リンパ腫			
治療目的				

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²		点滴	day1
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴	day1
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴	day1
	プレドニン	100	mg/body		内服	day1-5

投与周期 21日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
1	生食	100	mL	点滴	フラッシュ	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
4	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●							
5	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

登録番号

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ドキソルビシン	50	mg/m ²		静注	day1
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	静注	day1
	エンドキサン	750	mg/m ²		静注	day1
	プレドニン	100	mg/body		内服	day1
	メトレキサート	15	mg		髄腔内	day1
	シタラビン	40	mg		髄腔内	day1
	デカドロン	4	mg		髄腔内	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
2	ドキソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
3	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●							
4	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
5	生食	3	mL			●							
	メトレキサート注5m	15	mg			●							
	キロサイド注20mg	40	mg			●							
	デカドロン注射液1.65	3.3	mg		ゆっくり	●							
	合計	6	mL	髄腔内	2～3分で	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

R-THP-COP(初回)

悪性リンパ腫

申請医師

備考欄

登録番号 L040H

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ピノルビン	50	mg/m ²		点滴	day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
	リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴	day1
		1mg/mLに調整				

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
0	ポララミン	2	mg	内服		●							
	ブルフェン	200	mg	内服		●							
1	生食(フラッシュ用)	100	mL	点滴静注	×		●						
2	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25mL/hr	●							
	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注	50mL/hr	●							
					100mL/hr								
					200mL/hr								
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●						
1	生食(フラッシュ用)	100	mL	点滴静注	フラッシュ		●						
4	ピノルビン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
	5%ブドウ糖	100	mL	点滴静注	30分		●						
5	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
6	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
1	生食(フラッシュ用)	100	mL	点滴静注	フラッシュ		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		
	アブレビタント	125/80	mg	内服		●125	●80	●80					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L050H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ピノルビン	50	mg/m ²		点滴	day1
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴	day1
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴	day1
	プレドニン	100	mg/body		内服	day1-5
	リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴	day1
		1mg/mLに調整				

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
0	ポラミン	2	mg	内服		●							
	ブルフェン	200	mg	内服		●							
1	生食(フラッシュ用)	100	mL	点滴静注	×	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
1	生食(フラッシュ用)	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
3	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	100mL/hr	●							
	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注	200mL/hr	●							
1	生食(フラッシュ用)	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	ピノルビン	50	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%ブドウ糖	100	mL	点滴静注	30分	●							
5	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●							
6	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
1	生食(フラッシュ用)	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80	●80					

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L060S**

診療科	
-----	--

申請醫師

備考欄

レジメン名	Ritximab単剤
-------	------------

対象疾患名	B細胞性リンパ腫
-------	----------

治療目的

治療内容

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

リツキシマブBS	375 mg/m ²	点滴	day1
----------	-----------------------	----	------

	1mg/mLに調整		
--	-----------	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 7日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L090M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

アザシチジン療法(静注)

骨髓異形成症候群(MDS)

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

アザシチジン

75

5 mg/m²

静注

day1-7

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L091M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

アザシチジン療法（皮下注）

骨髓異形成症候群(MDS)

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

アザシチジン

75

 mg/m^2

皮下注

day1-7

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L092M

申請醫師

備考欄

アザシチジン療法(静注+皮下注)

骨髓異形成症候群(MDS)

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

アザシチジン

75

5 mg/m²

静注

day1-5

アザシチジン

75

5	mg/m ²
---	-------------------

皮下	
----	--

day6-7

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L100H**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキシソルビシン	25	mg/m ²		静注	day1、15
エクザール	6	mg/m ²	10mg	静注	day1、15
ブレオ	10	mg/m ²	15mg	静注	day1、15
ダカルバジン	375	mg/m ²		静注	day1、15

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L110H**

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

COPP療法
ホジキンリンパ腫

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オンコビン	1.4	mg/m ²	静注	day1、8
エンドキサン	650	mg/m ²	静注	day1、8
プロカルバジン	100	mg/m ²	内服	day1～14
プレドニン	40	mg/m ²	内服	day1～14

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L120M

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

R+BND療法

対象疾患名

低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫

治療目的

治療内容

薬品名	標準投与	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	静注	day1
ベンダムスチン	90	mg/m ²	静注	day2、3

投与周期 **28日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L130M

[illegible]

申請醫師

備考欄

Bendamustine单独療法

低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ベンダムスチン

120

mg/m ²

静注

day1、2

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L140S**

申請医師

ボルテゾミブ/デキサメタゾン(3W)療法(静注)

多発性骨髄腫

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	静注	day1、4、8、11
レナデックス	20	mg/body	内服	day1、2、4、5、8、9、11、12

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L141S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術、石膏固定
婦人科	月経不調	月経不調	月経の調整	ホルモン療法
産科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	痔瘻	痔瘻	痔瘻の手術	手術
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	皮膚がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	小児がんの治療	手術、化学療法
内科	心臓病	心臓病	心臓病の治療	内服薬
外科	脳卒中	脳卒中	脳卒中の治療	手術、リハビリテーション
婦人科	子宮がん	子宮がん	子宮がんの切除	手術
産科	産後うつ	産後うつ	産後うつの治療	心理療法
小児科	小児がん	小児がん	小児がんの治療	手術、化学療法
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術、石膏固定
婦人科	月経不調	月経不調	月経の調整	ホルモン療法
産科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	痔瘻	痔瘻	痔瘻の手術	手術
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	皮膚がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	小児がんの治療	手術、化学療法
内科	心臓病	心臓病	心臓病の治療	内服薬
外科	脳卒中	脳卒中	脳卒中の治療	手術、リハビリテーション
婦人科	子宮がん	子宮がん	子宮がんの切除	手術
産科	産後うつ	産後うつ	産後うつの治療	心理療法

申請医師

備考欄

ボルテゾミブ/デキサメタゾン(3W)療法(皮下注)
多発性骨髄腫

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	day1、4、8、11
レナデックス	20	mg/body	内服	day1、2、4、5、8、9、11、12

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L142S

[illegible]

申請医師

備考欄

ボルテゾミブ(3W)療法(皮下注)

マントル細胞リンパ腫

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ベルケイド

1.3

mg/m ²

皮下注

day1、4、8、11

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L150S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

ボルテゾミブ/デキサメタゾン(5W)療法(静注)
多発性骨髄腫

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	静注	day1、8、15、22
レナデックス	20	mg/body	内服	day1、2、8、9、15、16、22、23

投与周期 35日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L151S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

ボルテゾミブ/デキサメタゾン(5W)療法(皮下注)

多発性骨髄腫

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	day1、8、15、22
レナデックス	20	mg/body	内服	day1、2、8、9、15、16、22、23

投与周期 35日

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L152S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

VCD療法
多発性骨髄腫

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	day1、8、15、22
エンドキサン			内服	
デカドロン	40	mg/body	内服	day1-4、9-12、17-20

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L160H**

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与	単位	投与経路	投与日
ラステット	40	mg/m ²	静注	day1、2、3、4
シスプラチン	25	mg/m ²	静注	day1、2、3、4
キロサイド	2000	mg/m ²	静注	day5
ソル・メドロール	250	mg/body	静注	day1、2、3、4、5

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L161H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の改善	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の改善	ホルモン療法
産科	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	症状の改善	降圧薬、安静
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	症状の改善	透析療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	症状の改善	薬物療法
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の改善	薬物療法
眼科	糖尿病性網膜病変	糖尿病性網膜病変	症状の改善	レーザー療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の改善	抗生薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、抗生薬
内科	高血圧症	高血圧症	症状の改善	降圧薬
外科	胆石症	胆石症	症状の改善	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	症状の改善	手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の改善	安静
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	症状の改善	透析療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	症状の改善	薬物療法
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の改善	薬物療法
眼科	糖尿病性網膜病変	糖尿病性網膜病変	症状の改善	レーザー療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の改善	抗生薬

申請医師

備考欄

R-ESHAP療法	
再発性非ホジキンリンパ腫	

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	静注	day1
ラステット	40	mg/m ²	静注	day2、3、4、5
シスプラチン	25	mg/m ²	静注	day2、3、4、5
キロサイド	2000	mg/m ²	静注	day6
ソル・メドロール	250	mg/body	静注	day2、3、4、5、6

投与周期	21日
------	-----

休薬

[illegible]

登録番号 L170M

[illegible]

登録番号 L180M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	食事療法、運動療法、内服薬
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術療法、固定材
婦人科	月経不調	月経不調	月経の調整	ホルモン療法、内服薬
産科	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	血圧のコントロール	内服薬、安静臥床
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、内服薬
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクトレンズ
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の抑制	点眼薬、内服薬
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	食事療法、運動療法、内服薬
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術療法、固定材
婦人科	月経不調	月経不調	月経の調整	ホルモン療法、内服薬
産科	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	血圧のコントロール	内服薬、安静臥床
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、内服薬
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクトレンズ
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の抑制	点眼薬、内服薬

申請医師

備考欄

CAG(G:グラン)療法	
骨髄異型成症候群(MDS)	

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キロサイド	20	mg/m ²	静注	day1～14
アクラシノン	14	mg/m ²	静注	day1～4
フィルグラスチム	200	μg/m ²	静注	day1～14

投与周期 17日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L210S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

ネララビン療法
難治再発性T細胞リンパ腫

[illegible]

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L740L**

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Brentuximab Vedotin (BV)療法	
----------------------------	--

CD30陽性ホジキンリンパ腫、未分化大細胞リンパ腫

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

アドセトリス	1.8 mg/kg	点滴静注	day1
--------	-----------	------	------

投与周期 **21日**

休薬

21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L750S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

モガムリズマブ単独療法
CCR4陽性T細胞リンパ腫

[illegible]

投与周期	56日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

AI療法
軟部肉腫

申請医師

備考欄

登録番号 L800M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキソルビシン	30	mg/m ²	点滴静注	day1-2
イホマイド	2	g/m ²	点滴静注	day1-5

投与周期 21日
休薬

Rp	投与予定時間	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
1	10:15～10:30	生食	100	mL	点滴静注			●						
		パロノセトロンパ	0.75	mg	点滴静注		●							
		デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●	●						
2	10:30～12:30	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
		ドキソルビシン	30	mg/m ²	点滴静注	2時間	●	●						
3	12:30～16:30	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
		イホマイド	2	g/m ²	点滴静注	4時間	●	●	●	●	●			
4	12:30～13:00	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
		ウロミテキサン	800	mg	点滴静注	30分	●	●	●	●	●			
5	16:30～17:00	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
		ウロミテキサン	800	mg	点滴静注	30分	●	●	●	●	●			
5	20:30～21:00	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
		ウロミテキサン	800	mg	点滴静注	30分	●	●	●	●	●			

投与開始日
服薬指導

有口 無口

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

KLd療法(1サイクル目)
再発・難治性多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 L860S

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	day1,2
カイプロリス	27	mg/m ²	点滴静注	day8,9,15,16
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

投与周期
休薬

28日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(21)	day(22)
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●		
2	生食	50	mL	点滴静注			●		●		●		
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分		●		●		●		
3	5% 糖液	50	mL	点滴静注		●	●						
	注射用水	10	mL/m ²	点滴静注		●	●						
	カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	10分	●	●						
3	5% 糖液	50	mL	点滴静注				●	●	●	●		
	注射用水	13.5	mL/m ²	点滴静注				●	●	●	●		
	カイプロリス	27	mg/m ²	点滴静注	10分			●	●	●	●		
4	レナデックス	40	mg/body	内服		●		●		●			●
5	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科 レジメン名 対象疾患名 治療目的 治療内容	KLD療法(2-12サイクル目) 再発・難治性多発性骨髄腫 ☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	申請医師	備考欄	登録番号 L861S
---------------------------------------	---	------	-----	------------

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日	
カイプロリス	27	mg/m ²	点滴静注	day1,2,8,9,15,16	
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21	
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22	

投与周期 28日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(21)	day(22)
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●		
2	生食	50	mL	点滴静注			●		●		●		
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分		●		●		●		
3	5% 糖液	50	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●		
	注射用水	13.5	mL/m ²	点滴静注		●	●	●	●	●	●		
	カイプロリス	27	mg/m ²	点滴静注	10分	●	●	●	●	●	●		
4	レナデックス	40	mg/body	内服		●		●		●			●
5	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →							

投与開始日 服薬指導 ☐ 有 ☐ 無	化学療法委員会承認月日 	登録年月日 削除年月日
---	---	----------------

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師
KLd療法(13サイクル目以降)
再発・難治性多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	27	mg/m ²	点滴静注	day1,2,15,16
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

備考欄

登録番号 L862S

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(15)	day(16)	day(21)	day(22)	day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●		●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注			●			●			
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分		●			●			
3	5% 糖液	50	mL	点滴静注		●	●		●	●			
	注射用水	13.5	mL/m ²	点滴静注		●	●		●	●			
	カイプロリス	27	mg/m ²	点滴静注	10分	●	●		●	●			
4	レナデックス	40	mg/body	内服		●		●	●			●	
5	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →							

投与開始日
服薬指導 有 ☐ 無 ☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 L870S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

E-Ld療法(1.2サイクル目)

再発・難治性多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

エムプリシティ	10 mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
---------	----------	------	--------------

レブラミド	25 mg/body	内服	day1-21
-------	------------	----	---------

デカドロン	6.6 mg/body	点滴静注	day1,8,15,22
-------	-------------	------	--------------

レナデックス	28 mg/body	内服	day1,8,15,22
--------	------------	----	--------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day()	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●	●		●			
	カロナール	400	mg	内服		●	●	●		●			
1	レナデックス	28	mg/body	内服		●	●	●		●			
	(エムブリシティ投与3-24時間前まで)												
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●			
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●		●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●		●			
	(エムブリシティ投与45分前まで)												
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●			
5	生食	230	mL	点滴静注	0.5ml/分	●	●	●		●			
	注射用水	0.4	mL/m ²	点滴静注	1ml/分	●	●	●		●			
	エムブリシティ	10	mg/kg	点滴静注	2ml/分	●	●	●		●			
6	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L871S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

E-Ld療法(3サイクル目以降)

再発・難治性多発性骨髄腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

エムブリシディ	10 mg/kg	点滴静注	day1,15
レブラミド	25 mg/body	内服	day1-21
デキサート	8 mg/body	点滴静注	day1,15
レナデックス	28 mg/body	内服	day1,15
レナデックス	40 mg/body	内服	day8,22

投与周期
休薬

28日

休藥

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day()	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●		●					
	カロナール	400	mg	内服		●		●					
1	レナデックス	28	mg/body	内服		●		●					
	(エムプリシティ投与3-24時間前まで)												
1	レナデックス	40	mg/body	内服			●			●			
	(エムプリシティ投与3-24時間前まで)												
2	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●					
	(エムプリシティ投与45分前まで)												
4	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
5	生食	230	mL	点滴静注		●		●					
	注射用水	0.4	mL/m ²	点滴静注		●		●					
	エムプリシティ	10	mg/kg	点滴静注	2ml/分	●		●					
6	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →							

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L880M**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
フルダラ	25	mg/m ²	点滴静注	day2-4
エンドキサン	250	mg/m ²	点滴静注	day2-4

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L890S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

オフアツムマブ 初回

再発または難治性のCD20陽性の慢性リンパ性白血病

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

アーゼラ

300

mg/body

点滴静注

day1

[illegible]

mg, day	
---------	--

来源/用途	
-------	--

day:	
------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 7日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L892S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	保湿剤、ステロイド外用薬

申請医師

備考欄

オフアツムマブ 9~12回目

再発または難治性のCD20陽性の慢性リンパ性白血病

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

アーゼラ

2000

0	mg/body
---	---------

点滴静注

day1

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L900S**

診療科		申請
レジメン名	alemtuzumab (3mg)	
対象疾患名	再発・難治性CLL	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	
治療内容		

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期	7日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L901S**

診療科		申請
レジメン名	alemtuzumab (10mg)	
対象疾患名	再発・難治性CLL	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	
治療内容		

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期	7日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L902S**

診療科		申請
レジメン名	alemtuzumab (30mg)	
対象疾患名	再発・難治性CLL	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	
治療内容		

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期	7日
休薬	2日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L910M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CHASER
再発・難治性の悪性リンパ腫
□術前 □術後補助 ■再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	1200	mg/m ²	点滴静注	day3
キロサイド	2	g/m ²	点滴静注	day4-5
ラストット	100	mg/m ²	点滴静注	day3-5
デカドロン	33	mg/body	点滴静注	day3-5

投与周期 21日
休薬 16日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●						
	カロナール	400	mg	内服		●						
1	生食	500	mL	点滴静注	6時間	●						
3	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●						
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●						
4	ソルデム6	2000	mL	持続点滴			●	●				
	メイロン 7%	80	mL	持続点滴	24時間		●	●				
5	生食	50	mL	点滴静注					●	●		
	パロノセトロンパッチ	0.75	mg	点滴静注				●				
	デカドロン	33	mg	点滴静注	15分			●	●	●		
6	生食	1000	mL	持続点滴	24時間				●	●		
7	生食	500	mL	点滴静注				●				
	エンドキサン	1200	mg/m ²	点滴静注	3時間			●				
8	生食	250	mL	点滴静注				●	●	●		
	ラストット	100	mg/m ²	点滴静注	1時間			●	●	●		
9	生食	500	mL	点滴静注					●	●		
	キロサイド	2	g/m ²	点滴静注	3時間				●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L930L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

**プラトレキサート単独療法
再発・難治性末梢性T細胞リンパ腫**

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ジフォルタ	30	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36

投与周期	49日
休薬	14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L940S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術、石膏固定
産婦人科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診、栄養指導
泌尿器科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、透析
神経科	脳卒中	脳卒中	神経機能の回復	薬物療法、リハビリテーション
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクトレンズ
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の抑制	点眼薬、点耳薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	アレルギー	アレルギー	アレルギー症状の抑制	抗アレルギー薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	産後	産後	産後のケア	母乳育児指導、産後ケア
泌尿器科	腎臓がん	腎臓がん	がんの切除	手術
神経科	脳神経痛	脳神経痛	疼痛の抑制	薬物療法
眼科	緑内障	緑内障	眼圧のコントロール	点眼薬
耳鼻科	耳鳴り	耳鳴り	耳鳴りの抑制	薬物療法
皮膚科	皮膚炎	皮膚炎	炎症の抑制	外用薬
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術
内科	心臓病	心臓病	心機能の維持	薬物療法
外科	胆石	胆石	胆石の切除	手術
産婦人科	産前	産前	産前のケア	定期的な検診
泌尿器科	膀胱がん	膀胱がん	がんの切除	手術
神経科	脳腫瘍	脳腫瘍	腫瘍の切除	手術
眼科	白内障	白内障	白内障の切除	手術
耳鼻科	鼻炎	鼻炎	炎症の抑制	点鼻薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術
内科	心臓病	心臓病	心機能の維持	薬物療法
外科	胆石	胆石	胆石の切除	手術
産婦人科	産前	産前	産前のケア	定期的な検診
泌尿器科	膀胱がん	膀胱がん	がんの切除	手術
神経科	脳腫瘍	脳腫瘍	腫瘍の切除	手術
眼科	白内障	白内障	白内障の切除	手術
耳鼻科	鼻炎	鼻炎	炎症の抑制	点鼻薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術
内科	心臓病	心臓病	心機能の維持	薬物療法
外科	胆石	胆石	胆石の切除	手術
産婦人科	産前	産前	産前のケア	定期的な検診
泌尿器科	膀胱がん	膀胱がん	がんの切除	手術
神経科	脳腫瘍	脳腫瘍	腫瘍の切除	手術
眼科	白内障	白内障	白内障の切除	手術
耳鼻科	鼻炎	鼻炎	炎症の抑制	点鼻薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術
内科	心臓病	心臓病	心機能の維持	薬物療法
外科	胆石	胆石	胆石の切除	手術
産婦人科	産前	産前	産前のケア	定期的な検診
泌尿器科	膀胱がん	膀胱がん	がんの切除	手術
神経科	脳腫瘍	脳腫瘍	腫瘍の切除	手術
眼科	白内障	白内障	白内障の切除	手術
耳鼻科	鼻炎	鼻炎	炎症の抑制	点鼻薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術
内科	心臓病	心臓病	心機能の維持	薬物療法
外科	胆石	胆石	胆石の切除	手術
産婦人科	産前	産前	産前のケア	定期的な検診
泌尿器科	膀胱がん	膀胱がん	がんの切除	手術
神経科	脳腫瘍	脳腫瘍	腫瘍の切除	手術
眼科	白内障	白内障	白内障の切除	手術
耳鼻科	鼻炎	鼻炎	炎症の抑制	点鼻薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術
内科	心臓病	心臓病	心機能の維持	薬物療法
外科	胆石	胆石	胆石の切除	手術
産婦人科	産前	産前	産前のケア	定期的な検診
泌尿器科	膀胱がん	膀胱がん	がんの切除	手術
神経科	脳腫瘍	脳腫瘍	腫瘍の切除	手術
眼科	白内障	白内障	白内障の切除	手術
耳鼻科	鼻炎	鼻炎	炎症の抑制	点鼻薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術
内科	心臓病	心臓病	心機能の維持	薬物療法
外科	胆石	胆石	胆石の切除	手術
産婦人科	産前	産前	産前のケア	定期的な検診
泌尿器科	膀胱がん	膀胱がん	がんの切除	手術
神経科	脳腫瘍	脳腫瘍	腫瘍の切除	手術
眼科	白内障	白内障	白内障の切除	手術
耳鼻科	鼻炎	鼻炎	炎症の抑制	点鼻薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術

gemtuzumab ozogamicin	
再発性急性骨髄性白血病	

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期	15日
休薬	0日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L950M**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

JLSG-02 Induction A
Langerhans cell histiocytosis

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
キロサイド	100	mg/m ²		点滴静注	day1-5,15-19,29-33
オンコビン	0.05	mg/kg	2mg	点滴静注	day1,15,29
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day1-28
プレドニン	1	mg/kg	60mg/day	内服	day29-35
プレドニン	0.5	mg/kg	60mg/day	内服	day36-42

投与周期	42日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L951M**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

JLSG-02 Maintenance A	
Langerhans cell histiocytosis	

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
キロサイド	150	mg/m ²		点滴静注	day1
オンコビン	0.05	mg/kg	2mg	点滴静注	day1
メントレキセート	1	mg/kg		点滴静注	day15
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day1-4
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day15-17

投与周期
休薬

月	28日
---	-----

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L952M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
エクザール	6	mg/m ²	6mg	点滴静注	day1
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day1-5
メソトレキセート	20	mg/m ²		内服	day15
ロイケリン	1.5	mg/kg		内服	day1-28

投与周期
休薬

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	
レジメン名	G-CHOP (1サイクル目)				
対象疾患名	CD20陽性濾胞性リンパ腫				
治療目的					

登録番号 L970H

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1,8,15
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²		点滴静注	day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6

投与周期 21日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3-6)	day(8)	day(15)	day()	day()	day()
1	生食	100	mL		フラッシュ	●	●		●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注		●			●	●			
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●			●	●			
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●			●	●			
3	アタラックスP	25	mg	内服		●			●	●			
	カロナール	400	mg	内服		●			●	●			
4	生食	210	mL	点滴静注		●			●	●			
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●			●	●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L971H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1
	ドキソルビシン	50	mg/m ²		点滴静注	day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3-6)	day()	day()	day()	day()	day()
1	生食	100	mL		フラッシュ	●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
3	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
4	生食	210	mL	点滴静注		●							
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→225mL/hr	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L972S**

診療科	
レジメン名	GAZYVA (維持療法)
対象疾患名	CD20陽性濾胞性リンパ腫
治療目的	

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	day1

投与周期 56日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L980M**

診療科	
レジメン名	G-B (1サイクル目)
対象疾患名	CD20陽性濾胞性リンパ腫
治療目的	

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	day1,8,15
	ベンダムスチン	90	mg/m ²	点滴静注	day2,3

投与周期	28日
------	-----

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(8)	day(15)	day()	day()	day()
1	生食	100	mL		フラッシュ	●	●	●	●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注		●			●	●			
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●			●	●			
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●			●	●			
3	アタラックスP	25	mg	内服		●			●	●			
	カロナール	400	mg	内服		●			●	●			
4	生食	210	mL	点滴静注		●			●	●			
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●			●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注				●					
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	ベンダムスチン	90	mg/m ²	点滴静注	10分		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L981M**

診療科	
レジメン名	G-B (2サイクル目以降)
対象疾患名	CD20陽性濾胞性リンパ腫
治療目的	

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	day1
	ベンダムスチン	90	mg/m ²	点滴静注	day2,3

投与周期	28日
------	-----

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()	day()
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
3	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
4	生食	210	mL	点滴静注		●							
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→225mL/hr	●							
2	生食	50	mL	点滴静注				●					
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	ベンダムスチン	90	mg/m ²	点滴静注	10分		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1000M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

ドキシソルビシン単剤

惡性軟部肉腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドキシソルビシン

75

 mg/m^2

持續靜注

day1

[illegible]

70	
----	--

	8	

附說明書	
------	--

Day 1	
-------	--

--	--

--	--

[illegible]

--	--

--	--

--	--

--	--

[illegible]

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

A+AVD療法
ホジキンリンパ腫

申請医師

備考欄

登録番号 L1010H

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
アドセトリス	1.2	mg/kg		静注	day1、15
ドキソルビシン	25	mg/m ²		静注	day1、15
エクザール	6	mg/m ²	10mg	静注	day1、15
ダカルバジン	375	mg/m ²		静注	day1、15

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●						
	デカドロン注	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	ドキソルビシン	25	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●						
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	エクザール	6	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ダカルバジン	375	mg/m ²	点滴静注	15分	●	●						
6	生食	50	mL	点滴静注	15分	●	●						
7	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	注射用水	0.24	mL/kg	点滴静注		●	●						
	アドセトリス	1.2	mg/kg	点滴静注	30分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1020S**

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Nivolumab単剤 (ホジキンリンパ腫)(2W)	
----------------------------	--

对象疾患名

再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

オプジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1
-------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 14日

--	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1030S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab単剤 (ホジキンリンパ腫)(3W)	
--------------------------------	--

再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
--------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

[illegible][illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1040S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

D-Ld療法(1サイクル目)	
多発性骨髄腫	

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1041S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

D-Ld療法(2サイクル目)

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量 単位	投与経路	投与日
-----	----------	------	-----

ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1042S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

D-Ld療法(3-6サイクル目)

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,15
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1043S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	骨折	骨折	骨折の治癒	手術、固定
産婦人科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	経過観察、分娩
泌尿器科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	透析、内服薬
神経科	脳卒中	脳卒中	神経機能の回復	手術、リハビリ
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の軽減	点眼薬、内服薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術、化学療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術
小児科	がん	がん	がんの切除	手術
内科	がん	がん	がんの切除	手術
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がん	

申請医師

備考欄

D-Ld療法(7サイクル目以降)

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1050S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

D-Bd療法(1サイクル目)

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量 単位	投与経路	投与日
-----	----------	------	-----

ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,8,15
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,4,8,11
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,4,5,8,9,11,12

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1051S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

D-Bd療法(2-3サイクル目)

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量 単位	投与経路	投与日
-----	----------	------	-----

ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,8,15
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,4,8,11
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,4,5,8,9,11,12

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1052S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

D-Bd療法(4-8サイクル目)

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量 単位	投与経路	投与日
-----	----------	------	-----

ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,4,8,11
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,4,5,8,9,11,12

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1053S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	内服薬、透析
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	点眼薬、内服薬
皮膚科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	内服薬、透析
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	点眼薬、内服薬
皮膚科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	内服薬、透析
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	点眼薬、内服薬
皮膚科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	内服薬、透析
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	点眼薬、内服薬
皮膚科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	内服薬、透析
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	点眼薬、内服薬
皮膚科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種

申請医師

備考欄

D-Bd療法(9サイクル目以降)

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

[illegible]

投与周期 28日

休薬

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

D-VMP療法(1サイクル目)

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

備考欄

登録番号

L1060S

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22,29,36
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,4,8,11,22,25,29,32
アルケラン	9	mg/m ²	内服	day1-4
プレドニン	60	mg/m ²	内服	day2-4

投与周期

42日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	day(1)	day(2-3)	day(4)	day(8)	day(11)	day(15)	day(22)	day(25)	day(29)	day(32)	day(36)
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●			●		●	●		●		●
	カロナール	400	mg/body	内服		●			●		●	●		●		●
	レナデックス	20	mg/body	内服		●			●		●	●		●		●
	(ダラザレックス投与1時間前までに)															
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●		●	●		●		●
2	生食	1000	mL	点滴静注		●										
	ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	50→200mL/h	●										
2	生食	500	mL	点滴静注					●							
	ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	50→200mL/h				●							
2	生食	500	mL	点滴静注							●	●		●		●
	ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	100→200mL/h						●	●		●		●
3	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注		●		●	●	●		●	●	●	●	
	生食	0.52	mL/m ²	皮下注		●		●	●	●		●	●	●	●	
	アルケラン	9	mg/m ²	内服		●	●	●								
	プレドニン	60	mg/m ²	内服			●	●								

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1061S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

D-VMP療法(2-9サイクル目)

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量 単位

單位

投与経路

投与日

ダラザレックス

16

mg/kg

点滴静注

day1,22

ボルテゾミブ

1.3

 mg/m^2

皮下注

day 1,8,22,29

アルケラン

9

 mg/m^2

内服

day 1-4

プレドニン

60

 mg/m^2

内服

day1-1	day2-4
--------	--------

投与周期
休薬

42日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-3)	day(4)	day(8)	day(22)	day(29)	day()	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●				●				
	カロナー	400	mg/body	内服		●				●				
	レナデックス	20	mg/body	内服		●				●				
	(ダラザレックス投与1時間前までに)													
1	生食	100	mL	点滴静注		●				●				
2	生食	500	mL	点滴静注		●				●				
	ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	100→200mL/h	●				●				
3	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注		●			●	●	●			
	生食	0.52	mL/m ²	皮下注		●			●	●	●			
	アルケラン	9	mg/m ²	内服		●	●	●						
	プレドニン	60	mg/m ²	内服			●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1062S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

D-VMP療法(10サイクル目以降)	
--------------------	--

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

ダラザレックス

16	mg/kg
----	-------

mg/kg

点滴静注

day1

投与周期 **28日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1070S

申請醫師

備考欄

AraC単剤

ランゲルハンス細胞組織球症

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

キロサイド

100

0 mg/m²

点滴静注

day1-5

投与周期
休薬

30日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1080S**

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	月経の正常化	ホルモン療法
産科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	産科ケア
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	鼻炎	鼻炎	鼻の症状の軽減	点鼻薬、内服薬
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	透析療法
精神科	うつ病	うつ病	症状の軽減	抗うつ薬、心理療法
神経科	脳卒中	脳卒中	脳機能の回復	リハビリテーション
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術療法
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術療法
内科	心臓病	心臓病	心機能の維持	薬物療法
外科	心臓手術	心臓手術	心臓の修復	手術療法
婦人科	子宮がん	子宮がん	がんの切除	手術療法
産科	産科手術	産科手術	健康な赤ちゃんの誕生	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	耳鳴り	耳鳴り	耳鳴りの軽減	聴覚療法
泌尿科	腎臓手術	腎臓手術	腎臓の修復	手術療法
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の軽減	抗精神病薬
神経科	脳神経痛	脳神経痛	痛みの軽減	鎮痛薬
皮膚科	皮膚病	皮膚病	皮膚の健康	外用薬
小児科	小児皮膚病	小児皮膚病	皮膚の健康	外用薬
内科	糖尿病手術	糖尿病手術	血糖値のコントロール	手術療法
外科	がん手術	がん手術	がんの切除	手術療法
婦人科	産科手術	産科手術	健康な赤ちゃんの誕生	手術療法
眼科	白内障	白内障	視力の回復	手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	耳の健康	点耳薬
泌尿科	腎臓手術	腎臓手術	腎臓の修復	手術療法
精神科	うつ病手術	うつ病手術	症状の軽減	手術療法
神経科	脳神経痛手術	脳神経痛手術	痛みの軽減	手術療法
皮膚科	皮膚がん手術	皮膚がん手術	がんの切除	手術療法
小児科	小児がん手術	小児がん手術	がんの切除	手術療法
内科	心臓手術	心臓手術	心機能の回復	手術療法
外科	心臓手術	心臓手術	心臓の修復	手術療法
婦人科	子宮がん手術	子宮がん手術	がんの切除	手術療法
産科	産科手術	産科手術	健康な赤ちゃんの誕生	手術療法
眼科	緑内障手術	緑内障手術	視力の回復	手術療法
耳鼻科	中耳炎手術	中耳炎手術	耳の健康	手術療法
泌尿科	腎臓手術	腎臓手術	腎臓の修復	手術療法
精神科	うつ病手術	うつ病手術	症状の軽減	手術療法
神経科	脳神経痛手術	脳神経痛手術	痛みの軽減	手術療法
皮膚科	皮膚がん手術	皮膚がん手術	がんの切除	手術療法
小児科	小児がん手術	小児がん手術	がんの切除	手術療法
内科	心臓手術	心臓手術	心機能の回復	手術療法
外科	心臓手術	心臓手術	心臓の修復	手術療法
婦人科	子宮がん手術	子宮がん手術	がんの切除	手術療法
産科	産科手術	産科手術	健康な赤ちゃんの誕生	手術療法
眼科	緑内障手術	緑内障手術	視力の回復	手術療法
耳鼻科	中耳炎手術	中耳炎手術	耳の健康	手術療法
泌尿科	腎臓手術	腎臓手術	腎臓の修復	手術療法
精神科	うつ病手術	うつ病手術	症状の軽減	手術療法
神経科	脳神経痛手術	脳神経痛手術	痛みの軽減	手術療法
皮膚科	皮膚がん手術	皮膚がん手術	がんの切除	手術療法
小児科	小児がん手術	小児がん手術	がんの切除	手術療法
内科	心臓手術	心臓手術	心機能の回復	手術療法
外科	心臓手術	心臓手術	心臓の修復	手術療法
婦人科	子宮がん手術	子宮がん手術	がんの切除	手術療法
産科	産科手術	産科手術	健康な赤ちゃんの誕生	手術療法
眼科	緑内障手術	緑内障手術	視力の回復	手術療法
耳鼻科	中耳炎手術	中耳炎手術	耳の健康	手術療法
泌尿科	腎臓手術	腎臓手術	腎臓の修復	手術療法
精神科	うつ病手術	うつ病手術	症状の軽減	手術療法
神経科	脳神経痛手術	脳神経痛手術	痛みの軽減	手術療法
皮膚科	皮膚がん手術	皮膚がん手術	がんの切除	手術療法
小児科	小児がん手術	小児がん手術	がんの切除	手術療法
内科	心臓手術	心臓手術	心機能の回復	手術療法
外科	心臓手術	心臓手術	心臓の修復	手術療法
婦人科	子宮がん手術	子宮がん手術	がんの切除	手術療法
産科	産科手術	産科手術	健康な赤ちゃんの誕生	手術療法
眼科	緑内障手術	緑内障手術	視力の回復	手術療法
耳鼻科	中耳炎手術	中耳炎手術	耳の健康	手術療法
泌尿科	腎臓手術	腎臓手術	腎臓の修復	手術療法
精神科	うつ病手術	うつ病手術	症状の軽減	手術療法
神経科	脳神経痛手術	脳神経痛手術	痛みの軽減	手術療法
皮膚科	皮膚がん手術	皮膚がん手術	がんの切除	手術療法
小児科	小児がん手術	小児がん手術	がんの切除	手術療法
内科	心臓手術	心臓手術	心機能の回復	手術療法
外科	心臓手術			

申請医師

備考欄

VLB+PSL(導入)

造血器腫瘍

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

エクザール

6

 mg/m^2

点滴静注

day1,8,15,22, 29,36

プレドニン

40

 mg/m^2

内服

day1-28

投与周期 **56日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	登録番号	L1090H
レジメン名	CEOP					
対象疾患名	非ホジキンリンパ腫					
治療目的						

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	day1
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day1
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day1
	プレドニン	100	mg/body		内服	day1-5
	ラステット	100	mg/m ²		内服	day2-3

投与周期 21日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	500	mL	点滴静注		●							
	ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開	●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
	ラステットCap	100	mg/m ²	内服			●	●					
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	登録番号	L1091H
レジメン名	R-CEOP					
対象疾患名	非ホジキンリンパ腫					
治療目的						

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
	リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴静注	day1
		1mg/mLに調整				
	ラステット	100	mg/m ²		内服	day3-4

投与周期 21日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●							
1	生食	100	mL	×	フラッシュ		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	生食	500	mL	点滴静注			●						
	ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●						
	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開		●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
	ラステットCap	100	mg/m ²	内服				●	●				
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	登録番号	L1092H
レジメン名	G-CEOP (1サイクル目)					
対象疾患名	非ホジキンリンパ腫					
治療目的						

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1,8,15
	ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
	ラステット	100	mg/m ²		内服	day3-4

投与周期 21日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(8)	day(15)
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●					●	●
2	生食	50	mL	点滴静注		●						●	●
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●						●	●
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●						●	●
3	アタラックスP	25	mg	内服		●						●	●
	カロナール	400	mg	内服		●						●	●
4	生食	210	mL	点滴静注		●						●	●
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●						●	●
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	生食	500	mL	点滴静注			●						
	ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●						
	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開		●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
	ラステットCap	100	mg/m ²	内服				●	●				
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	登録番号	L1093H
レジメン名	G-CEOP (2サイクル目以降)					
対象疾患名	非ホジキンリンパ腫					
治療目的						

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1
	ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	day2
	オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
	エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
	プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
	ラステット	100	mg/m ²		内服	day3-4

投与周期	21日	休薬	
------	-----	----	--

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
1	生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
3	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
4	生食	210	mL	点滴静注		●							
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→225mL/hr	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	生食	500	mL	点滴静注			●						
	ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●						
	オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開		●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
	ラステットCap	100	mg/m ²	内服				●	●				
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師	
A+CHP		
未治療のCD30陽性末梢性T細胞リンパ腫		

申請医師

備考欄

登録番号 L1100H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴静注	day1
ドキソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	day1
プレドニン	100	mg/body	内服	day1-5

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.36	mL/kg	点滴静注		●							
	アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注	30分	●							
7	生食	500	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1120L**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

ペントスタチン	
ヘアリーセル白血病	

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
コホリン	5	mg/m ²	点滴静注	day1-7

投与周期	7-14日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1130M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	骨折	骨折	骨折の治癒	手術、固定
婦人科	月経不調	月経不調	月経の正常化	ホルモン療法
産科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	吸入薬、点鼻薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
内科	脂質異常症	脂質異常症	脂質のコントロール	内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
内科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能の維持	食事療法、薬物療法
内科	慢性肝臓病	慢性肝臓病	肝機能の維持	食事療法、薬物療法
内科	慢性心臓病	慢性心臓病	心機能の維持	薬物療法
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	呼吸機能の維持	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	消化機能の維持	内服薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	呼吸機能の維持	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	消化機能の維持	内服薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	呼吸機能の維持	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	消化機能の維持	内服薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	呼吸機能の維持	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	消化機能の維持	内服薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	呼吸機能の維持	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	消化機能の維持	内服薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	呼吸機能の維持	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	消化機能の維持	内服薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	呼吸機能の維持	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	消化機能の維持	内服薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬
内科	慢性血液疾患	慢性血液疾患	血液機能の維持	内服薬
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	呼吸機能の維持	吸入薬、内服薬

申請医師

備考欄

Venetoclax+Azacitidine(静注)

急性骨髓性白血病

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

アザシチジン

75

5	mg/m ²
---	-------------------

静注

day1-7

ベネトクラクス

内服

--	--

--	--

投与周期 **28日**

休薬

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1131M**

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用剤

申請医師

備考欄

Venetoclax+Azacitidine(皮下注)

急性骨髓性白血病

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

アザシチジン

75 mg/m² mg/m^2

皮下注

day1-7

ベネトクラクス

内服

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1140M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Special C

Adults	Langerhans cell histiocytosis
--------	-------------------------------

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
エクザール	6	mg/m ²	6mg	点滴静注	day1
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day1-5
メソトレキセート	20	mg/m ²		内服	day15
ロイケリン	1.5	mg/kg		内服	day1-28

投与周期
休薬

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1150S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

inotuzumab ozogamicin (1サイクル目)	
--------------------------------	--

再発または難治性CD22陽性の急性リンパ性白血病

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベスポンサ	0.8	mg/m ²	点滴静注	day1
ベスポンサ	0.5	mg/m ²	点滴静注	day8,15

投与周期
休薬

21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1151S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

inotuzumab ozogamicin (非寛解:2-6サイクル目)	
--------------------------------------	--

再発または難治性CD22陽性の急性リンパ性白血病

[illegible]

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1152S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)

再発または難治性CD22陽性の急性リンパ性白血病

[illegible]

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1170S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Isa-Pd療法（1コース目）

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量単位

量单位

投与経路

投与日

[illegible]

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1171S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用剤

申請医師

備考欄

Isa-Pd療法 (2コース目以降)

多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量 単位	投与経路	投与日
-----	----------	------	-----

[illegible]

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1180M**

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Pola+RB療法(1サイクル目)	
-------------------	--

对象疾患名

再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫

治療目的

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day2
ベンダムスチン	90	mg/m ²	点滴静注	day2、3

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●				
	カロナール	400	mg	内服		●	●				
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●			
2	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●					
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●					
3	生食	100	mL	点滴静注			●				
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注			●				
	ボライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90分		●				
4	生食	50	mL	点滴静注				●			
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●			
5	生食	50	mL	点滴静注			●	●			
	ベンダムスチン	90	mg/m ²	点滴静注	10分		●	●			

レジメン記入フォーマット

治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 L1181M

Pola+RB療法(2-6サイクル目)	
---------------------	--

再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day1
ベンダムスチン	90	mg/m ²	点滴静注	day1、2

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day()	day()	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●					
	カロナール	400	mg	内服		●					
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●				
2	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●					
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●					
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●	●				
4	生食	100	mL	点滴静注		●					
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注		●					
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●					
5	生食	50	mL	点滴静注			●				
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●				
6	生食	50	mL	点滴静注		●	●				
	ベンダムスチン	90	mg/m ²	点滴静注	10分	●	●				

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DKd療法(1サイクル目)
多発性骨髄腫

申請医師

備考欄

登録番号 L1190S

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	8	mg/kg	点滴静注	day1,2
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day8,15,22
カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	day1,2
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	day8,9,15,16
レナデックス	40	mg/week	内服	day1,2,8,9,15,16,22

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●	●	●		●		●		
	カロナール	400	mg/body	内服		●	●	●		●		●		
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●			
	レナデックス	40	mg/body	内服								●		
	(投与開始1時間前までに)													
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●	●		
2	生食	500	mL	点滴静注		●	●							
	ダラザレックス	8	mg/kg	点滴静注	50→200mL/h	●	●							
2	生食	500	mL	点滴静注				●		●				
	ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	50→200mL/h			●		●				
2	生食	500	mL	点滴静注								●		
	ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	100→200mL/h							●		
3	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●	●		●				
4	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●							
	注射用水	10	mL/m ²	点滴静注		●	●							
	カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●							
4	5% 糖液	100	mL	点滴静注				●	●	●	●			
	注射用水	28	mL/m ²	点滴静注				●	●	●	●			
	カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	30分			●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1191S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

DKd療法(2サイクル目)	
多発性骨髄腫	

申請医師

--

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	40	mg/week	内服	day1,2,8,9,15,16,22

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1192S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DKd療法(3-6サイクル目)	
多発性骨髄腫	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,15
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	40	mg/week	内服	day1,2,8,9,15,16,22

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1193S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

DKd療法(7サイクル目以降)	
多発性骨髄腫	

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	40	mg/week	内服	day1,2,8,9,15,16,22

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1470H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

Pola+R-CHP(1-6コース目)2日投与
未治療のDLBCL

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
	1mg/mLに調整			
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day2
ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body	内服	day2-6

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●						
	カロナール	400	mg	内服		●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●							
3	生食	100	mL	点滴静注			●						
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注			●						
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90→30分		●						
4	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ		●						
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
6	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
7	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	登録番号	L1471H
レジメン名	Pola+R-CHP(2-6コース目)1日投与					
対象疾患名	未治療のDLBCL					
治療目的						

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
		1mg/mLに調整			
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day1
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注	day1
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	day1
	プレドニン	100	mg/body	内服	day1-5

投与周期	21日	休薬	
------	-----	----	--

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注		●							
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
7	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注		●							
8	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注		●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1472S

診療科	
レジメン名	Pola+R-CHP(7-8コース目)
対象疾患名	末治療のDLBCL
治療目的	

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
		1mg/mLに調整			

投与周期 21日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1480S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Venetoclax+LDAC(静注)

急性骨髓性白血病

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与目

キロサイト

20

 mg/m^2

静注

day1-10

ベネトクラクス

内服

day1-28

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1481S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
消化器科	肝臓がん	肝臓がん	肝臓がん	肝臓がん

申請医師

備考欄

Venetoclax+LDAC(皮下注)

急性骨髓性白血病

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

キロサイド

20

0 mg/m²

皮下注

day1-10

ベネトクラクス

内服

day1-28

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Isa-Kd療法(1サイクル目)
多発性骨髄腫

申請医師

備考欄

登録番号 L1550S

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	day1,2
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	day8,9,15,16
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)	day()
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●		●		●		●		
	カロナール	400	mg/body	内服		●		●		●		●		
	ファモチジン	20	mg/body	内服		●		●		●		●		
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	
	(サークリサ投与15-60分前までに)													
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●	●		
2	生食	250	mL	点滴静注		●		●		●		●		
	サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	175→400mg/h	●		●		●		●		
3	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●		●		●				
4	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●							
	注射用水	10	mL/m ²	点滴静注		●	●							
	カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●							
4	5% 糖液	100	mL	点滴静注				●	●	●	●			
	注射用水	28	mL/m ²	点滴静注				●	●	●	●			
	カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	30分			●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1550S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Isa-Kd療法(2サイクル目以降)	
多発性骨髄腫	

[illegible]

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1580S

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

BLd	
多発性骨髄腫	

申請医師

備考欄

ردیف	شرح	مبلغ
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,4,8,11
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-14
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,4,5,8,9,11,12

投与周期
休薬

21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1590S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Elranatamab (C1)

再発又は難治性の多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

エルレフィオ

12

2 mg/body

皮下注

day1

エルレフィオ

32

mg/body	mg/body
2 mg/body	mg/body

皮下注

day1	
day4	

エルレフィオ

76

mg/body	
mg/body	

皮下注

day 1	day8.15.22
-------	------------

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1591S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Elranatamab (C2-6)

再発又は難治性の多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

エルレフィオ

76

6 mg/body

皮下注	
-----	--

day1.8.15.22

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1592S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Elranatamab (C7-)

再発又は難治性の多発性骨髄腫

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

エルレフィオ

76

6 mg/body

皮下注	
-----	--

day1.15

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1601S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Epcoritamab (C2-3)

再発又は難治性の~~大細胞型B細胞性リンパ腫~~,濾胞性リンパ腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

エプキンリ

48 mg/body

皮下注	
-----	--

day1,8,15.22

投与周期
休薬

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1602S

診療科		申請医師	
レジメン名	Epcoritamab (C4-9)		
対象疾患名	再発又は難治性の 大細胞型 大細胞型B細胞性リンパ腫、濾胞性リンパ腫		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エプキンリ	48	mg/body	皮下注	day1,15

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1603S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Epcoritamab (C10-)

再発又は難治性の~~大細胞型B細胞性リンパ腫~~、濾胞性リンパ腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名

標準投与量 単位

8 mg/body

投与経路

投与日

エプキンリ

48

8 mg/body

皮下注

day1

投与周期
休薬

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1630M

診療科 申請医師

レジメン名	DCyBorD療法(1-2サイクル目)Cy点滴
-------	-------------------------

対象疾患名	全身性ALアミロイドーシス
-------	---------------

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg	皮下注	day1,8,15,22
エンドキサン	300	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22
ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,8,15,22
デカドロン	20	mg	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期	28日間
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1631M

診療科		申請医師	
-----	--	------	--

備考欄

レジメン名 DCyBorD療法(3-6サイクル目)Cy点滴

対象疾患名	全身性ALアミロイドーシス
-------	---------------

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg	皮下注	day1,15
エンドキサン	300	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22
ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,8,15,22
デカドロン	20	mg	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 **28日間**

休薬

28日間

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)		
0	アタラックスP カロナール デカドロン	25 400 20	mg/body mg/body mg/body	内服 内服 内服		● ● ●				● ● ●					
	(ダラク्यूロ投与1時間前までに)														
1	ダラク्यूロ	1800	mg	皮下注	3-5分	●				●					
2	生食	100	mL	点滴静注	X	●		●		●		●			
3	グラニセトロンバツイ	1	mg	点滴静注	15分	●		●		●		●			
4	生食 エンドキサン	100 300	mL mg/m²	点滴静注 点滴静注		● ●		● ●		● ●		● ●			
5	生食 ベルケイド	0.52 1.3	mL/m² mg/m²	皮下注 皮下注		● ●		● ●		● ●		● ●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1632S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

DCyBorD療法(7サイクル目以降)

全身性ALアミロイドーシス

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ダラキューロ	1800 mg	皮下注	day1
--------	---------	-----	------

デカドロン	20 mg	内服	day1
-------	-------	----	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 **28日間**

休薬

28日間

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1633M

診療科		申請医師	
-----	--	------	--

備考欄

レジメン名 DCyBorD療法(1-2サイクル目)Cy内服

対象疾患名	全身性ALアミロイドーシス
-------	---------------

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg	皮下注	day1,8,15,22
ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,8,15,22
エンドキサン	300	mg/m ²	内服	day1,8,15,22
デカドロン	20	mg	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 休薬	28日間

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1634M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

DCyBorD療法(3-6サイクル目)Cy内服

全身性ALアミロイドーシス

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ダラキューロ	1800	mg	皮下注	day1,15
ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,8,15,22
エンドキサン	300	mg/m ²	内服	day1,8,15,22
デカドロン	20	mg	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

備考欄

投与周期	28日間
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1640L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請醫師

備考欄

Eribulin单剂

惡性軟部腫瘍

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名

標準投与量単位

单位

投与経路

投与日

Eribulin

1.4

 mg/m^2

点滴静注

day1,8

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1650S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請醫師

備考欄

Mosunetuzumab(C1)

Grade1～3Aの再発又は難治性の濾胞性リンパ腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ルスミオ	1 mg/body	点滴静注	day1
------	-----------	------	------

ルスミオ	2 mg/body	点滴静注	day8
------	-----------	------	------

ルスミオ	60 mg/body	点滴静注	day15
------	------------	------	-------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1651S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Mosunetuzumab(C2)

Grade1～3Aの再発又は難治性の濾胞性リンパ腫

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

ルンスミオ

60

mg/body

点滴静注

day1

mg, day	
---------	--

备注	
----	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期
休薬

21 目

[illegible][illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1652S

診療科		申請医師	
レジメン名	Mosunetuzumab(C3以降)		
対象疾患名	Grade1～3Aの再発又は難治性の濾胞性リンパ腫		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ルンスミオ	30	mg/body	点滴静注	day1

投与周期
休薬

21日

21 日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1660S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

weekly Kd療法(C1)	
多発性骨髄腫	

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	day1
カイプロリス	70	mg/m ²	点滴静注	day8,15
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1661S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

weekly Kd療法(C2-9)	
多発性骨髄腫	

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	70	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1662S**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

weekly Kd療法(C10以降)	
多発性骨髄腫	

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	70	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1670M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の改善	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の改善	ホルモン療法
産科	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	症状の改善	内服薬、安静
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	症状の改善	内服薬、食事療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	症状の改善	内服薬
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の改善	内服薬
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	症状の改善	レーザー治療
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の改善	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	高血圧症	高血圧症	症状の改善	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の改善	手術療法
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の改善	手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の改善	安静
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	症状の改善	内服薬、食事療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	症状の改善	内服薬
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の改善	内服薬
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	症状の改善	レーザー治療
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の改善	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	高血圧症	高血圧症	症状の改善	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の改善	手術療法
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の改善	手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の改善	安静
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	症状の改善	内服薬、食事療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	症状の改善	内服薬
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の改善	内服薬
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	症状の改善	レーザー治療
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の改善	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	高血圧症	高血圧症	症状の改善	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の改善	手術療法
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の改善	手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の改善	安静
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	症状の改善	内服薬、食事療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	症状の改善	内服薬
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の改善	内服薬
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	症状の改善	レーザー治療
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の改善	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	高血圧症	高血圧症	症状の改善	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の改善	手術療法
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の改善	手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の改善	安静
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	症状の改善	内服薬、食事療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	症状の改善	内服薬
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の改善	内服薬
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	症状の改善	レーザー治療
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の改善	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	高血圧症	高血圧症	症状の改善	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の改善	手術療法
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の改善	手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の改善	安静
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	症状の改善	内服薬、食事療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	症状の改善	内服薬
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の改善	内服薬
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	症状の改善	レーザー治療
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の改善	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	高血圧症	高血圧症	症状の改善	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の改善	手術療法
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の改善	手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	症状の改善	安静
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	症状の改善	内服薬、食事療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	症状の改善	内服薬
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の改善	内服薬
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	症状の改善	レーザー治療

申請医師

備考欄

Ivosidenib + Azacitidine(静注)

未治療のIDH1遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

アザシチジン

75

 mg/m^2

静注

day1-7

イボシデニブ

500

mg

内服

連日

投与周期 **28日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1680S**

診療科	
レジメン名	Venetoclax + Ritximab (C1)
対象疾患名	難治性慢性リンパ性白血病
治療目的	

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	リツキサン	375	mg/m ²	点滴	day1
	ベネトクラクス	400	mg	経口	連日

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **L1681S**

診療科	
レジメン名	Venetoclax + Ritximab (C2-6)
対象疾患名	難治性慢性リンパ性白血病
治療目的	

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	リツキサン	500	mg/m ²	点滴	day1
	ベネトクラクス	400	mg	経口	連日

投与周期 28日

休薬

[illegible]