code	レジメン名
L010H	R-CHOP
L011H	R-CHOP+MAD
L030H	CHOP
L031H	CHOP+MAD
L040H	R-THP-COP（初回）
L050H	R-THP-COP（2回目以降）
L060S	Ritximab単剤
L090M	アザシチジン療法（静注）
L091M	アザシチジン療法（皮下注）
L092M	アザシチジン療法（静注+皮下注）
L100H	ABVD療法
L110H	COPP療法
L120M	R+BND療法
L130M	Bendamustine単独療法
L140S	ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ/ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ（3W）療法（静注）
L141S	ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ/ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ（3W）療法（皮下注）
L150S	ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ/ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ（5W）療法（静注）
L151S	ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ/ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ（5W）療法（皮下注）
L152S	VCD療法
L160H	ESHAP療法
L161H	R-ESHAP療法
L170M	CAG（G：ノイトロジン）療法
L180M	CAG（G：フィルグラスチム）療法
L210S	ネララビン療法
L740L	Brentuximab Vedotin (BV)療法
L750S	モガムリズマブ単独療法
L800M	AI療法
L860S	KLd療法(1サイクル目)
L861S	KLd療法(2-12サイクル目)
L862S	KLd療法(13サイクル目以降)
L870S	E-Ld療法(1,2サイクル目)
L871S	E-Ld療法(3サイクル目以降)
L880M	FCR
L890S	オファツムマブ 初回
L891S	オファツムマブ 2～8回目
L892S	オファツムマブ 9～12回目
L900S	alemtuzumab (3mg)
L901S	alemtuzumab (10mg)
L902S	alemtuzumab (30mg)
L910M	CHASER
L930L	プララトレキサート単独療法
L940S	gemtuzumab ozogamicin
L950M	JLSG-02 Induction A
L951M	JLSG-02 Maintenance A
L952M	JLSG-02 Maintenance C
L970H	G-CHOP (1サイクル目)
L971H	G-CHOP (2サイクル目以降)
L972S	GAZYVA (維持療法)
L980M	G-B (1サイクル目)
L981M	G-B (2サイクル目以降)
L1000M	ドキソルビシン単剤
L1010H	A+AVD療法
L1020S	Nivolumab単剤 (ホジキンリンパ腫)(2W)
L1030S	Pembrolizumab単剤 （ホジキンリンパ腫)(3W)
L1044S	D-Ld療法 （皮下注1-2サイクル目）
L1045S	D-Ld療法 （皮下注3-6サイクル目）
L1046S	D-Ld療法 （皮下注7サイクル目以降）
L1054S	D-Bd療法 （皮下注1-3サイクル目）
L1055S	D-Bd療法 （皮下注4-8サイクル目）
L1056S	D-Bd療法 （皮下注9サイクル目以降）
L1063S	D-VMP療法 （皮下注1サイクル目）
L1064S	D-VMP療法 （皮下注2-9サイクル目）
L1065S	D-VMP療法 （皮下注10サイクル目以降）
L1070M	AraC単剤
L1080S	VLB+PSL（導入）

L1081S VLB+PSL(維持)
L1090H CEOP
L1091H R-CEOP
L1092H G-CEOP (1サイクル目)
L1093H G-CEOP (2サイクル目以降)
L1100H A+CHP
L1130M Venetoclax+Azacitidine(静注)
L1131M Venetoclax+Azacitidine(皮下注)
L1140M Special C
L1150S inotuzumab ozogamicin (1サイクル目)
L1151S inotuzumab ozogamicin (非寛解:2-6サイクル目)
L1152S inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)
L1170S Isa-Pd療法 (1コース目)
L1171S Isa-Pd療法 (2コース目以降)
L1180M Pola+RB療法(1サイクル目)
L1181M Pola+RB療法(2-6サイクル目)
L1194S DKd療法 (皮下注1-2サイクル目)
L1195S DKd療法 (皮下注3-6サイクル目)
L1196S DKd療法 (皮下注7サイクル目以降)
L1470H Pola+R-CHP(1-6コース目)2日投与
L1471H Pola+R-CHP(2-6コース)1日投与
L1472S Pola+R-CHP(7-8コース目)
L1480S Venetoclax+LDAC(静注)
L1481S Venetoclax+LDAC(皮下注)
L1550S Isa-Kd療法(1サイクル目)
L1551S Isa-Kd療法(2サイクル目以降)
L1580S BLd
L1590S Elranatamab (C1)
L1591S Elranatamab (C2-6)
L1592S Elranatamab (C7-)
L1600S Epcoritamab (C1)
L1601S Epcoritamab (C2-3)
L1602S Epcoritamab (C4-9)
L1603S Epcoritamab (C10-)
L1630M DCyBorD療法(1-2サイクル目)エンドキサン点滴
L1631M DCyBorD療法(3-6サイクル目)エンドキサン点滴
L1632S DCyBorD療法(7サイクル目以降)
L1633M DCyBorD療法(1-2サイクル目)エンドキサン内服
L1634M DCyBorD療法(3-6サイクル目)エンドキサン内服
L1640L Eribulin単剤
L1650S Mosunetuzumab(C1)
L1651S Mosunetuzumab(C2)
L1652S Mosunetuzumab(C3以降)
L1653S Mosunetuzumab(C1)(皮下注)
L1654S Mosunetuzumab(C2以降)(皮下注)
L1660S weekly Kd療法(C1)
L1661S weekly Kd療法(C2-9)
L1662S weekly Kd療法(C10以降)
L1670M Ivosidenib + Azacitideine(静注)
L1680S Venetoclax＋Ritximab (C1)
L1681S Venetoclax＋Ritximab (C2-6)
L1690S Talquetamab (weekly 1サイクル目)
L1691S Talquetamab (weekly 2サイクル目以降)
L1700S Talquetamab (biweekly 1サイクル目)
L1701S Talquetamab (biweekly 2サイクル目以降)
L1710S Mosun-Pola療法 (C1) (皮下注)
L1711S Mosun-Pola療法 (C2-8) (皮下注)
L1712S Mosun-Pola療法 (C7-8) (皮下注)
L1720S Blinatumomab (体重45kg以上)(2-5サイクル目:寛解導入,地固め)携帯ポンプ用(3-4)
L1721S Blinatumomab (体重45kg以上)(2-5サイクル目:寛解導入,地固め)携帯ポンプ用(4-3)
L1722S Blinatumomab (体重45kg以上)(6-9サイクル目:維持)携帯ポンプ用(3-4)
L1723S Blinatumomab (体重45kg以上)(6-9サイクル目:維持)携帯ポンプ用(4-3)
L1724S Blinatumomab (体重45kg未満)(2-5サイクル目:寛解導入,地固め)携帯ポンプ用(3-4)
L1725S Blinatumomab (体重45kg未満)(2-5サイクル目:寛解導入,地固め)携帯ポンプ用(4-3)
L1726S Blinatumomab (体重45kg未満)(6-9サイクル目:維持)携帯ポンプ用(3-4)
L1727S Blinatumomab (体重45kg未満)(6-9サイクル目:維持)携帯ポンプ用(4-3)
L1730L Tafasitamab+R2療法(1サイクル目) 体重83kg以上
L1731L Tafasitamab+R2療法(2-3サイクル目) 体重83kg以上

L1732L Tafasitamab+R2療法(4-5サイクル目) 体重83kg以上
L1733L Tafasitamab+R2療法(6-12サイクル目) 体重83kg以上
L1740L Tafasitamab+R2療法(1サイクル目) 体重83kg未満
L1741L Tafasitamab+R2療法(2-3サイクル目) 体重83kg未満
L1742L Tafasitamab+R2療法(4-5サイクル目) 体重83kg未満
L1743L Tafasitamab+R2療法(6-12サイクル目) 体重83kg未満
L1750L Tafasitamab+LEN療法(1サイクル目) 体重83kg以上
L1751L Tafasitamab+LEN療法(2-3サイクル目) 体重83kg以上
L1752L Tafasitamab+LEN療法(4-12サイクル目) 体重83kg以上
L1753L Tafasitamab+LEN療法(13サイクル目以降) 体重83kg以上
L1760L Tafasitamab+LEN療法(1サイクル目) 体重83kg未満
L1761L Tafasitamab+LEN療法(2-3サイクル目) 体重83kg未満
L1762L Tafasitamab+LEN療法(4-12サイクル目) 体重83kg未満
L1763L Tafasitamab+LEN療法(13サイクル目以降) 体重83kg未満
L1790H Moga-CHOP(1-6コース目) 2日投与
L1791H Moga-CHOP(2-6コース目) 1日投与
L1792S Moga-CHOP(7-8コース目)
L1800S Tal ＋Tec療法 (1サイクル目)
L1801S Tal ＋Tec療法 (2サイクル目以降)

レジメン記入フォーマット

登録番号 L010H

診療科
レジメン名 R-CHOP
対象疾患名 悪性リンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	50	mg/㎡		点滴	day2
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴	day2
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
リツキシマブBS	375	mg/㎡		点滴	day1
	1mg/mLに調整				

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(　)	day(　)
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注		●							
	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●							
1	生食	100	mL		フラッシュ		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L011H

診療科
レジメン名 R-CHOP+MAD
対象疾患名 悪性リンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡		静注	day1
ドキソルビシン	50	mg/㎡		静注	day2
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	静注	day2
エンドキサン	750	mg/㎡		静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
メトトレキサート	15	mg		髄腔内	day2
シタラビン	40	mg		髄腔内	day2
デカドロン	4	mg		髄腔内	day2

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(　)	day(　)
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	リツキシマブBS	375	mg/㎡	側管点滴		●							
	生食	337.5	mL/㎡	側管点滴	25→200mL/hr	●							
1	生食	100	mL		フラッシュ		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
6	生食	3	mL				●						
	メソトレキセート注5mg	15	mg				●						
	キロサイド注20mg	40	mg				●						
	デカドロン注射液1.65mg	3.3	mg		ゆっくり		●						
	合計	6	mL	髄腔内	2～3分で		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L030H

診療科
レジメン名 CHOP
対象疾患名 悪性リンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	50	mg/㎡		点滴	day1
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴	day1
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴	day1
プレドニン	100	mg/body		内服	day1-5

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(　)	day(　)	day(　)
1	生食	100	mL		フラッシュ	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注		●							
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
4	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注		●							
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●							
5	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注		●							
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L031H

診療科
レジメン名 CHOP+MAD
対象疾患名 悪性リンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	50	mg/㎡		静注	day1
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	静注	day1
エンドキサン	750	mg/㎡		静注	day1
プレドニン	100	mg/body		内服	day1
メトトレキサート	15	mg		髄腔内	day1
シタラビン	40	mg		髄腔内	day1
デカドロン	4	mg		髄腔内	day1

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(　)	day(　)	day(　)
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
2	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注		●							
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
3	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注		●							
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●							
4	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注		●							
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
5	生食	3	mL			●							
	メソトレキセート注5m	15	mg			●							
	キロサイド注20mg	40	mg			●							
	デカドロン注射液1.65	3.3	mg		ゆっくり	●							
	合計	6	mL	髄腔内	2～3分で	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L040H

診療科
レジメン名 R-THP-COP（初回）
対象疾患名 悪性リンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ピノルビン	50	mg/㎡		点滴	day2
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴	day2
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
リツキシマブBS	375	mg/㎡		点滴	day1
	1mg/mLに調整				

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(　)	day(　)
0	ポララミン	2	mg	内服		●							
	ブルフェン	200	mg	内服		●							
1	生食（フラッシュ用）	100	mL	点滴静注			●						
2	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25mL/hr	●							
	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注	50mL/hr	●							
					100mL/hr								
					200mL/hr								
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●						
1	生食（フラッシュ用）	100	mL	点滴静注	フラッシュ		●						
4	ピノルビン	50	mg/㎡	点滴静注			●						
	5%ブドウ糖	100	mL	点滴静注	30分		●						
5	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
6	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
1	生食（フラッシュ用）	100	mL	点滴静注	フラッシュ		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		
	アプレピタント	125/80	mg	内服			●125	●80	●80				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L050H

診療科
申請医師
レジメン名 R-THP-COP（2回目以降）
対象疾患名 悪性リンパ腫
治療目的

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ピノルビン	50	mg/㎡		点滴	day1
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴	day1
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴	day1
プレドニン	100	mg/body		内服	day1-5
リツキシマブBS	375	mg/㎡		点滴	day1
	1mg/mLに調整				

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(　)	day(　)	day(　)
0	ポララミン	2	mg	内服		●							
	ブルフェン	200	mg	内服		●							
1	生食(フラッシュ用)	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
1	生食（フラッシュ用）	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
3	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	100mL/hr	●							
	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注	200mL/hr	●							
1	生食（フラッシュ用）	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	ピノルビン	50	mg/㎡	点滴静注		●							
	５%ブドウ糖	100	mL	点滴静注	３０分	●							
5	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注		●							
	生食	50	mL	点滴静注	全開	●							
6	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注		●							
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
1	生食（フラッシュ用）	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80	●80					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L060S

診療科
申請医師
レジメン名 Ritximab単剤
対象疾患名 B細胞性リンパ腫
治療目的

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴	day1
	1mg/mLに調整			

投与周期 7日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(　)	day(　)
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25mL/hr	●							
	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注	50mL/hr	●							
					100mL/hr								
					200mL/hr								

レジメン記入フォーマット

登録番号 L090M

診療科
レジメン名 アザシチジン療法（静注）
対象疾患名 骨髄異形成症候群（MDS）
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アザシチジン	75	mg/㎡	静注	day1-7

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-7)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	注射用水	7.5	mL/㎡	点滴静注		●	●						
	アザシチジン	75	mg/㎡	点滴静注	10分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L091M

診療科
レジメン名 アザシチジン療法（皮下注）
対象疾患名 骨髄異形成症候群（MDS）
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アザシチジン	75	mg/㎡	皮下注	day1-7

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-7)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
2	注射用水	3	mL/㎡	皮下注		●	●						
	アザシチジン	75	mg/㎡	皮下注		●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L092M

診療科
レジメン名 アザシチジン療法（静注+皮下注）
対象疾患名 骨髄異形成症候群（MDS）
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アザシチジン	75	mg/㎡	静注	day1-5
アザシチジン	75	mg/㎡	皮下注	day6-7

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day（１）	day（2-5）	day（6-7）	day（　）	day（　）	day（　）	day（　）	day（　）
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	注射用水	7.5	mL/㎡	点滴静注		●	●						
	アザシチジン	75	mg/㎡	点滴静注	10分	●	●						
3	注射用水	3	mL/㎡	皮下注				●					
	アザシチジン	75	mg/㎡	皮下注				●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L100H

診療科
レジメン名 ABVD療法
対象疾患名 ホジキンリンパ腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	25	mg/㎡		静注	day1、15
エクザール	6	mg/㎡	10mg	静注	day1、15
ブレオ	10	mg/㎡	15mg	静注	day1、15
ダカルバジン	375	mg/㎡		静注	day1、15

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	ドキソルビシン	25	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	エクザール	6	mg/㎡	点滴静注	全開	●	●						
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ブレオ	10	mg/㎡	点滴静注	全開	●	●						
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ダカルバジン	375	mg/㎡	点滴静注	15分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L110H

診療科
レジメン名 COPP療法
対象疾患名 ホジキンリンパ腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オンコビン	1.4	mg/㎡	静注	day1、8
エンドキサン	650	mg/㎡	静注	day1、8
プロカルバジン	100	mg/㎡	内服	day1～14
プレドニン	40	mg/㎡	内服	day1～14

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-7)	day(8)	day(9-14)	day( )	day( )	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●		●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●		●					
	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注	5分	●		●					
3	生食	500	mL	点滴静注		●		●					
	エンドキサン	650	mg/㎡	点滴静注	2時間	●		●					
	プロカルバジン	100	mg/㎡	内服		●	●	●	●				
	プレドニン	40	mg/㎡	内服		●	●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L120M

診療科
申請医師
レジメン名 R+BND療法
対象疾患名 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡	静注	day1
ベンダムスチン	90	mg/㎡	静注	day2、3

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●					
	カロナール	400	mg	内服		●					
1	生食	100	mL	点滴静注(メイン)		●					
2	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注(側管)	25mL/h	●					
	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注(側管)	100mL/h	●					
					200mL/h						
1	生食	50	mL	点滴静注				●			
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注			●	●			
	ベンダムスチン	90	mg/㎡	点滴静注	10分		●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L130M

診療科
申請医師
レジメン名 Bendamustine単独療法
対象疾患名 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベンダムスチン	120	mg/㎡	静注	day1、2

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	50	mL	点滴静注			●						
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ベンダムスチン	120	mg/㎡	点滴静注	10分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L140S

診療科
申請医師
レジメン名 ボルテゾミブ/デキサメタゾン(3W)療法(静注)
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	静注	day1、4、8、11
レナデックス	20	mg/body	内服	day1、2、4、5、8、9、11、12

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(4)	day(5)	day(8)	day(9)	day(11)	day(12)
1	生食	50	mL	点滴静注	30分	●		●		●		●	
2	ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	点滴静注	1分	●		●		●		●	
	生食	1.3	mL/㎡	点滴静注		●		●		●		●	
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 L141S

診療科
申請医師
レジメン名 ボルテゾミブ/デキサメタゾン(3W)療法(皮下注)
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注	day1、4、8、11
レナデックス	20	mg/body	内服	day1、2、4、5、8、9、11、12

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(4)	day(5)	day(8)	day(9)	day(11)	day(12)
1	ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●		●		●	
	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●		●		●	
2	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 L142S

診療科
申請医師
レジメン名 ボルテゾミブ(3W)療法（皮下注）
対象疾患名 マントル細胞リンパ腫
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベルケイド	1.3	mg/㎡	皮下注	day1、4、8、11

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(4)	day(8)	day(11)	day( )	day( )	day( )	day( )
1	ベルケイド	1.3	mg/㎡	皮下注		●	●	●	●				
	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●	●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L150S

診療科
レジメン名 ボルテゾミブ/デキサメタゾン(5W)療法(静注)
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	静注	day1、8、15、22
レナデックス	20	mg/body	内服	day1、2、8、9、15、16、22、23

投与周期 35日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)
1	生食	50	mL	点滴静注	30分	●		●		●		●	
2	ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	点滴静注	1分	●		●		●		●	
	生食	1.3	mL/㎡	点滴静注		●		●		●		●	
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 L151S

診療科
レジメン名 ボルテゾミブ/デキサメタゾン(5W)療法(皮下注)
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注	day1、8、15、22
レナデックス	20	mg/body	内服	day1、2、8、9、15、16、22、23

投与周期 35日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)
1	ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●		●		●	
	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●		●		●	
2	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 L152S

診療科
レジメン名 VCD療法
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注	day1、8、15、22
エンドキサン			内服	
デカドロン	40	mg/body	内服	day1-4、9-12、17-20

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-4)	day(8)	day(9-12)	day(15)	day(17-20)	day(22)	day( )
1	ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●		●		●	
	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●		●		●	
2	エンドキサン			内服									
3	デカドロン	40	mg/body	内服		●	●		●		●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L160H

診療科
申請医師
備考欄
レジメン名 ESHAP療法
対象疾患名 再発性非ホジキンリンパ腫
治療目的
治療内容

薬品名	標準投与	単位	投与経路	投与日
ラステット	40	mg/㎡	静注	day1、2、3、4
シスプラチン	25	mg/㎡	静注	day1、2、3、4
キロサイド	2000	mg/㎡	静注	day5
ソル・メドロール	250	mg/body	静注	day1、2、3、4、5

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-4)	day(5)	day( )	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●			
	ソル・メドロール	250	mg/body	点滴静注	15分	●	●	●			
3	生食	250	mL	点滴静注		●	●				
	ラステット	40	mg/㎡	点滴静注	1時間	●	●				
4	生食	500	mL	点滴静注		●	●				
	シスプラチン	25	mg/㎡	点滴静注	24時間	●	●				
5	生食	500	mL	点滴静注				●			
	キロサイド	2000	mg/㎡	点滴静注	2時間			●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L161H

診療科
レジメン名 R-ESHAP療法
対象疾患名 再発性非ホジキンリンパ腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡	静注	day1
ラステット	40	mg/㎡	静注	day2、3、4、5
シスプラチン	25	mg/㎡	静注	day2、3、4、5
キロサイド	2000	mg/㎡	静注	day6
ソル・メドロール	250	mg/body	静注	day2、3、4、5、6

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3-5)	day(6)	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25mL/hr	●							
	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注	100mL/hr	●							
					200mL/hr								
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
2	生食	100	mL	点滴静注			●	●	●				
	ソル・メドロール	250	mg/body	点滴静注	15分		●	●	●				
3	生食	250	mL	点滴静注			●	●					
	ラステット	40	mg/㎡	点滴静注	1時間		●	●					
4	生食	500	mL	点滴静注			●	●					
	シスプラチン	25	mg/㎡	点滴静注	24時間		●	●					
5	生食	500	mL	点滴静注					●				
	キロサイド	2000	mg/㎡	点滴静注	2時間				●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L170M

診療科
レジメン名 CAG(G:ノイトロジン)療法
対象疾患名 骨髄異型成症候群(MDS)
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キロサイド	20	mg/㎡	静注	day1～14
アクラシノン	14	mg/㎡	静注	day1～4
ノイトロジン	5	μg/kg	静注	day1～14

投与周期 17日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-4)	day(5-14)	day(	day(	day(	day(	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●								
1	生食	100	mL	点滴静注				●						
	プリンペラン	1	A	点滴静注	30分			●						
2	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●						
	キロサイド	20	mg/㎡	点滴静注	24時間	●	●	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●						
	ノイトロジン	5	μg/kg	点滴静注	24時間	●	●	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●							
	アクラシノン	14	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L180M

診療科
レジメン名 CAG(G:グラン)療法
対象疾患名 骨髄異型成症候群(MDS)
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キロサイド	20	mg/㎡	静注	day1～14
アクラシノン	14	mg/㎡	静注	day1～4
フィルグラスチム	200	μg/㎡	静注	day1～14

投与周期 17日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-4)	day(5-14)	day(	day(	day(	day(	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●								
1	生食	100	mL	点滴静注				●						
	プリンペラン	1	A	点滴静注	30分			●						
2	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●						
	キロサイド	20	mg/㎡	点滴静注	24時間	●	●	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●						
	フィルグラスチムBS	200	μg/㎡	点滴静注	24時間	●	●	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●							
	アクラシノン	14	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L210S

診療科
レジメン名 ネララビン療法
対象疾患名 難治再発性T細胞リンパ腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アラノンジー	1500	mg/㎡	点滴静注	day1、3、5

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(3)	day(5)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ	1	V	点滴静注	15分	●							
2	アラノンジー	1500	mg/㎡	点滴静注	2時間	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L740L

診療科
申請医師
レジメン名 Brentuximab Vedotin (BV)療法
対象疾患名 CD30陽性ホジキンリンパ腫、未分化大細胞リンパ腫
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注	15分	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●						
	注射用水	0.36	mL/kg	点滴静注		●						
	アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L750S

診療科
レジメン名 モガムリズマブ単独療法
対象疾患名 CCR4陽性T細胞リンパ腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ポテリジオ	1	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22,29,36,43,50

投与周期 56日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day(29)	day(36)	day(43)	day(50)
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●
	カロナール	400	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●
	プレドニン	25	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●	●	●
	生食	250	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●	●	●
3	ポテリジオ	1	mg/kg	点滴静注	2時間	●	●	●	●	●	●	●	●

レジメン記入フォーマット

登録番号 L800M

診療科
レジメン名 AI療法
対象疾患名 軟部肉腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキソルビシン	30	mg/㎡	点滴静注	day1-2
イホマイド	2	g/㎡	点滴静注	day1-5

投与周期 21日
休薬

Rp	投与予定時間	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day( )	day( )	day( )
1	10:15～10:30	生食	100	mL	点滴静注			●						
		パロノセトロンバ	0.75	mg	点滴静注		●							
		デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●	●						
2	10:30～12:30	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
		ドキソルビシン	30	mg/㎡	点滴静注	2時間	●	●						
3	12:30～16:30	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
		イホマイド	2	g/㎡	点滴静注	4時間	●	●	●	●	●			
4	12:30～13:00	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
		ウロミテキサン	800	mg	点滴静注	30分	●	●	●	●	●			
5	16:30～17:00	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
		ウロミテキサン	800	mg	点滴静注	30分	●	●	●	●	●			
5	20:30～21:00	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
		ウロミテキサン	800	mg	点滴静注	30分	●	●	●	●	●			

投与開始日
服薬指導 **有□** **無□**

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 L860S

診療科
申請医師
レジメン名 KLd療法(1サイクル目)
対象疾患名 再発・難治性多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	20	mg/㎡	点滴静注	day1,2
カイプロリス	27	mg/㎡	点滴静注	day8,9,15,16
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(21)	day(22)
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●		
2	生食	50	mL	点滴静注			●		●		●		
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分		●		●		●		
3	5% 糖液	50	mL	点滴静注		●	●						
	注射用水	10	mL/㎡	点滴静注		●	●						
	カイプロリス	20	mg/㎡	点滴静注	10分	●	●						
3	5% 糖液	50	mL	点滴静注				●	●	●	●		
	注射用水	13.5	mL/㎡	点滴静注				●	●	●	●		
	カイプロリス	27	mg/㎡	点滴静注	10分			●	●	●	●		
4	レナデックス	40	mg/body	内服		●		●		●			●
5	レブラミド	25	mg/body	内服		←		day 1 - 21 連日経口投与			→		

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 L861S

診療科
申請医師
レジメン名 KLd療法(2-12サイクル目)
対象疾患名 再発・難治性多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	27	mg/㎡	点滴静注	day1,2,8,9,15,16
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(21)	day(22)
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●		
2	生食	50	mL	点滴静注			●		●		●		
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分		●		●		●		
3	5% 糖液	50	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●		
	注射用水	13.5	mL/㎡	点滴静注		●	●	●	●	●	●		
	カイプロリス	27	mg/㎡	点滴静注	10分	●	●	●	●	●	●		
4	レナデックス	40	mg/body	内服		●		●		●			●
5	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →							

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 L862S

診療科
申請医師
レジメン名 KLd療法(13サイクル目以降)
対象疾患名 再発・難治性多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	27	mg/㎡	点滴静注	day1,2,15,16
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(15)	day(16)	day(21)	day(22)	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●		●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注			●			●			
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分		●			●			
3	5% 糖液	50	mL	点滴静注		●	●		●	●			
	注射用水	13.5	mL/㎡	点滴静注		●	●		●	●			
	カイプロリス	27	mg/㎡	点滴静注	10分	●	●		●	●			
4	レナデックス	40	mg/body	内服		●		●	●			●	
5	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →							

投与開始日
服薬指導 有□ 無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 L870S

診療科
申請医師
レジメン名 E-Ld療法(1,2サイクル目)
対象疾患名 再発・難治性多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エムプリシティ	10	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
デカドロン	6.6	mg/body	点滴静注	day1,8,15,22
レナデックス	28	mg/body	内服	day1,8,15,22

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●	●		●			
	カロナール	400	mg	内服		●	●	●		●			
1	レナデックス	28	mg/body	内服		●	●	●		●			
	(ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与3-24時間前まで)												
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●			
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●		●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●		●			
	(ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与45分前まで)												
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●			
5	生食	230	mL	点滴静注	0.5ml/分	●	●	●		●			
	注射用水	0.4	mL/㎡	点滴静注	1ml/分	●	●	●		●			
	エムプリシティ	10	mg/kg	点滴静注	2ml/分	●	●	●		●			
6	レブラミド	25	mg/body	内服		←― day 1 - 21 連日経口投与 ―→							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L871S

診療科
レジメン名 E-Ld療法(3サイクル目以降)
対象疾患名 再発・難治性多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エムプリシティ	10	mg/kg	点滴静注	day1,15
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
デキサート	8	mg/body	点滴静注	day1,15
レナデックス	28	mg/body	内服	day1,15
レナデックス	40	mg/body	内服	day8,22

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●		●					
	カロナール	400	mg	内服		●		●					
1	レナデックス	28	mg/body	内服		●		●					
	(ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与3-24時間前まで)												
1	レナデックス	40	mg/body	内服			●			●			
	(ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与3-24時間前まで)												
2	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●					
	(ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与45分前まで)												
4	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
5	生食	230	mL	点滴静注		●		●					
	注射用水	0.4	mL/㎡	点滴静注		●		●					
	エムプリシティ	10	mg/kg	点滴静注	2ml/分	●		●					
6	レブラミド	25	mg/body	内服		←― day 1 - 21 連日経口投与 ―→							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L880M

診療科
レジメン名 FCR
対象疾患名 慢性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
フルダラ	25	mg/㎡	点滴静注	day2-4
エンドキサン	250	mg/㎡	点滴静注	day2-4

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	6時間	●	●	●	●				
2	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●							
3	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注	15分		●	●	●				
3	生食	100	mL	点滴静注			●	●	●				
	注射用水	1.25	mL/㎡	点滴静注			●	●	●				
	フルダラ	25	mg/㎡	点滴静注	30分		●	●	●				
4	生食	250	mL	点滴静注			●	●	●				
	エンドキサン	250	mg/㎡	点滴静注	1時間		●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L890S

診療科
申請医師
レジメン名 オファツムマブ 初回
対象疾患名 再発または難治性のCD20陽性の慢性リンパ性白血病
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アーゼラ	300	mg/body	点滴静注	day1

備考欄

投与周期 7日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ソル・コーテフ	100	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	985	mL	点滴静注		●							
	アーゼラ	300	mg/body	点滴静注	12→400mL/hr	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L891S

診療科
申請医師
レジメン名 オファツムマブ 2～8回目
対象疾患名 再発または難治性のCD20陽性の慢性リンパ性白血病
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アーゼラ	2000	mg/body	点滴静注	day1

備考欄

投与周期 7日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ソル・コーテフ	100	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	900	mL	点滴静注		●							
	アーゼラ	2000	mg/body	点滴静注	12→400mL/hr	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L892S

診療科
申請医師
レジメン名 オファツムマブ 9～12回目
対象疾患名 再発または難治性のCD20陽性の慢性リンパ性白血病
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アーゼラ	2000	mg/body	点滴静注	day1

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ソル・コーテフ	100	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	900	mL	点滴静注		●							
	アーゼラ	2000	mg/body	点滴静注	12→400mL/hr	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L900S

診療科
申請医師
レジメン名 alemtuzumab (3mg)
対象疾患名 再発・難治性CLL
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
マブキャンパス	3	mg/body	点滴静注	連日

備考欄

投与周期 7日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	
	カロナール	400	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●	●	
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●	●	
	マブキャンパス	3	mg/body	点滴静注	2時間	●	●	●	●	●	●	●	

レジメン記入フォーマット

登録番号 L901S

診療科
申請医師
レジメン名 alemtuzumab (10mg)
対象疾患名 再発・難治性CLL
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
マブキャンパス	10	mg/body	点滴静注	連日

備考欄

投与周期 7日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	
	カロナール	400	mg	内服		●	●	●	●	●	●	●	
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●	●	
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●	●	
	マブキャンパス	10	mg/body	点滴静注	2時間	●	●	●	●	●	●	●	

レジメン記入フォーマット

登録番号 L902S

診療科
申請医師
レジメン名 alemtuzumab (30mg)
対象疾患名 再発・難治性CLL
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
マブキャンパス	30	mg/body	点滴静注	day1,3,5

備考欄

投与周期 7日
休薬 2日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●		●		●			
	カロナール	400	mg	内服		●		●		●			
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●		●			
2	生食	100	mL	点滴静注		●		●		●			
	マブキャンパス	30	mg/body	点滴静注	2時間	●		●		●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L910M

診療科
申請医師
レジメン名 CHASER
対象疾患名 再発・難治性の悪性リンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
エンドキサン	1200	mg/㎡	点滴静注	day3
キロサイド	2	g/㎡	点滴静注	day4-5
ラステット	100	mg/㎡	点滴静注	day3-5
デカドロン	33	mg/body	点滴静注	day3-5

投与周期 21日
休薬 16日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●						
	カロナール	400	mg	内服		●						
1	生食	500	mL	点滴静注	6時間	●						
3	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●						
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●						
4	ソルデム6	2000	mL	持続点滴			●	●				
	メイロン 7%	80	mL	持続点滴	24時間		●	●				
5	生食	50	mL	点滴静注					●	●		
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注				●				
	デカドロン	33	mg	点滴静注	15分			●	●	●		
6	生食	1000	mL	持続点滴	24時間				●	●		
7	生食	500	mL	点滴静注				●				
	エンドキサン	1200	mg/㎡	点滴静注	3時間			●				
8	生食	250	mL	点滴静注				●	●	●		
	ラステット	100	mg/㎡	点滴静注	1時間			●	●	●		
9	生食	500	mL	点滴静注					●	●		
	キロサイド	2	g/㎡	点滴静注	3時間				●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L930L

診療科
申請医師
レジメン名 プララトレキサート単独療法
対象疾患名 再発・難治性末梢性T細胞リンパ腫
治療目的
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ジフォルタ	30	mg/㎡	点滴静注	day1,8,15,22,29,36

投与周期 49日
休薬 14日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day(29)	day(36)	day( )	day( )
1	グラニセトロンバッグ1mg	1	袋	点滴静注	15分	●	●	●	●	●	●		
2	生食	30	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●		
	ジフォルタ	30	mg/㎡	点滴静注	3～5分	●	●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L940S

診療科
申請医師
レジメン名 gemtuzumab ozogamicin
対象疾患名 再発性急性骨髄性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
マイロターグ	9	mg/㎡	点滴静注	day1,15

投与周期 15日
休薬 0日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●						
	カロナール	400	mg	内服		●	●						
1	生食	100	mL		フラッシュ	●	●						
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	注射用水	9	mL/㎡	点滴静注		●	●						
	マイロターグ	9	mg/㎡	点滴静注	2時間	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L950M

診療科
レジメン名 JLSG-02 Induction A
対象疾患名 Langerhans cell histiocytosis
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
キロサイド	100	mg/㎡		点滴静注	day1-5,15-19,29-33
オンコビン	0.05	mg/kg	2mg	点滴静注	day1,15,29
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day1-28
プレドニン	1	mg/kg	60mg/day	内服	day29-35
プレドニン	0.5	mg/kg	60mg/day	内服	day36-42

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-5)	day(6-14)	day(15)	day(16-19)	day(20-28)	day(29)	day(30-33)	day(34-35)	day(36-42)
1	パロノセトロンバ	0.75	mg	点滴静注	15分	●			●			●			
2	生食	50	mL	点滴静注		●			●			●			
	オンコビン	0.05	mg/kg	点滴静注	5分	●			●			●			
3	生食	500	mL	点滴静注		●	●		●	●		●	●		
	キロサイド	100	mg/㎡	点滴静注	6時間	●	●		●	●		●	●		
	プレドニン	2	mg/kg	内服		●	●	●	●	●	●				
	プレドニン	1	mg/kg	内服								●	●	●	
	プレドニン	0.5	mg/kg	内服											●

レジメン記入フォーマット

登録番号 L951M

診療科
レジメン名 JLSG-02 Maintenance A
対象疾患名 Langerhans cell histiocytosis
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
キロサイド	150	mg/㎡		点滴静注	day1
オンコビン	0.05	mg/kg	2mg	点滴静注	day1
メソトレキセート	1	mg/kg		点滴静注	day15
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day1-4
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day15-17

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-4)	day(15)	day(16)	day(17)	day( )	day( )	day( )	day( )
1	グラニセトロンバック	1	mg	点滴静注	15分	●		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●		●						
	オンコビン	0.05	mg/kg	点滴静注	5分	●		●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●								
	キロサイド	150	mg/㎡	点滴静注	2時間	●								
	プレドニン	2	mg/kg	内服		●	●	●	●	●				
	メソトレキセート	1	mg/kg	内服				●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L952M

診療科
レジメン名 JLSG-02 Maintenance C
対象疾患名 Langerhans cell histiocytosis
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
エクザール	6	mg/㎡	6mg	点滴静注	day1
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day1-5
メソトレキセート	20	mg/㎡		内服	day15
ロイケリン	1.5	mg/kg		内服	day1-28

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-5)	day(6-14)	day(15)	day(16-28)	day( )	day( )	day( )
1	グラニセトロンバック	1	mg	点滴静注	15分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	エクザール	6	mg/㎡	点滴静注	5分	●							
	プレドニン	2	mg/kg			●	●						
	メソトレキセート	20	mg/㎡						●				
	ロイケリン	1.5	mg/kg			●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L970H

診療科
レジメン名 G-CHOP（1サイクル目）
対象疾患名 CD20陽性濾胞性リンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1,8,15
ドキソルビシン	50	mg/㎡		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3-6)	day(8)	day(15)	day(　)	day(　)	day(　)
1	生食	100	mL		フラッシュ	●	●		●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注		●			●	●			
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●			●	●			
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●			●	●			
3	アタラックスP	25	mg	内服		●			●	●			
	カロナール	400	mg	内服		●			●	●			
4	生食	210	mL	点滴静注		●			●	●			
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●			●	●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L971H

診療科
レジメン名 G-CHOP（2サイクル目以降）
対象疾患名 CD20陽性濾胞性リンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1
ドキソルビシン	50	mg/㎡		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day（1）	day（2）	day（3-6）	day（　）	day（　）	day（　）	day（　）	day（　）
1	生食	100	mL		フラッシュ	●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
3	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
4	生食	210	mL	点滴静注		●							
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→225mL/hr	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
4	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
5	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注			●						
	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L972S

診療科
レジメン名 GAZYVA（維持療法）
対象疾患名 CD20陽性濾胞性リンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	day1

投与周期 56日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day（1）	day（　）	day（　）	day（　）	day（　）	day（　）	day（　）	day（　）
1	生食	100	mL		フラッシュ	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
3	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
4	生食	210	mL	点滴静注		●							
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→225mL/hr	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L980M

診療科
レジメン名 G-B (1サイクル目)
対象疾患名 CD20陽性濾胞性リンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	day1,8,15
ベンダムスチン	90	mg/㎡	点滴静注	day2,3

投与周期 28日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(8)	day(15)	day(　)	day(　)	day(　)
1	生食	100	mL		フラッシュ	●	●	●	●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注		●			●	●			
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●			●	●			
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●			●	●			
3	アタラックスP	25	mg	内服		●			●	●			
	カロナール	400	mg	内服		●			●	●			
4	生食	210	mL	点滴静注		●			●	●			
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●			●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注				●					
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	ベンダムスチン	90	mg/㎡	点滴静注	10分		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L981M

診療科
レジメン名 G-B (2サイクル目以降)
対象疾患名 CD20陽性濾胞性リンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	day1
ベンダムスチン	90	mg/㎡	点滴静注	day2,3

投与周期 28日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(　)	day(　)	day(　)	day(　)	day(　)
1	生食	100	mL		フラッシュ	●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
3	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
4	生食	210	mL	点滴静注		●							
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→225mL/hr	●							
2	生食	50	mL	点滴静注				●					
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	ベンダムスチン	90	mg/㎡	点滴静注	10分		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1000M

診療科
申請医師
レジメン名 ドキソルビシン単剤
対象疾患名 悪性軟部肉腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキソルビシン	75	mg/㎡	持続静注	day1

備考欄

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	75	mg/㎡	点滴静注	30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1010H

診療科
レジメン名 A+AVD療法
対象疾患名 ホジキンリンパ腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
アドセトリス	1.2	mg/kg		静注	day1、15
ドキソルビシン	25	mg/㎡		静注	day1、15
エクザール	6	mg/㎡	10mg	静注	day1、15
ダカルバジン	375	mg/㎡		静注	day1、15

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●						
	デカドロン注	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	ドキソルビシン	25	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●						
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	エクザール	6	mg/㎡	点滴静注	全開	●	●						
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ダカルバジン	375	mg/㎡	点滴静注	15分	●	●						
6	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
7	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	注射用水	0.24	mL/kg	点滴静注		●	●						
	アドセトリス	1.2	mg/kg	点滴静注	30分	●	●						

レジメン記入ファーマット

登録番号 L1020S

診療科
申請医師
レジメン名 Nivolumab単剤（ホジキンリンパ腫)(2W)
対象疾患名 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オプジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 14日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オプジーボ	240	mg/body	点滴静注	30分	●							

レジメン記入ファーマット

登録番号 L1030S

診療科
申請医師
レジメン名 Pembrolizumab単剤（ホジキンリンパ腫)(3W)
対象疾患名 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1

備考欄

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1044S

診療科
申請医師
レジメン名 D-Ld療法（皮下注1-2サイクル目）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1,8,15,22
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

備考欄

投与周期
休薬 28日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(21)	day(22)	day(23)
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●		●		●			●	
	カロナール	400	mg/body	内服		●		●		●			●	
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●		●	●
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●		●		●			●	
2	レブラミド	25	mg/body	内服		←		day 1 - 21 連日経口投与					→	

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1045S

診療科
申請医師
レジメン名 D-Ld療法（皮下注3-6サイクル目）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1,15
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

備考欄

投与周期
休薬 28日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(21)	day(22)	day(23)
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●				●				
	カロナール	400	mg/body	内服		●				●				
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●		●	●
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●				●				
2	レブラミド	25	mg/body	内服		←		day 1 - 21	連日経口投与			→		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1046S

診療科 | 申請医師

レジメン名 D-Ld療法（皮下注7サイクル目以降）

対象疾患名 多発性骨髄腫

治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

備考欄

投与周期

休薬 28日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(21)	day(22)	day(23)
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●								
	カロナール	400	mg/body	内服		●								
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●		●	●
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●								
2	レブラミド	25	mg/body	内服		≪		day 1 - 21 連日経口投与				→		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1054S

診療科
申請医師
レジメン名 D-Bd療法（皮下注1-3サイクル目）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1,8,15
ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注	day1,4,8,11
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,4,5,8,9,11,12,15

備考欄

投与周期
休薬 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(4)	day(5)	day(8)	day(9)	day(11)	day(12)	day(15)
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●				●				●
	カロナール	400	mg/body	内服		●				●				●
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●				●				●
2	ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●		●		●		
	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●		●		●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1055S

診療科
申請医師
レジメン名 D-Bd療法（皮下注4-8サイクル目）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1
ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注	day1,4,8,11
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,4,5,8,9,11,12

備考欄

投与周期
休薬 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(4)	day(5)	day(8)	day(9)	day(11)	day(12)	day(15)
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●								
	カロナール	400	mg/body	内服		●								
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●								
2	ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●		●		●		
	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●		●		●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1056S

診療科
申請医師
レジメン名 D-Bd療法（皮下注9サイクル目以降）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1

備考欄

投与周期
休薬 28日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●						
	カロナール	400	mg/body	内服		●						
	レナデックス	20	mg/body	内服		●						
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1063S

診療科
申請医師
レジメン名 D-VMP療法（皮下注1サイクル目）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1,8,15,22,29,36
ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注	day1,4,8,11,22,25,29,32
アルケラン	9	mg/㎡	内服	day1-4
プレドニン	60	mg/㎡	内服	day2-4

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-3)	day(4)	day(8)	day(11)	day(15)	day(22)	day(25)	day(29)	day(32)	day(36)
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●			●		●	●		●		●
	カロナール	400	mg/body	内服		●			●		●	●		●		●
	レナデックス	20	mg/body	内服		●			●		●	●		●		●
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●			●		●	●		●		●
2	ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●	●	●		●	●	●	●	
	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●	●	●		●	●	●	●	
3	アルケラン	9	mg/㎡	内服		●	●	●								
4	プレドニン	60	mg/㎡	内服			●	●								

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1064S

診療科
申請医師
レジメン名 D-VMP療法（皮下注2-9サイクル目）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1,22
ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注	day1,8,22,29
アルケラン	9	mg/㎡	内服	day1-4
プレドニン	60	mg/㎡	内服	day2-4

備考欄

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-3)	day(4)	day(8)	day(22)	day(29)	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●				●				
	カロナール	400	mg/body	内服		●				●				
	レナデックス	20	mg/body	内服		●				●				
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●				●				
2	ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注		●			●	●	●			
	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●			●	●	●			
	アルケラン	9	mg/㎡	内服		●	●	●						
	プレドニン	60	mg/㎡	内服			●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1065S

診療科
申請医師
レジメン名 D-VMP療法（皮下注10サイクル目以降）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●							
	カロナール	400	mg/body	内服		●							
	レナデックス	20	mg/body	内服		●							
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1070S

診療科
レジメン名 AraC単剤
対象疾患名 ランゲルハンス細胞組織球症
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キロサイド	100	mg/㎡	点滴静注	day1-5

投与周期 30日
休薬

Rp	薬品名・規格	標準投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
	キロサイド	100	mg/㎡	点滴静注	6時間	●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1080S

診療科
レジメン名 VLB+PSL（導入）
対象疾患名 造血器腫瘍
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エクザール	6	mg/㎡	点滴静注	day1,8,15,22, 29,36
プレドニン	40	mg/㎡	内服	day1-28

投与周期 56日
休薬

Rp	薬品名・規格	標準投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day(28)	day(29)	day(36)
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●		●	●
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●		●	●
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●		●	●
	エクザール	6	mg/㎡	点滴静注	5分	●	●	●	●		●	●
	プレドニン	40	mg/㎡	内服		← day 1 - 28 連日経口投与 →						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1081S

診療科
レジメン名 VLB+PSL(維持)
対象疾患名 造血器腫瘍
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エクザール	6	mg/㎡	点滴静注	day1
プレドニン	40	mg/㎡	内服	day1-5

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	標準投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-5)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	エクザール	6	mg/㎡	点滴静注	5分	●						
	プレドニン	40	mg/㎡	内服		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1090H

診療科
レジメン名 CEOP
対象疾患名 非ホジキンリンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ラステット	50	mg/㎡		点滴静注	day1
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴静注	day1
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴静注	day1
プレドニン	100	mg/body		内服	day1-5
ラステット	100	mg/㎡		内服	day2-3

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(　)	day(　)	day(　)
1	生食	100	mL		フラッシュ	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	500	mL	点滴静注		●							
	ラステット	50	mg/㎡	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注	全開	●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注	2時間	●							
	ラステットCap	100	mg/㎡	内服			●	●					
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1091H

診療科
レジメン名 R-CEOP
対象疾患名 非ホジキンリンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ラステット	50	mg/㎡		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
リツキシマブBS	375	mg/㎡		点滴静注	day1
	1mg/mLに調整				
ラステット	100	mg/㎡		内服	day3-4

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(　)	day(　)
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●							
1	生食	100	mL		フラッシュ		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	生食	500	mL	点滴静注			●						
	ラステット	50	mg/㎡	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●						
	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注	全開		●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注	2時間		●						
	ラステットCap	100	mg/㎡	内服				●	●				
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1092H

診療科
レジメン名 G-CEOP（1サイクル目）
対象疾患名 非ホジキンリンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1,8,15
ラステット	50	mg/㎡		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
ラステット	100	mg/㎡		内服	day3-4

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(8)	day(15)
1	生食	100	mL		フラッシュ	●	●					●	●
2	生食	50	mL	点滴静注		●						●	●
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●						●	●
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●						●	●
3	アタラックスP	25	mg	内服		●						●	●
	カロナール	400	mg	内服		●						●	●
4	生食	210	mL	点滴静注		●						●	●
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●						●	●
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	生食	500	mL	点滴静注			●						
	ラステット	50	mg/㎡	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●						
	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注	全開		●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注	2時間		●						
	ラステットCap	100	mg/㎡	内服				●	●				
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1093H

診療科
レジメン名 G-CEOP（2サイクル目以降）
対象疾患名 非ホジキンリンパ腫
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1
ラステット	50	mg/㎡		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
ラステット	100	mg/㎡		内服	day3-4

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(　)	day(　)
1	生食	100	mL		フラッシュ	●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
3	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
4	生食	210	mL	点滴静注		●							
	ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→225mL/hr	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
3	生食	500	mL	点滴静注			●						
	ラステット	50	mg/㎡	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	点滴静注			●						
	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注	全開		●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注	2時間		●						
	ラステットCap	100	mg/㎡	内服				●	●				
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1100H

診療科
申請医師
備考欄
レジメン名 A+CHP
対象疾患名 未治療のCD30陽性末梢性T細胞リンパ腫
治療目的
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴静注	day1
ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注	day1
エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注	day1
プレドニン	100	mg/body	内服	day1-5

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.36	mL/kg	点滴静注		●							
	アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注	30分	●							
7	生食	500	mL	点滴静注		●							
	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注	2時間	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1130M

診療科
レジメン名 Venetoclax+Azacitidine（静注）
対象疾患名 急性骨髄性白血病
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アザシチジン	75	mg/㎡	静注	day1-7
ベネトクラクス			内服	

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-7)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	注射用水	7.5	mL/㎡	点滴静注		●	●						
	アザシチジン	75	mg/㎡	点滴静注	10分	●	●						
	ベネクレクスタ錠			内服		100→200→400mg/day							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1131M

診療科
レジメン名 Venetoclax+Azacitidine（皮下注）
対象疾患名 急性骨髄性白血病
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アザシチジン	75	mg/㎡	皮下注	day1-7
ベネトクラクス			内服	

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-7)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
2	注射用水	3	mL/㎡	皮下注		●	●						
	アザシチジン	75	mg/㎡	皮下注		●	●						
	ベネクレクスタ錠			内服									

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1140M

診療科
レジメン名 Special C
対象疾患名 Adults Langerhans cell histiocytosis
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
エクザール	6	mg/㎡	6mg	点滴静注	day1
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day1-5
メソトレキセート	20	mg/㎡		内服	day15
ロイケリン	1.5	mg/kg		内服	day1-28

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-5)	day(6-14)	day(15)	day(16-28)	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL		フラッシュ	●							
2	グラニセトロンバック	1	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	エクザール	6	mg/㎡	点滴静注	5分	●							
	プレドニン	2	mg/kg			●	●						
	メソトレキセート	20	mg/㎡						●				
	ロイケリン	1.5	mg/kg			●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1150S

診療科
申請医師
レジメン名 inotuzumab ozogamicin（1サイクル目）
対象疾患名 再発または難治性CD22陽性の急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベスポンサ	0.8	mg/㎡	点滴静注	day1
ベスポンサ	0.5	mg/㎡	点滴静注	day8,15

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●	●					
	カロナール	400	mg	内服		●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	メイン	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
	ソル・メドロール	125	mg	点滴静注	30分	●	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	注射用水	3.2	mL/㎡	点滴静注		●							
	ベスポンサ	0.8	mg/㎡	点滴静注	1時間	●							
3	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	注射用水	2	mL/㎡	点滴静注			●	●					
	ベスポンサ	0.5	mg/㎡	点滴静注	1時間		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1151S

診療科
申請医師
レジメン名 inotuzumab ozogamicin（非寛解：2-6サイクル目）
対象疾患名 再発または難治性CD22陽性の急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベスポンサ	0.8	mg/㎡	点滴静注	day1
ベスポンサ	0.5	mg/㎡	点滴静注	day8,15

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●	●					
	カロナール	400	mg	内服		●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	メイン	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
	ソル・メドロール	125	mg	点滴静注	30分	●	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	注射用水	3.2	mL/㎡	点滴静注		●							
	ベスポンサ	0.8	mg/㎡	点滴静注	1時間	●							
3	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	注射用水	2	mL/㎡	点滴静注			●	●					
	ベスポンサ	0.5	mg/㎡	点滴静注	1時間		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1152S

診療科
申請医師
レジメン名 inotuzumab ozogamicin（寛解：2-6サイクル目）
対象疾患名 再発または難治性CD22陽性の急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベスポンサ	0.5	mg/㎡	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●	●					
	カロナール	400	mg	内服		●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	メイン	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
	ソル・メドロール	125	mg	点滴静注	30分	●	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	注射用水	3.2	mL/㎡	点滴静注		●	●	●					
	ベスポンサ	0.5	mg/㎡	点滴静注	1時間	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1170S

診療科
申請医師
レジメン名 Isa-Pd療法（1コース目）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
ポマリスト	4	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●	●	●		●				
	カロナール	400	mg/body	内服		●	●	●		●				
	ファモチジン	20	mg/body	内服		●	●	●		●				
	レナデックス	40	mg/body	内服		●	●	●		●				
	（サークリサ投与15-60分前までに）													
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●				
2	生食	250	mL	点滴静注		●	●	●		●				
	サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	175→400mg/h	●	●	●		●				
	ポマリスト	4	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →								

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1171S

診療科
申請医師
レジメン名 Isa-Pd療法（2コース目以降）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 □再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	day1,15
ポマリスト	4	mg/body	内服	day1-21
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●		●						
	カロナール	400	mg/body	内服		●		●						
	ファモチジン	20	mg/body	内服		●		●						
	レナデックス	40	mg/body	内服		●	●	●		●				
	（サークリサ投与15-60分前までに）													
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●		●						
	サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	175→400mg/h	●		●						
	ポマリスト	4	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →								

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1180M

診療科
申請医師
レジメン名 Pola+RB療法(1サイクル目)
対象疾患名 再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day2
ベンダムスチン	90	mg/㎡	点滴静注	day2、3

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●				
	カロナール	400	mg	内服		●	●				
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●			
2	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●					
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●					
3	生食	100	mL	点滴静注			●				
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注			●				
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90分		●				
4	生食	50	mL	点滴静注				●			
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●			
5	生食	50	mL	点滴静注			●	●			
	ベンダムスチン	90	mg/㎡	点滴静注	10分		●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1181M

診療科
申請医師
レジメン名 Pola+RB療法(2-6サイクル目)
対象疾患名 再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day1
ベンダムスチン	90	mg/㎡	点滴静注	day1、2

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●					
	カロナール	400	mg	内服		●					
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●				
2	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●					
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●					
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●	●				
4	生食	100	mL	点滴静注		●					
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注		●					
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●					
5	生食	50	mL	点滴静注			●				
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●				
6	生食	50	mL	点滴静注		●	●				
	ベンダムスチン	90	mg/㎡	点滴静注	10分	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1194S

診療科
レジメン名 DKd療法（皮下注1-2サイクル目）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1,8,15,22
カイプロリス	20	mg/㎡	点滴静注	day1,2
カイプロリス	56	mg/㎡	点滴静注	day8,9,15,16
レナデックス	40	mg/week	内服	day1,2,8,9,15,16,22

投与周期
休薬 28日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●		●		●		●		
	カロナール	400	mg/body	内服		●		●		●		●		
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●			
	レナデックス	40	mg/body	内服								●		
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●		●		●		●		
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
3	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●							
	注射用水	10	mL/㎡	点滴静注		●	●							
	カイプロリス	20	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●							
3	5% 糖液	100	mL	点滴静注				●	●	●	●			
	注射用水	28	mL/㎡	点滴静注				●	●	●	●			
	カイプロリス	56	mg/㎡	点滴静注	30分			●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1195S

診療科
申請医師
レジメン名 DKd療法（皮下注3-6サイクル目）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1,15
カイプロリス	56	mg/㎡	点滴静注	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	40	mg/week	内服	day1,2,8,9,15,16,22

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●				●				
	カロナール	400	mg/body	内服		●				●				
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●			
	レナデックス	40	mg/body	内服								●		
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●				●				
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
3	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
	注射用水	28	mL/㎡	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
	カイプロリス	56	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1196S

診療科
申請医師
レジメン名 DKd療法（皮下注7サイクル目以降）
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	day1
カイプロリス	56	mg/㎡	点滴静注	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	40	mg/week	内服	day1,2,8,9,15,16,22

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●								
	カロナール	400	mg/body	内服		●								
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●			
	レナデックス	40	mg/body	内服								●		
1	ダラキューロ	1800	mg/body	皮下注	3-5分	●								
2	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
3	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
	注射用水	28	mL/㎡	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
	カイプロリス	56	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1470H

診療科
レジメン名 Pola+R-CHP（1-6コース目）2日投与
対象疾患名 未治療のDLBCL
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
	1mg/mLに調整			
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day2
ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body	内服	day2-6

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day（1）	day（2）	day（3）	day（4）	day（5）	day（6）	day（　）	day（　）
0	アタラックスP	25	mg	内服		●	●						
	カロナール	400	mg	内服		●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●							
3	生食	100	mL	点滴静注			●						
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注			●						
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90→30分		●						
4	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ		●						
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
6	生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注			●						
7	生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注			●						
	プレドニン	100	mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1471H

診療科
レジメン名 Pola+R-CHP（2-6コース目）1日投与
対象疾患名 未治療のDLBCL
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
	1mg/mLに調整			
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day1
ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注	day1
エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注	day1
プレドニン	100	mg/body	内服	day1-5

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(　)	day(　)	day(　)
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注		●							
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
7	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注		●							
8	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注		●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1472S

診療科
レジメン名 Pola+R-CHP（7-8コース目）
対象疾患名 未治療のDLBCL
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
	1mg/mLに調整			

投与周期 21日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1480S

診療科
レジメン名 Venetoclax+LDAC（静注）
対象疾患名 急性骨髄性白血病
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キロサイド	20	mg/㎡	静注	day1-10
ベネトクラクス			内服	day1-28

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1-10)	day(11-28)	day(　　)	day(　　)	day(　　)	day(　　)	day(　　)	day(　　)
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	500	mL	点滴静注		●							
	キロサイド	20	mg/㎡	点滴静注	24時間	●							
	ベネクレクスタ錠			内服		100→200→400→600mg/day							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1481S

診療科
レジメン名 Venetoclax+LDAC（皮下注）
対象疾患名 急性骨髄性白血病
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キロサイド	20	mg/㎡	皮下注	day1-10
ベネトクラクス			内服	day1-28

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1-10)	day(11-28)	day(　　)	day(　　)	day(　　)	day(　　)	day(　　)	day(　　)
1	キロサイド	20	mg/㎡	皮下注		●							
	ベネクレクスタ錠			内服		100→200→400→600mg/day							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1550S

診療科
レジメン名 Isa-Kd療法(1サイクル目)
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
カイプロリス	20	mg/㎡	点滴静注	day1,2
カイプロリス	56	mg/㎡	点滴静注	day8,9,15,16
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●		●		●		●		
	カロナール	400	mg/body	内服		●		●		●		●		
	ファモチジン	20	mg/body	内服		●		●		●		●		
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	
	(サークリサ投与15-60分前までに)													
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●	●		
2	生食	250	mL	点滴静注		●		●		●		●		
	サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	175→400mg/h	●		●		●		●		
3	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●		●		●				
4	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●							
	注射用水	10	mL/㎡	点滴静注		●	●							
	カイプロリス	20	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●							
4	5% 糖液	100	mL	点滴静注				●	●	●	●			
	注射用水	28	mL/㎡	点滴静注				●	●	●	●			
	カイプロリス	56	mg/㎡	点滴静注	30分			●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1550S

診療科
レジメン名 Isa-Kd療法(2サイクル目以降)
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	day1,15
カイプロリス	56	mg/㎡	点滴静注	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●				●				
	カロナール	400	mg/body	内服		●				●				
	ファモチジン	20	mg/body	内服		●				●				
	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	
	(サークリサ投与15-60分前までに)													
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
2	生食	250	mL	点滴静注		●				●				
	サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	175→400mg/h	●				●				
3	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●				●				
4	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
	注射用水	28	mL/㎡	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
	カイプロリス	56	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1580S

診療科
レジメン名 BLd
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注	day1,4,8,11
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-14
レナデックス	20	mg/body	内服	day1,2,4,5,8,9,11,12

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(4)	day(5)	day(8)	day(9)	day(11)	day(12)	day(14)
1	ボルテゾミブ	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●		●		●		
	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●		●		●		
2	レブラミド	25	mg/body	内服		←			day 1 - 14 連日経口投与				→	
3	レナデックス	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1590S

診療科
申請医師
レジメン名 Elranatamab (C1)
対象疾患名 再発又は難治性の多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エルレフィオ	12	mg/body	皮下注	day1
エルレフィオ	32	mg/body	皮下注	day4
エルレフィオ	76	mg/body	皮下注	day8.15.22

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(4)	day(8)	day(15)	day(22)	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●	●	●					
	カロナール	750	mg/body	内服		●	●	●					
	デカドロン	20	mg/body	内服		●	●	●					
	(エルレフィオ投与60分前までに)												
1	エルレフィオ	12	mg/body	皮下注		●							
		32	mg/body	皮下注			●						
		76	mg/body	皮下注				●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1591S

診療科
申請医師
レジメン名 Elranatamab (C2-6)
対象疾患名 再発又は難治性の多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エルレフィオ	76	mg/body	皮下注	day1,8,15,22

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )
1	エルレフィオ	76	mg/body	皮下注		●	●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1592S

診療科
申請医師
レジメン名 Elranatamab (C7-)
対象疾患名 再発又は難治性の多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エルレフィオ	76	mg/body	皮下注	day1,15

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	エルレフィオ	76	mg/body	皮下注		●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1600S

診療科
申請医師
レジメン名 Epcoritamab (C1)
対象疾患名 再発又は難治性の大細胞型B細胞性リンパ腫,濾胞性リンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エプキンリ	0.16	mg/body	皮下注	day1
エプキンリ	0.8	mg/body	皮下注	day8
エプキンリ	48	mg/body	皮下注	day15.22

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-4)	day(8)	day(9-11)	day(15)	day(16-18)	day(22)	day(23-25)
0	アタラックスP	50	mg/body	内服		●		●		●		●	
	カロナール	800	mg/body	内服		●		●		●		●	
	(ｴﾌﾟｷﾝﾘ投与30-120分前までに)												
1	生食	50	mL	点滴静注		●		●		●		●	
	デカドロン	14.85	mg	点滴静注	15分	●		●		●		●	
2	生食	500	mL	点滴静注	90分	●		●		●		●	
3	生食	20	mL	皮下注		●		●					
	エプキンリ	0.16	mg/body	皮下注		●							
		0.8	mg/body	皮下注				●					
		48	mg/body	皮下注						●		●	
4	デカドロン	12	mg/body	内服			●		●		●		●

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1601S

診療科
申請医師
レジメン名 Epcoritamab (C2-3)
対象疾患名 再発又は難治性の大細胞型B細胞性リンパ腫,濾胞性リンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エプキンリ	48	mg/body	皮下注	day1,8,15.22

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )
1	エプキンリ	48	mg/body	皮下注		●	●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1602S

診療科
申請医師
レジメン名 Epcoritamab (C4-9)
対象疾患名 再発又は難治性の大細胞型B細胞性リンパ腫,濾胞性リンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エプキンリ	48	mg/body	皮下注	day1,15

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	エプキンリ	48	mg/body	皮下注		●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1603S

診療科
申請医師
レジメン名 Epcoritamab (C10-)
対象疾患名 再発又は難治性の大細胞型B細胞性リンパ腫,濾胞性リンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エプキンリ	48	mg/body	皮下注	day1

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	エプキンリ	48	mg/body	皮下注		●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1630M

診療科
申請医師
レジメン名 DCyBorD療法(1-2サイクル目)Cy点滴
対象疾患名 全身性ALアミロイドーシス
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg	皮下注	day1,8,15,22
エンドキサン	300	mg/㎡	点滴静注	day1,8,15,22
ベルケイド	1.3	mg/㎡	皮下注	day1,8,15,22
デカドロン	20	mg	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日間
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)		
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●		●		●		●			
	カロナール	400	mg/body	内服		●		●		●		●			
	デカドロン	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●		
	(ダラキューロ投与1時間前までに)														
1	ダラキューロ	1800	mg	皮下注	3-5分	●		●		●		●			
2	生食	100	mL	点滴静注		●		●		●		●			
3	グラニセトロンバッ	1	mg	点滴静注	15分	●		●		●		●			
4	生食	100	mL	点滴静注		●		●		●		●			
	エンドキサン	300	mg/㎡	点滴静注	30分	●		●		●		●			
5	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●		●		●			
	ベルケイド	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●		●		●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1631M

診療科
申請医師
レジメン名 DCyBorD療法(3-6サイクル目)Cy点滴
対象疾患名 全身性ALアミロイドーシス
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg	皮下注	day1,15
エンドキサン	300	mg/㎡	点滴静注	day1,8,15,22
ベルケイド	1.3	mg/㎡	皮下注	day1,8,15,22
デカドロン	20	mg	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日間
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)		
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●				●					
	カロナール	400	mg/body	内服		●				●					
	デカドロン	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●		
	(ダラキューロ投与1時間前までに)														
1	ダラキューロ	1800	mg	皮下注	3-5分	●				●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●		●		●		●			
3	グラニセトロンバッ	1	mg	点滴静注	15分	●		●		●		●			
4	生食	100	mL	点滴静注		●		●		●		●			
	エンドキサン	300	mg/㎡	点滴静注	30分	●		●		●		●			
5	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●		●		●			
	ベルケイド	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●		●		●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1632S

診療科
レジメン名 DCyBorD療法(7サイクル目以降
対象疾患名 全身性ALアミロイドーシス
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg	皮下注	day1
デカドロン	20	mg	内服	day1

投与周期 28日間
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )		
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●									
	カロナール	400	mg/body	内服		●									
	デカドロン	20	mg/body	内服		●									
	(ダラキューロ投与1時間前までに)														
1	ダラキューロ	1800	mg	皮下注	3-5分	●									

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1633M

診療科
申請医師
レジメン名 DCyBorD療法(1-2サイクル目)Cy内服
対象疾患名 全身性ALアミロイドーシス
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg	皮下注	day1,8,15,22
ベルケイド	1.3	mg/㎡	皮下注	day1,8,15,22
エンドキサン	300	mg/㎡	内服	day1,8,15,22
デカドロン	20	mg	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日間
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)	
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●		●		●		●		
	カロナール	400	mg/body	内服		●		●		●		●		
	エンドキサン	300	mg/㎡	内服		●		●		●		●		
	デカドロン	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	
	(ダラキューロ投与1時間前までに)													
1	ダラキューロ	1800	mg	皮下注	3-5分	●		●		●		●		
2	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●		●		●		
	ベルケイド	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●		●		●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1634M

診療科
申請医師
レジメン名 DCyBorD療法(3-6サイクル目)Cy内服
対象疾患名 全身性ALアミロイドーシス
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラキューロ	1800	mg	皮下注	day1,15
ベルケイド	1.3	mg/㎡	皮下注	day1,8,15,22
エンドキサン	300	mg/㎡	内服	day1,8,15,22
デカドロン	20	mg	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日間
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)	
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●				●				
	カロナール	400	mg/body	内服		●				●				
	エンドキサン	300	mg/㎡	内服		●		●		●		●		
	デカドロン	20	mg/body	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	
	(ダラキューロ投与1時間前までに)													
1	ダラキューロ	1800	mg	皮下注	3-5分	●				●				
2	生食	0.52	mL/㎡	皮下注		●		●		●		●		
	ベルケイド	1.3	mg/㎡	皮下注		●		●		●		●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1640L

診療科
申請医師
備考欄

レジメン名 Eribulin単剤
対象疾患名 悪性軟部腫瘍
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
Eribulin	1.4	mg/㎡	点滴静注	day1,8

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●					
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●					
	ハラヴェン	1.4	mg/㎡	点滴静注	約2～5分	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1650S

診療科
レジメン名 Mosunetuzumab(C1)
対象疾患名 Grade1～3Aの再発又は難治性の濾胞性リンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ルンスミオ	1	mg/body	点滴静注	day1
ルンスミオ	2	mg/body	点滴静注	day8
ルンスミオ	60	mg/body	点滴静注	day15

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(-1)	day(1)	day(7)	day(8)	day(14)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
	アタラックスP	25	mg/body	内服			●		●		●					
	カロナール	400	mg/body	内服			●		●		●					
	(ルンスミオ投与30～60分前までに)															
14:00～14:00	生食	1500	mL	点滴静注	24時間	●	●	●	●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注			●		●		●					
	生食	50	mL	点滴静注			●		●		●					
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分		●		●		●					
	生食	50	mL	点滴静注	60分		●		●		●					
	生食	100	mL	点滴静注			●									
	ルンスミオ	1	mg/body	点滴静注	4時間		●									
	生食	100	mL	点滴静注					●							
	ルンスミオ	2	mg/body	点滴静注	4時間				●							
	生食	190	mL	点滴静注							●					
	ルンスミオ	60	mg/body	点滴静注	4時間						●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1651S

診療科
申請医師
レジメン名 Mosunetuzumab(C2)
対象疾患名 Grade1～3Aの再発又は難治性の濾胞性リンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ルンスミオ	60	mg/body	点滴静注	day1

備考欄

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
	アタラックスP	25	mg/body	内服		●							
	カロナール	400	mg/body	内服		●							
	（ルンスミオ投与30～60分前までに）												
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
	生食	50	mL	点滴静注	60分	●							
	生食	190	mL	点滴静注		●							
	ルンスミオ	60	mg/body	点滴静注	4→2時間	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1652S

診療科
申請医師
レジメン名 Mosunetuzumab(C3以降)
対象疾患名 Grade1～3Aの再発又は難治性の濾胞性リンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ルンスミオ	30	mg/body	点滴静注	day1

備考欄

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
	生食	70	mL	点滴静注		●							
	ルンスミオ	30	mg/body	点滴静注	4→2時間	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1653S

診療科
申請医師
レジメン名 Mosunetuzumab(C1)(皮下注)
対象疾患名 Grade1～3Aの再発又は難治性の濾胞性リンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ルンスミオ皮下注	5	mg/body	皮下注	day1
ルンスミオ皮下注	45	mg/body	皮下注	day8,15

備考欄

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(-1)	day(1)	day(7)	day(8)	day(14)	day(15)	day( )
	アタラックスP	25	mg/body	内服			●		●		●	
	カロナール	400	mg/body	内服			●		●		●	
14:00～14:00	生食	1500	mL	点滴静注	24時間	●	●	●	●	●	●	
1	生食	100	mL	点滴静注			●		●		●	
2	生食	50	mL	点滴静注			●		●		●	
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分		●		●		●	
3	ルンスミオ皮下注	5	mg/body	皮下注	30秒～2分		●					
4	ルンスミオ皮下注	45	mg/body	皮下注	30秒～2分				●		●	

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1654S

診療科
申請医師
レジメン名 Mosunetuzumab(C2以降)(皮下注)
対象疾患名 Grade1～3Aの再発又は難治性の濾胞性リンパ腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ルンスミオ皮下注	45	mg/body	皮下注	day1

備考欄

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
	ルンスミオ皮下注	45	mg/body	皮下注	30秒～2分	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1660S

診療科
レジメン名 weekly Kd療法(C1)
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	20	mg/㎡	点滴静注	day1
カイプロリス	70	mg/㎡	点滴静注	day8,15
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
	レナデックス	40	mg/body	内服		●	●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●						
2	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●								
	注射用水	10	mL/㎡	点滴静注		●								
	カイプロリス	20	mg/㎡	点滴静注	30分	●								
2	5% 糖液	100	mL	点滴静注			●	●						
	注射用水	35	mL/㎡	点滴静注			●	●						
	カイプロリス	70	mg/㎡	点滴静注	30分		●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1661S

診療科
レジメン名 weekly Kd療法(C2-9)
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	70	mg/㎡	点滴静注	day1,8,15
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15,22

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
	レナデックス	40	mg/body	内服		●	●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●						
2	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●	●						
	注射用水	35	mL/㎡	点滴静注		●	●	●						
	カイプロリス	70	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1662S

診療科
レジメン名 weekly Kd療法(C10以降)
対象疾患名 多発性骨髄腫
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
カイプロリス	70	mg/㎡	点滴静注	day1,8,15
レナデックス	40	mg/body	内服	day1,8,15

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
	レナデックス	40	mg/body	内服		●	●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●						
2	5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●	●						
	注射用水	35	mL/㎡	点滴静注		●	●	●						
	カイプロリス	70	mg/㎡	点滴静注	30分	●	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1670M

診療科
レジメン名 Ivosidenib + Azacitidine（静注）
対象疾患名 未治療のIDH1遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アザシチジン	75	mg/㎡	静注	day1-7
イボシデニブ	500	mg	内服	連日

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2-7)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	注射用水	7.5	mL/㎡	点滴静注		●	●						
	アザシチジン	75	mg/㎡	点滴静注	10分	●	●						
	ティブソボ錠	500	mg	内服		← day 1 - 28 連日経口投与 →							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1680S

診療科
レジメン名 Venetoclax＋Ritximab (C1)
対象疾患名 難治性慢性リンパ性白血病
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキサン	375	mg/㎡	点滴	day1
ベネトクラクス	400	mg	経口	連日

投与周期 28日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	337.5	mg/㎡	点滴静注		●							
	リツキサン	375	mL/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●							
	ベネトレクスタ錠	400	mg	内服		← day 1 – 28　連日経口投与 →							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1681S

診療科
レジメン名 Venetoclax＋Ritximab (C2-6)
対象疾患名 難治性慢性リンパ性白血病
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキサン	500	mg/㎡	点滴	day1
ベネトクラクス	400	mg	経口	連日

投与周期 28日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	450	mL/㎡	点滴静注		●							
	リツキサン	500	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/hr	●							
	ベネトレクスタ錠	400	mg	内服		← day 1 - 28　連日経口投与 →							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1690S

診療科
申請医師
レジメン名 Talquetamab【1W】(1サイクル目)
対象疾患名 再発又は難治性の多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
タービー	0.01	mg/kg	皮下注	day1
タービー	0.06	mg/kg	皮下注	day3
タービー	0.4	mg/kg	皮下注	day5

備考欄

投与周期 11日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(3)	day(5)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●	●	●						
	カロナール	1000	mg/body	内服		●	●	●						
	デカドロン	16	mg/body	内服		●	●	●						
	(タービー投与1時間前に内服)													
1	タービー	0.01	mg/kg	皮下注		●								
		0.06	mg/kg	皮下注			●							
		0.4	mg/kg	皮下注				●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1691S

診療科
申請医師
レジメン名 Talquetamab【1W】(2サイクル目以降)
対象疾患名 再発又は難治性の多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
タービー	0.4	mg/kg	皮下注	day1

備考欄

投与周期 7日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	タービー	0.4	mg/kg	皮下注		●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1700S

診療科
申請医師
レジメン名 Talquetamab【2W】(1サイクル目)
対象疾患名 再発又は難治性の多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
タービー	0.01	mg/kg	皮下注	day1
タービー	0.06	mg/kg	皮下注	day3
タービー	0.4	mg/kg	皮下注	day5
タービー	0.8	mg/kg	皮下注	day7

備考欄

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(3)	day(5)	day(7)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●	●	●	●					
	カロナール	1000	mg/body	内服		●	●	●	●					
	デカドロン	16	mg/body	内服		●	●	●	●					
	(タービー投与1時間前に内服)													
1	タービー	0.01	mg/kg	皮下注		●								
		0.06	mg/kg	皮下注			●							
		0.4	mg/kg	皮下注				●						
		0.8	mg/kg	皮下注					●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1701S

診療科
申請医師
レジメン名 Talquetamab【2W】(2サイクル目以降)
対象疾患名 再発又は難治性の多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
タービー	0.8	mg/kg	皮下注	day1

備考欄

投与周期 14日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	タービー	0.8	mg/kg	皮下注		●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1710S

診療科
申請医師
レジメン名 Mosun-Pola療法（C1）（皮下注）
対象疾患名 再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day1
ルンスミオ皮下注	5	mg/body	皮下注	day1
ルンスミオ皮下注	45	mg/body	皮下注	day8,15

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(-1)	day(1)	day(7)	day(8)	day(14)	day(15)	day( )
	アタラックスP	25	mg/body	内服			●		●		●	
	カロナール	400	mg/body	内服			●		●		●	
	（day1はポライビー投与30分前に、day8.15はルンスミオ投与までに内服）											
14:00～14:00	生食	1500	mL	点滴静注	24時間	●	●	●	●	●	●	
1	生食	100	mL	点滴静注			●		●		●	
2	生食	50	mL	点滴静注			●		●		●	
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分		●		●		●	
3	生食	100	mL	点滴静注			●					
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注			●					
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90分		●					
4	生食	100	mL	点滴静注	1時間		●					
5	ルンスミオ皮下注	5	mg/body	皮下注	30秒～2分		●					
6	ルンスミオ皮下注	45	mg/body	皮下注	30秒～2分				●		●	

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1711S

診療科
申請医師
レジメン名 Mosun-Pola療法（C2-6）（皮下注）
対象疾患名 再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day1
ルンスミオ皮下注	45	mg/body	皮下注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
	アタラックスP	25	mg/body	内服		●					
	カロナール	400	mg/body	内服		●					
	（ポライビー投与30分前に）										
1	生食	100	mL	点滴静注		●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●					
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注		●					
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●					
3	生食	100	mL	点滴静注	1時間	●					
4	ルンスミオ皮下注	45	mg/body	皮下注	30秒～2分	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1712S

診療科
申請医師
レジメン名 Mosun-Pola療法 (C7-8) (皮下注)
対象疾患名 再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ルンスミオ皮下注	45	mg/body	皮下注	day1

備考欄

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
	ルンスミオ皮下注	45	mg/body	皮下注	30秒～2分	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1720S

診療科
申請医師
レジメン名 Blinatumomab (体重45kg以上)(2-5サイクル目：寛解導入,地固め)携帯ポンプ用(3-4)
対象疾患名 再発または難治性のB細胞性急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	day1-28

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(4,11,18,25)	day(8,15,22)	day( )	day( )	day( )
1	生食	50	mL	点滴静注		●					
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●					
2	生食	250	mL	持続静注		●		●			
	生食	20	mL	持続静注		●		●			
	注射用水	2.24	mL/day	持続静注		●		●			
	ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	72時間	●		●			
	生食	250	mL	持続静注			●				
	生食	20	mL	持続静注			●				
	注射用水	2.24	mL/day	持続静注			●				
	ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	96時間		●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1721S

診療科
申請医師
レジメン名 Blinatumomab (体重45kg以上)(2-5サイクル目：寛解導入,地固め)携帯ポンプ用(4-3)
対象疾患名 再発または難治性のB細胞性急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	day1-28

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(5,12,19,26)	day(8,15,22)	day( )	day( )	day( )
1	生食	50	mL	点滴静注		●					
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●					
2	生食	250	mL	持続静注		●		●			
	生食	20	mL	持続静注		●		●			
	注射用水	2.24	mL/day	持続静注		●		●			
	ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	96時間	●		●			
	生食	250	mL	持続静注			●				
	生食	20	mL	持続静注			●				
	注射用水	2.24	mL/day	持続静注			●				
	ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	72時間		●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1722S

診療科
申請医師
レジメン名 Blinatumomab (体重45kg以上)(6-9サイクル目:維持)携帯ポンプ用(3-4)
対象疾患名 再発または難治性のB細胞性急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	day1-28

投与周期 84日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(4,11,18,25)	day(8,15,22)	day( )	day( )	day( )
1	生食	50	mL	点滴静注		●					
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●					
2	生食	250	mL	持続静注		●		●			
	生食	20	mL	持続静注		●		●			
	注射用水	2.24	mL/day	持続静注		●		●			
	ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	72時間	●		●			
	生食	250	mL	持続静注			●				
	生食	20	mL	持続静注			●				
	注射用水	2.24	mL/day	持続静注			●				
	ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	96時間		●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1723S

診療科
申請医師
レジメン名 Blinatumomab (体重45kg以上)(6-9サイクル目:維持)携帯ポンプ用(4-3)
対象疾患名 再発または難治性のB細胞性急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	day1-28

投与周期 84日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(5,12,19,26)	day(8,15,22)	day( )	day( )	day( )
1	生食	50	mL	点滴静注		●					
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●					
2	生食	250	mL	持続静注		●		●			
	生食	20	mL	持続静注		●		●			
	注射用水	2.24	mL/day	持続静注		●		●			
	ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	96時間	●		●			
	生食	250	mL	持続静注			●				
	生食	20	mL	持続静注			●				
	注射用水	2.24	mL/day	持続静注			●				
	ビーリンサイト	28	μg/day	持続静注	72時間		●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1724S

診療科
申請医師
レジメン名 Blinatumomab (体重45kg未満)(2-5サイクル目：寛解導入,地固め)携帯ポンプ用(3-4)
対象疾患名 再発または難治性のB細胞性急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	28μg	持続静注	day1-28

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(4,11,18,25)	day(8,15,22)	day( )	day( )	day( )
1	生食	50	mL	点滴静注		●					
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●					
2	生食	250	mL	持続静注		●		●			
	生食	20	mL	持続静注		●		●			
	注射用水	1.2	mL/㎡/day	持続静注		●		●			
	ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	持続静注	72時間	●		●			
	生食	250	mL	持続静注			●				
	生食	20	mL	持続静注			●				
	注射用水	1.2	mL/㎡/day	持続静注			●				
	ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	持続静注	96時間		●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1725S

診療科
申請医師
レジメン名 Blinatumomab (体重45kg未満)(2-5サイクル目：寛解導入,地固め)携帯ポンプ用(4-3)
対象疾患名 再発または難治性のB細胞性急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	28μg	持続静注	day1-28

投与周期 42日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(5,12,19,26)	day(8,15,22)	day( )	day( )	day( )
1	生食	50	mL	点滴静注		●					
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●					
2	生食	250	mL	持続静注		●		●			
	生食	20	mL	持続静注		●		●			
	注射用水	1.2	mL/㎡/day	持続静注		●		●			
	ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	持続静注	96時間	●		●			
	生食	250	mL	持続静注			●				
	生食	20	mL	持続静注			●				
	注射用水	1.2	mL/㎡/day	持続静注			●				
	ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	持続静注	72時間		●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1726S

診療科
申請医師
レジメン名 Blinatumomab (体重45kg未満)(6-9サイクル目：維持)携帯ポンプ用(3-4)
対象疾患名 再発または難治性のB細胞性急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	28μg	持続静注	day1-28

投与周期 84日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(4,11,18,25)	day(8,15,22)	day( )	day( )	day( )
1	生食	50	mL	点滴静注		●					
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●					
2	生食	250	mL	持続静注		●		●			
	生食	20	mL	持続静注		●		●			
	注射用水	1.2	mL/㎡/day	持続静注		●		●			
	ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	持続静注	72時間	●		●			
	生食	250	mL	持続静注			●				
	生食	20	mL	持続静注			●				
	注射用水	1.2	mL/㎡/day	持続静注			●				
	ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	持続静注	96時間		●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1727S

診療科
申請医師
レジメン名 Blinatumomab (体重45kg未満)(6-9サイクル目：維持)携帯ポンプ用(4-3)
対象疾患名 再発または難治性のB細胞性急性リンパ性白血病
治療目的
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	28μg	持続静注	day1-28

投与周期 84日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(5,12,19,26)	day(8,15,22)	day( )	day( )	day( )
1	生食	50	mL	点滴静注		●					
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●					
2	生食	250	mL	持続静注		●		●			
	生食	20	mL	持続静注		●		●			
	注射用水	1.2	mL/㎡/day	持続静注		●		●			
	ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	持続静注	96時間	●		●			
	生食	250	mL	持続静注			●				
	生食	20	mL	持続静注			●				
	注射用水	1.2	mL/㎡/day	持続静注			●				
	ビーリンサイト	15	μg/㎡/day	持続静注	72時間		●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1730L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+R2療法(1サイクル目) 体重83kg以上
対象疾患名 再発・難治性の濾胞性リンパ腫(Grade1-3A)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1,8,15,22
レブラミド	20	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●	●	●		●						
	カロナール	400	mg/body	内服		●	●	●		●						
	(ミンジュビ投与60分-30分前に)															
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●		●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●										
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●										
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	70→120mL/hr	●										
3	生食	250	mL	点滴静注			●	●		●						
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注			●	●		●						
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	125mL/hr		●	●		●						
4	生食	50	mL	点滴静注	15分	●	●	●		●						
5	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●	●	●		●						
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/h	●	●	●		●						
	レブラミド	20	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1731L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+R2療法(2-3サイクル目) 体重83kg以上
対象疾患名 再発・難治性の濾胞性リンパ腫(Grade1-3A)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
レブラミド	20	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●										
	カロナール	400	mg/body	内服		●										
	(リツキシマブ投与60分-30分前に)															
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●		●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●	●		●						
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	125mL/hr	●	●	●		●						
4	生食	50	mL	点滴静注	15分	●										
5	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●										
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/h	●										
	レブラミド	20	mg/body	内服		←― day 1 - 21 連日経口投与 ―→										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1732L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+R2療法(4-5サイクル目) 体重83kg以上
対象疾患名 再発・難治性の濾胞性リンパ腫(Grade1-3A)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,15
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
レブラミド	20	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day(21)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●										
	カロナール	400	mg/body	内服		●										
	(リツキシマブ投与60分-30分前に)															
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●									
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●									
3	生食	250	mL	点滴静注		●	●									
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●									
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	125mL/hr	●	●									
4	生食	50	mL	点滴静注	15分	●										
5	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●										
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/h	●										
	レブラミド	20	mg/body	内服		← day 1-21 連日経口投与 →										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1733L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+R2療法(6-12サイクル目) 体重83kg以上
対象疾患名 再発・難治性の濾胞性リンパ腫(Grade1-3A)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,15
レブラミド	20	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day(21)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●									
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●									
3	生食	250	mL	点滴静注		●	●									
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●									
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	125mL/hr	●	●									
	レブラミド	20	mg/body	内服		←day 1-21 連日経口投与→										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1740L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+R2療法(1サイクル目) 体重83kg未満
対象疾患名 再発・難治性の濾胞性リンパ腫(Grade1-3A)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1,8,15,22
レブラミド	20	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●	●	●		●						
	カロナール	400	mg/body	内服		●	●	●		●						
	(ミンジュビ投与60分-30分前に)															
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●		●						
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●	●		●						
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	70mL/hr	●	●	●		●						
4	生食	50	mL	点滴静注	15分	●	●	●		●						
5	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●	●	●		●						
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/h	●	●	●		●						
	レブラミド	20	mg/body	内服		←― day 1 - 21 連日経口投与 ―→										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1741L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+R2療法(2-3サイクル目) 体重83kg未満
対象疾患名 再発・難治性の濾胞性リンパ腫(Grade1-3A)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
レブラミド	20	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●										
	カロナール	400	mg/body	内服		●										
	(リツキシマブ投与60分-30分前に)															
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●		●						
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●	●		●						
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	70mL/hr	●	●	●		●						
4	生食	50	mL	点滴静注	15分	●										
5	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●										
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/h	●										
	レブラミド	20	mg/body	内服		←― day 1 - 21 連日経口投与 ―→										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1742L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+R2療法(4-5サイクル目) 体重83kg未満
対象疾患名 再発・難治性の濾胞性リンパ腫(Grade1-3A)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,15
リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	day1
レブラミド	20	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day(21)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●										
	カロナール	400	mg/body	内服		●										
	(リツキシマブ投与60分-30分前に)															
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●									
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●									
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●									
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	70mL/hr	●	●									
4	生食	50	mL	点滴静注	15分	●										
5	生食	337.5	mL/㎡	点滴静注		●										
	リツキシマブBS	375	mg/㎡	点滴静注	25→200mL/h	●										
	レブラミド	20	mg/body	内服		←― day 1-21 連日経口投与―→										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1743L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+R2療法(6-12サイクル目) 体重83kg未満
対象疾患名 再発・難治性の濾胞性リンパ腫(Grade1-3A)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,15
レブラミド	20	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day(21)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●									
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●									
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●									
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	70mL/hr	●	●									
	レブラミド	20	mg/body	内服		←― day 1-21 連日経口投与―→										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1750L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+LEN療法(1サイクル目) 体重83kg以上
対象疾患名 再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,4,8,15,22
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(4)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●	●	●	●		●					
	カロナール	400	mg/body	内服		●	●	●	●		●					
	(ミンジュビ投与60分-30分前に)															
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●		●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●		●					
3	生食	250	mL	点滴静注		●										
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●										
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	70→120mL/hr	●										
3	生食	250	mL	点滴静注			●	●	●		●					
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注			●	●	●		●					
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	125mL/hr		●	●	●		●					
	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1751L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+LEN療法(2-3サイクル目) 体重83kg以上
対象疾患名 再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●		●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●	●		●						
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	125mL/hr	●	●	●		●						
	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1752L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+LEN療法(4-12サイクル目) 体重83kg以上
対象疾患名 再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,15
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day(21)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●									
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●									
3	生食	250	mL	点滴静注		●	●									
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●									
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	125mL/hr	●	●									
	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1-21 連日経口投与 →										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1753L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+LEN療法(13サイクル目以降) 体重83kg以上
対象疾患名 再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,15

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●									
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●									
3	生食	250	mL	点滴静注		●	●									
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●									
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	125mL/hr	●	●									

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1760L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+LEN療法(1サイクル目) 体重83kg未満
対象疾患名 再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,4,8,15,22
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(4)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●	●	●	●		●					
	カロナール	400	mg/body	内服		●	●	●	●		●					
	(ミンジュビ投与60分-30分前に)															
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●		●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●		●					
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●		●					
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●	●	●		●					
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	70mL/hr	●	●	●	●		●					
	レブラミド	25	mg/body	内服		←		day 1 - 21 連日経口投与			→					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1761L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+LEN療法(2-3サイクル目) 体重83kg未満
対象疾患名 再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(8)	day(15)	day(21)	day(22)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●		●						
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●		●						
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●	●		●						
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	70mL/hr	●	●	●		●						
	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1762L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+LEN療法(4-12サイクル目) 体重83kg未満
対象疾患名 再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
レブラミド	25	mg/body	内服	day1-21

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day(21)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●									
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●									
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●									
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	70mL/hr	●	●									
	レブラミド	25	mg/body	内服		← day 1-21 連日経口投与 →										

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1763L

診療科
申請医師
レジメン名 Tafasitamab+LEN療法(13サイクル目以降) 体重83kg未満
対象疾患名 再発または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫・濾胞性リンパ腫(Grade3B)
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	day1,15

備考欄

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(15)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●									
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●									
3	生食	100	mL	点滴静注		●	●									
	注射用水	0.3	mL/kg	点滴静注		●	●									
	ミンジュビ	12	mg/kg	点滴静注	70mL/hr	●	●									

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1790H

診療科
申請医師
レジメン名 Moga-CHOP（1-6コース目） 2日投与
対象疾患名 CCR4陽性成人T細胞白血病
治療目的

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	50	mg/㎡		点滴	day1
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴	day1
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴	day1
プレドニン	100	mg/body		内服	day1-5
ポテリジオ	1	mg/kg		点滴	day2

投与周期 14日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(　)	day(　)	day(　)
0	アタラックスP	25	mg	内服			●						
	カロナール	400	mg	内服			●						
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注			●						
	ポテリジオ	1	mg/kg	点滴静注	2時間		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注	30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注	全開	●							
	生食	500	mL	点滴静注		●							
5	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注	2時間	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1791H

診療科
申請医師
レジメン名 Moga-CHOP（2-6コース目） 1日投与
対象疾患名 CCR4陽性成人T細胞白血病
治療目的

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキソルビシン	50	mg/㎡		点滴	day1
オンコビン	1.4	mg/㎡	2mg	点滴	day1
エンドキサン	750	mg/㎡		点滴	day1
ポテリジオ	1	mg/kg		点滴	day1
プレドニン	100	mg/body		内服	day1-5

投与周期 14日　　休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(　)	day(　)	day(　)
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	ポテリジオ	1	mg/kg	点滴静注	2時間	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	50	mg/㎡	点滴静注	30分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注		●							
	オンコビン	1.4	mg/㎡	点滴静注	全開	●							
	生食	500	mL	点滴静注		●							
6	エンドキサン	750	mg/㎡	点滴静注	2時間	●							
	プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1792S

診療科
レジメン名 Moga-CHOP（7-8コース目）
対象疾患名 CCR4陽性成人T細胞白血病
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ポテリジオ	1	mg/kg		点滴	day1

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
	プレドニン	25	mg/body	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	ポテリジオ	1	mg/kg	点滴静注	2時間	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1800S

診療科
申請医師
レジメン名 Tal ＋Tec療法（1サイクル目）
対象疾患名 髄外性形質細胞腫を有する再発又は難治性の多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テクベイリ	0.06	mg/kg	皮下注	day1
テクベイリ	0.3	mg/kg	皮下注	day3
テクベイリ	1.5	mg/kg	皮下注	day5
テクベイリ	3	mg/kg	皮下注	day7
タービー	0.01	mg/kg	皮下注	day1
タービー	0.06	mg/kg	皮下注	day3
タービー	0.4	mg/kg	皮下注	day5
タービー	0.8	mg/kg	皮下注	day7

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day(3)	day(5)	day(7)	day( )	day( )	day( )	day( )
0	アタラックスP	25	mg/body	内服		●	●	●	●				
	カロナール	1000	mg/body	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	16	mg/body	内服		●	●	●	●				
	（テクベイリ投与1時間前に内服）												
1	テクベイリ	0.06	mg/kg	皮下注		●							
		0.3	mg/kg	皮下注			●						
		1.5	mg/kg	皮下注				●					
		3	mg/kg	皮下注					●				
2	タービー	0.01	mg/kg	皮下注		●							
		0.06	mg/kg	皮下注			●						
		0.4	mg/kg	皮下注				●					
		0.8	mg/kg	皮下注					●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1801S

診療科
申請医師
レジメン名 Tal ＋Tec療法（2サイクル目以降）
対象疾患名 髄外性形質細胞腫を有する再発又は難治性の多発性骨髄腫
治療目的 □術前 □術後補助 ■再発・進行
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テクベイリ	3	mg/kg	皮下注	day1
タービー	0.8	mg/kg	皮下注	day1

備考欄

投与周期 14日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	day(1)	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	テクベイリ	3	mg/kg	皮下注		●							
2	タービー	0.8	mg/kg	皮下注		●							