

code	レジメン名
E010H	術前FP(800/80)
E020H	FP(800/80)
E030H	FP(700/70)-RT(JCOG)
E040L	DTX
E050M	NDP+5FU
E070H	FP(400/40)-RT
E080M	low dose FP(700/20)
E090L	Weekly PTX
E100S	Nivolumab単剤(食道癌)(2W)
E101S	Nivolumab単剤(食道癌)(4W)
E110H	Pembrolizumab+FP(800/80)
E111L	Pembrolizumab/5-FU (Pembrolizumab+FP維持療法)
E120S	Pembrolizumab単剤(食道癌)(3W)
E121S	Pembrolizumab単剤(食道癌)(6W)
E130M	FOLFOX-RT
E140H	DCF療法
E150H	Nivolumab+FP(800/80)
E160S	Ipilimumab+Nivolumab (食道癌)
E170H	FP(1000/75)-RT(JCOG0909)
E180H	Tislelizumab + FP(800/80)
E190S	Tislelizumab単剤

レジメン記入フォーマット

登録番号 E020H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名

対象疾患名

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	1
	5FU	800	mg/m ²	点滴	1-5

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()	Day()
					●	●	●	●				
1	生食	100 mL	点滴静注	2時間	●	●	●	●				
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトンパック	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ		●							
7	生食	50 mL	点滴静注			●1	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●1	●					
8-1	5FU	800 mg/m ²	持続点滴		●	●3	●	●				
	生食	1000 mL	持続点滴	24時間	●	●3	●	●				
8-2	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400 mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500 mL	点滴静注			●2						
	プリンペラン	1 A	点滴静注	2時間		●2						
12	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●4						

レジメン記入フォーマット

登録番号 E030H

診療科
 レジメン名 FP(700/70)-RT(JCOG)
 対象疾患名 進行食道癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	シスプラチン	70	mg/m ²	点滴	1
	5FU	700	mg/m ²	点滴	1-4
	Radiation	2 x30	Gy		1-5,8-12 15-19,22-26

投与周期 28日x2

休業

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()				
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●	●	●					
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	50	mL	点滴静注			●1	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●1	●					
8-1	5FU	700	mg/m ²	持続点滴		●	●3	●					
	生食	1000	mL	持続点滴	24時間	●	●3	●					
8-2	シスプラチン	70	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注			●2						
	プリンペラン	1	A	点滴静注	2時間		●2						
12	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●4						

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	DTX(L)			
対象疾患名	遺残再発食道癌二次治療			
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行			

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ドセタキセル	70	mg/m ²	点滴	1

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2,3)
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	
2	生食	50	mL	点滴静注		●	
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	
3	ドセタキセル	70	mg/m ²	点滴静注		●	
	5%ブドウ糖	250	mL	点滴静注	1時間	●	
	デカドロン	8	mg	内服			●

レジメン記入フォーマット

登録番号 E070H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 FP(400/40)-RT

対象疾患名 進行食道癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	シスプラチン	40	mg/m ²	点滴	1,8
	5FU	400	mg/m ²	点滴	1-5、8-12
	放射線治療	2Gr			15回

投与周期 休薬

2クール

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5)	Day(6-7)	Day(8)	Day(9-10)	Day(11)	Day(12)	Day(13-35)
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●	●	●	●		●	●	●	●	
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●					●				
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●					●				
4	生食	50	mL	フラッシュ		●					●				
5	パロノセトロンパック	0.75	mg	点滴静注		●					●				
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●					●				
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●					●				
6	生食	50	mL	フラッシュ		●					●				
7	生食	50	mL	点滴静注			●	●				●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●				●	●		
8-1	5FU	400	mg/m ²	持続点滴		●	●	●	●		●	●	●	●	
	ソルデム3A	500	mL	持続点滴	24時間	●	●	●	●		●	●	●	●	
8-2	シスプラチン	40	mg/m ²	点滴静注		●					●				
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●					●				
9	ラクテックG	500	mL	点滴静注		●					●				
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●					●				
10	ラクテックG	500	mL	点滴静注	2時間	●					●				
11	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●					●			
12	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●					●			

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Weekly PTX		
対象疾患名	食道癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	パクリタキセル	100	mg/m ²	点滴静注	1,8,15,22,29,36

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)
						●
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●
2	生食	50	mL	点滴静注		●
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●
3	パクリタキセル	100	mg/m ²	点滴静注		●
	生食	250	mL	点滴静注	60分	●

ト

登録番号 E090L

備考欄

PTX投与時にはフィルター付き輸液セット
TERUMOシュアプラグ輸液セット20滴≒1mLを使用すること。
前投薬はパクリタキセル投与30分前に完了すること

投与周期 49日

休薬

Day(8)	Day(15)	Day(22)	Day(29)	Day(36)	Day()	Day()
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 E160S

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Ipilimumab+Nivolumab (食道癌)

対象疾患名 未治療の根治切除不能な食道癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1.15.29
	ヤーポイ	1	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(15)	Day(29)	Day()				
1	生食	100 mL	点滴静注	30分	●	●	●					
2	生食	100 mL	点滴静注		●	●	●					
	オブジーボ	240 mg/body	点滴静注	30分	●	●	●					
3	生食	50 mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	25 mL	点滴静注		●							
	ヤーポイ	1 mg/kg	点滴静注	30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 E170H

診療科		申請医師		備考欄
レジメン名	FP(1000/75)-RT(JCOG0909)			
対象疾患名	Stage II, III進行食道癌			
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行			

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	シスプラチン	75	mg/m ²	点滴	1
	5FU	1000	mg/m ²	点滴	1-4
	Radiation	1.8x28	Gy		

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()				
1	生食	100 mL	点滴静注	2時間	●	●	●					
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンバック	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ		●							
7	生食	50 mL	点滴静注			●1	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●1	●					
8-1	5FU	1000 mg/m ²	持続点滴		●	●3	●					
	生食	1000 mL	持続点滴	24時間	●	●3	●					
8-2	シスプラチン	75 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400 mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500 mL	点滴静注			●2						
	プリンペラン	1 A	点滴静注	2時間		●2						
12	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●4						

レジメン記入フォーマット

登録番号 E180H

診療科 申請医師 備考欄
 レジメン名 Tislelizumab + FP(800/80)
 対象疾患名 化学療法未治療の根治切除不能な食道癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	テビムブラ	200	mg	点滴	1
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴	1
	5FU	800	mg/m ²	点滴	1-5

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	2時間	●	●	●	●				
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50 mL	点滴静注		●							
	テビムブラ	200 mg	点滴静注	60→30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンパック	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	フラッシュ		●							
8	生食	50 mL	点滴静注			●1	●					
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分		●1	●					
9-1	5FU	800 mg/m ²	持続点滴		●	●3	●	●				
	生食	1000 mL	持続点滴	24時間	●	●3	●	●				
9-2	シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400 mL	点滴静注	2時間	●							
10	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間	●							
11	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
12	ソルデム3A	500 mL	点滴静注			●2						
	プリンペラン	1 A	点滴静注	2時間		●2						
13	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●4						

