

code	レジメン名
C010L	5FU/LV(Roswell Park)
C020M	IRIS(FIRIS)
C021M	Bevacizumab (5mg/kg)+IRIS(FIRIS)
C023M	IRIS(OGSG)
C024M	Bevacizumab+IRIS(OGSG)
C025M	Cetuximab+IRIS(1クール目)
C026M	Cetuximab+IRIS(2クール目以降)
C030M	Panitumumab+IRI
C031M	Panitumumab+IRIS
C040S	Panitumumab単剤
C050S	Cetuximab単剤(1クール目)
C051S	Cetuximab単剤(2クール目以降)
C060M	Cetuximab+CPT-11(1クール目)
C061M	Cetuximab+CPT-11(2クール目以降)
C070M	XELOX
C071M	Bevacizumab+XELOX
C072S	Bevacizumab+XELOX(OX抜き)
C080M	FOLFIRI
C081M	Bevacizumab (5mg/kg) + FOLFIRI
C083M	Panitumumab+FOLFIRI
C084M	Ramucirumab+FOLFIRI
C090M	mFOLFOX6
C091L	mFOLFOX6(OX抜き)
C100M	Bevacizumab (5mg/kg)+mFOLFOX6
C102L	Bevacizumab (5mg/kg) +mFOLFOX6(OX抜き)
C110M	Panitumumab+mFOLFOX6
C111L	Panitumumab+mFOLFOX6(OX抜き)
C120M	SIR(FIRIS)3week
C121M	Bevacizumab + SIR 3week
C122M	Cetuximab+SIR 3week(初回)
C123M	Cetuximab+SIR 3week(2回目以降)
C130M	SOX
C131M	Bevacizumab+SOX
C140M	Cetuximab+SOX(1クール目)
C141M	Cetuximab+SOX(2クール目以降)
C150S	UFT/LV/Bevacizumab
C160M	Aflibercept+FOLFIRI
C170H	FOLFOXIRI
C171L	5-FU/LV(FOLFOXIRI維持療法)
C180H	Bevacizumab+FOLFOXIRI
C181L	5-FU/LV+Bevacizumab(FOLFOXIRI+Bevacizumab維持療法)
C190S	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab (初回)
C191S	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab (維持)
C200S	Encorafenib+Cetuximab (初回)
C201S	Encorafenib+Cetuximab (維持)
C220S	Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
C221S	Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
C230S	Bevacizumab (5mg/kg)+TAS-102

レジメン記入フォーマット

登録番号 C010L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

5FU/LV(Roswell Park)

進行・再発大腸がん

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

5-FU	600 mg/m ²	点滴静注	day 1, 8, 15, 22, 29, 36
------	-----------------------	------	--------------------------

レボホリナート	250 mg/m ²	点滴静注	day 1, 8, 15, 22, 29, 36
---------	-----------------------	------	--------------------------

2014年12月31日	2014年12月31日	2014年12月31日	2014年12月31日	2014年12月31日

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 56日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C020M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

IRIS(FIRIS)

進行・再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

S-1

80-12

 mg/m^2

經口

day1-14

イリ

12

 mg/m^2

点滴

day1.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

	0	

--	--

day 1/10	
----------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C021M

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Bevacizumab (5mg/kg)+IRIS(FIRIS)

進行・再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

ベバシズマブBS

5

mg/kg

点滴静注

day1,15

イリノテカン

125

 mg/m^2

点滴静注

day1,15

S-1

80-120

mg

經口	
----	--

day 1-14	
----------	--

--	--

00	123

8	
---	--

--	--

--	--

[illegible]

--	--

--	--

--	--

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C023M

診療科	
レジメン名	IRIS(OGSG)
対象疾患名	進行・再発大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-21
イリノテカン	80	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期	35日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C024M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

Bevacizumab+IRIS(OGSG)

進行・再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

5

mg/kg

点滴静注

day1,15

イリノテカン

	80
--	----

 mg/m^2

点滴静注

day1,15

S-1

80-120

--	--

内服

day 1-21

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 35日

休薬

35日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C025M

診療科	
レジメン名	Cetuximab+IRIS(1クール目)
対象疾患名	進行・再発大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-14
アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	day1
アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day8, 15, 22
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期 **28日**

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day(22)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●				
	ボララミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●				
3	生食	50	mL	点滴静注		●		●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●					
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	400(初回のみ)	mg/m ²	点滴静注	120分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注			●	●	●				
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分		●	●	●				
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●		●					
6	生食	500	mL	点滴静注		●		●					
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●		●					
	S-1	80-120	mg	内服		1	→ 14						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C026M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

Cetuximab+IRIS(2クール目以降)

進行・再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-14
アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day1, 8, 15, 22
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day(22)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●				
	ボララミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●				
3	生食	50	mL	点滴静注		●		●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●					
4	生食	250	mL	点滴静注		●	●	●	●				
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●	●	●				
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●		●					
6	生食	500	mL	点滴静注		●		●					
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●		●					
	S-1	80-120	mg	内服		1	→	14					

レジメン記入フォーマット

登録番号 C030M

診療科	
レジメン名	Panitumumab+IRI
対象疾患名	進行・再発大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行
治療内容	

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	day1
イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Panitumumab+IRIS
進行・再発大腸癌 (KRAS wild)
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 C031M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-14
ペクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	day1,15
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルール	点滴時間	Day(1)	Day(14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●		●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●		●					
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●					
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●		●					
4	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ペクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	60分	●		●					
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●		●					
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●		●					
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●		●					
	S-1	80-120	mg	内服		→							

レジメン記入フォーマット

診療科	
レジメン名	Cetuximab単剤(1クール目)
対象疾患名	進行・再発大腸がん
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 C050S

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	400(初回)	mg/m ²	点滴	day1

投与周期 7日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C051S

診療科	
レジメン名	Cetuximab単剤(2クール目以降)
対象疾患名	進行・再発大腸がん
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 7日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C060M

診療科	
レジメン名	Cetuximab+CPT-11(1クール目)
対象疾患名	進行・再発大腸がん
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	400(初回)	mg/m ²	点滴静注	day1
		250	mg/m ²	点滴静注	day8,15,22
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C061M

診療科	
レジメン名	Cetuximab+CPT-11(2クール目以降)
対象疾患名	進行・再発大腸がん
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

休薬	
----	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

XELOX	
大腸がん	
☐ 術前	☒ 術後補助
	☒ 再発・進行

--

備考欄

C070M

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
カベシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

--	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C071M

診療科	
レジメン名	Bevacizumab+XELOX
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ペバシズマブBS	7.5	mg/kg	点滴静注	1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C072S

診療科	
レジメン名	Bevacizumab+XELOX (OX抜き)
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	点滴静注	1
	カベシタピン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C080M

診療科	
レジメン名	FOLFIRI
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1
5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C081M

診療科	
レジメン名	Bevacizumab (5mg/kg) + FOLFIRI
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

ペバシズマブBS	5 mg/kg	点滴静注	day1
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1
イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1
5FU	400 mg/m ²	急速静注	day1
5FU	2400 mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	アロキシ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	100	mL	90分→60分→30分		●							
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	ポート		●							
4-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
4-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	イリノテカン	150	mg/m ²	ポート	90分	●							
5	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
6	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注M	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150mL		ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C083M

診療科	
レジメン名	Panitumumab+FOLFIRI
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	バクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬	
----	--

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート	×	●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	アロキシ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
4	生食	100	mL	ポート		●							
	ペクティビックス	6	mg/kg	ポート	1時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	イリノテカン	150	mg/m ²	ポート	90分	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150mL		ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 登録番号

対象疾患名

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	サイラムザ	8	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1
		400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	アロキシ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート		●							
	ポララミン	5	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
4	生食	250	mL	ポート		●							
	サイラムザ	8	mg/kg	ポート	1時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	イリノテカン	150	mg/m ²	ポート	90分	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150mL		ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C090M

診療科	
レジメン名	mFOLFOX6
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	アロキシ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
3-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●							
4	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
5	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C091L

診療科	
レジメン名	mFOLFOX6 (OX抜き)
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 Bevacizumab (5mg/kg)+mFOLFOX6
 対象疾患名 進行大腸癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 C100M

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート	点滴	●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	アロキシ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	100	mL	ポート		●							
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	90分→30分		●							
4-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
4-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●							
5	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
6	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Bevacizumab (5mg/kg) +mFOLFOX6 (OX抜き)		
対象疾患名	進行大腸癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

登録番号 C102L

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート	点滴	●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	100	mL	ポート		●							
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	90分→30分		●							
4	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
5	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
6	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注射液	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C110M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

備考欄

Panitumumab+mFOLFOX6
進行大腸癌
□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	単位	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート	×	●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	アロキシ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
4	生食	100	mL	ポート		●							
	ベクティビックス	6	mg/kg	ポート	1時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注I	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	登録番号	C111L
レジメン名	Panitumumab+mFOLFOX6(OX抜き)					
対象疾患名	進行大腸癌					
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行					
治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日	
	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	day1	
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1	
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1	
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2	

投与周期 14日
 休業

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	単位	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
4	生食	100	mL	ポート		●							
	ベクティビックス	6	mg/kg	ポート	1時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C121M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Bevacizumab + SIR 3week

進行・再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

S-1

80-120

mg

經口	
----	--

day 1-14

ベバ

7.5

mg	
mg/kg	

点滴静

day 1

イリノテカン

125

 mg/m^2

点滴静

day 1

[illegible]

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

登録番号 C122M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	経口	day1-14
アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	day1
アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day8,15
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	ボラミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	120分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注			●	●					
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分		●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●							
6	S-1	80-120	mg	内服		1	→ 14						

登録番号 C123M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請醫師

備考欄

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

S-1

80-120

mg

経日	
----	--

day1-14

アービタックス

250

 mg/m^2

点滴静注

day1,8,15

イリノテカン

100

 mg/m^2

点滴静注

day 1

投与周期

21 目

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	ボラミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●	●	●					
	アーピタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●							
6	S-1	80-120	mg	内服		1	→	14					

レジメン記入フォーマット

登録番号 C130M

診療科	
レジメン名	SOX
対象疾患名	進行・再発大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg	経口	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
3	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	2時間	●							
4	S-1	80-120	mg	内服									

レジメン記入フォーマット

登録番号 C131M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Bevacizumab+SOX

対象疾患名 進行・再発大腸癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg	経口	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	120分	●							
5	S-1	80-120	mg	内服									

レジメン記入フォーマット

登録番号 C140M

診療科
レジメン名 Cetuximab+SOX(1クール目)
対象疾患名 Kras wild-type大腸癌
治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg	経口	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	day1
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day8,15

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	点滴時間	●	●		●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●		●				
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●		●				
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	120分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注			●		●				
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分		●		●				
6	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
7	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	120分	●							
8	S-1	80-120	mg	経口	内服	→							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C141M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Cetuximab+SOX(2クール目以降)

対象疾患名 Kras wild-type大腸癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg	経口	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●		●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●		●				
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●		●				
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
	アロキシ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●	●		●				
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●		●				
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	120分	●							
7	S-1	80-120	mg	経口	内服	→	→	→					

レジメン記入フォーマット

登録番号 C150S

診療科		日
レジメン名	UFT/LV/Bevacizumab	
対象疾患名	切除不能進行再発大腸癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行	

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ユーエフティ	300	mg/m ²	内服	day1-21
	ホリナート	75	mg	内服	day1-21
	ペバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

備考欄

登録番号 C160M

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ザルトラップ	4	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート	点滴	●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	アロキシ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
4	生食	250	mL	ポート		●							
	ザルトラップ	4	mg/kg	ポート	1時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	イリノテカン	150	mg/m ²	ポート	90分	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150mL		ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C170H

診療科	
レジメン名	FOLFOXIRI
対象疾患名	切除不能進行再発大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	165	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	3200	mg/m ²	持続静注	day1-3

投与周期 14日

休薬	
----	--

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	アロキシ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	9.9	mg	ポート	15分	●							
3	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	イリノテカン	165	mg/m ²	ポート	1時間	●							
4-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
4-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●							
5	5FU	3200	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注N	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							
	アブレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80	●80					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 C171L

診療科	
レジメン名	5-FU/LV(FOLFOXIRI維持療法)
対象疾患名	切除不能進行再発大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	3200	mg/m ²	持続静注	day1-3

投与周期 14日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C180H

診療科	
レジメン名	Bevacizumab+FOLFOXIRI
対象疾患名	切除不能進行再発大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ペバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	165	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	3200	mg/m ²	持続静注	day1-3

投与周期 14日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **C181L**

診療科 申請医師
レジメン名 5-FU/LV+Bevacizumab(FOLFOXIRI+Bevacizumab維持療法)
対象疾患名 切除不能進行再発大腸癌
治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

ベバシズマブBS	5 mg/kg	点滴静注	day1
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1
5FU	3200 mg/m ²	持続静注	day1-3

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師		備考欄	登録番号	C190S
レジメン名	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab (初回)					
対象疾患名	BRAF V600変異陽性の切除不能進行再発大腸癌					
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行					

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	day1-7
	メクトビ	90	mg/day	内服	day1-7

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	点滴	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	分1	●	●						
	メクトビ	90	mg/day	内服	分2	●	●						

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab (維持)		
対象疾患名	BRAF V600変異陽性の切除不能進行再発大腸癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

登録番号 C191S

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴	day1
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	day1-7
	メクトビ	90	mg/day	内服	day1-7

投与周期 7日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	1時間	●							
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	分1	●	●						
	メクトビ	90	mg/day	内服	分2	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C200S

診療科		申請医師	
レジメン名	Encorafenib+Cetuximab (初回)		
対象疾患名	BRAF V600変異陽性の切除不能進行再発大腸癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

[illegible]

投与周期 7日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	分1	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C201S

診療科 申請医師

備考欄

レジメン名	Encorafenib+Cetuximab（維持）
-------	---------------------------

対象疾患名	BRAF V600変異陽性の切除不能進行再発大腸癌
-------	---------------------------

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

[illegible]投与周期 **7日**

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ボララミン	5	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	1時間	●							
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	分1	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C220S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Trastuzumab+Pertuzumab (初回)	
-----------------------------	--

HER2陽性大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パーゼタ	840	mg/body	点滴静注	day1
------	-----	---------	------	------

ハーセプチン	8 mg/kg	点滴静注	day1
--------	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C221S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)	
-------------------------------	--

HER2陽性大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パージエタ	420	mg/body	点滴静注	day1
-------	-----	---------	------	------

ハーセプチン	6 mg/kg	点滴静注	day1
--------	---------	------	------

[illegible]

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C230S

診療科	
レジメン名	Bevacizumab (5mg/kg)+TAS-102
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	1.15
	ロンサーフ	70	mg/m ²	内服	1-5.8-12

投与周期 28日

休薬 [illegible]