

code	レジメン名
C010L	5FU/LV(Roswell Park)
C020M	IRIS(FIRIS)
C021M	Bevacizumab (5mg/kg)+IRIS(FIRIS)
C023M	IRIS(OGSG)
C024M	Bevacizumab+IRIS(OGSG)
C025M	Cetuximab+IRIS(1クール目)
C026M	Cetuximab+IRIS(2クール目以降)
C027M	Cetuximab(2week)+IRIS
C030M	Panitumumab+IRI
C031M	Panitumumab+IRIS
C040S	Panitumumab単剤
C050S	Cetuximab単剤(1クール目)
C051S	Cetuximab単剤(2クール目以降)
C052S	Cetuximab単剤(2week)
C060M	Cetuximab+CPT-11(1クール目)
C061M	Cetuximab+CPT-11(2クール目以降)
C062M	Cetuximab(2week)+CPT-11
C070M	XELOX
C071M	Bevacizumab+XELOX
C072S	Bevacizumab+XELOX(OX抜き)
C080M	FOLFIRI
C081M	Bevacizumab (5mg/kg) + FOLFIRI
C083M	Panitumumab+FOLFIRI
C084M	Ramucirumab+FOLFIRI
C090M	FOLFOX6
C091L	FOLFOX6(OX抜き)
C100M	Bevacizumab (5mg/kg)+mFOLFOX6
C102L	Bevacizumab (5mg/kg) +mFOLFOX6(OX抜き)
C110M	Panitumumab+mFOLFOX6
C111L	Panitumumab+mFOLFOX6(OX抜き)
C120M	SIR (FIRIS) 3week
C121M	Bevacizumab + SIR 3week
C122M	Cetuximab+SIR 3week(初回)
C123M	Cetuximab+SIR 3week(2回目以降)
C130M	SOX
C131M	Bevacizumab+SOX
C140M	Cetuximab+SOX(1クール目)
C141M	Cetuximab+SOX(2クール目以降)
C150S	UFT/LV/Bevacizumab
C160M	Aflibercept+FOLFIRI
C170H	FOLFOXIRI
C171L	5-FU/LV(FOLFOXIRI維持療法)
C180H	Bevacizumab+FOLFOXIRI
C181L	5-FU/LV+Bevacizumab(FOLFOXIRI+Bevacizumab維持療法)
C190S	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab (初回)
C191S	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab (維持)
C192S	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab (2week)
C200S	Encorafenib+Cetuximab (初回)
C201S	Encorafenib+Cetuximab (維持)
C202S	Encorafenib+Cetuximab (2week)
C210S	Ipilimumab + Nivolumab (結腸・直腸癌)
C211S	Nivolumab単剤(結腸・直腸癌)(4W)
C220S	Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
C221S	Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
C230S	Bevacizumab (5mg/kg)+TAS-102
C240M	Cetuximab (2W) + mFOLFOX6
C241L	Cetuximab (2W) + mFOLFOX6(OX抜き)
C250S	Sotorasib+Panitumumab
C260M	Encorafenib+Cetuximab+mFOLFOX6
C261L	Encorafenib+Cetuximab+mFOLFOX6(OX抜き)
C270M	CAPIRI
C271M	Bevacizumab+CAPIRI
C280S	PHESGO(初回)(大腸)
C281S	PHESGO(2回目以降)(大腸)

レジメン記入フォーマット

登録番号 C010L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請醫師

備考欄

5FU/LV(Roswell Park)

進行・再発大腸がん

□術前 □術後補助 ■再発・進行

— 110.100 — 110.200.000 — 110.200.000 — 110.200.000 — 110.200.000

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

5-FU

600

 mg/m^2

点滴静注

day1, 8, 15, 22, 29, 36

レボホリナート

250

0 mg/m²

点滴静注

day1, 8, 15, 22, 29, 36

投与周期 56日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C020M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

IRIS(FIRIS)

進行・再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

S-1

80-120

 mg/m^2

經口

day1-14

イリ

125

 mg/m^2

点滴青

day1,15

--	--

--	--

--	--

--	--

--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期

28日

休藥

--	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C021M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請醫師

備考欄

Bevacizumab (5mg/kg)+IRIS(FIRIS)

進行・再発大腸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ベバシズマブBS

5

5 mg/kg

点滴静注

day1,15

イリノテカン

125

5 mg/m²

点滴静注

day1,15

S-1

80-120

0	mg
---	----

經口

day1-14

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C023M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬

申請醫師

備考欄

IRIS(OGSG)
進行・再発大腸癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-21
イリノテカン	80	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期	35日
休薬	

[illegible]

投与開始日
服薬指導 有☐ 無☐

化学療法委員会承認月日

登録年月日 2011.2.1

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 C024M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入ステロイド、β2刺激薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	インスリン、経口血糖降下薬
外科	骨折	骨折	骨折の固定	石膏固定、手術
産婦人科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診、分娩
泌尿器科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、透析
神経科	脳卒中	脳卒中	神経機能の回復	薬物療法、リハビリテーション
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクトレンズ
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の軽減	抗生剤、点眼薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術、放射線療法
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術、化学療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、放射線療法

申請醫師

備考欄

Bevacizumab+IRIS(OGSG)

進行・再発大腸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

ベバシズマブBS

5

5 mg/kg

点滴静注

day1,15

イリノテカン

80

0	mg/m ²
---	-------------------

点滴静注

day1,15

S-1

80-120

--	--

内服

day 1-21

投与周期 35日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C025M

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Cetuximab+IRIS(1クール目)
 進行・再発大腸癌
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-14
アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	day1
アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day8, 15, 22
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day(22)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●				
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●				
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●					
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	400(初回のみ)	mg/m ²	点滴静注	120分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注			●	●	●				
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分		●	●	●				
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●		●					
6	生食	500	mL	点滴静注		●		●					
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●		●					
	S-1	80-120	mg	内服		1	→ 14						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C027M

診療科	
レジメン名	Cetuximab(2week)+IRIS
対象疾患名	進行・再発大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-14
アービタックス	500	mg/m ²	点滴静注	day1,15
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C030M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Panitumumab+IRI

進行・再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路 投与日

投与日

ベクティビックス

6 mg/kg

6 mg/kg

点滴静注

day 1

イリノテカン

150	mg/m ²
-----	-------------------

 mg/m^2

点滴静注

day 1

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C031M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

Panitumumab+IRIS
進行・再発大腸癌 (KRAS wild)
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-14
ベクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	day1,15
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●		●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●		●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●					
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●		●					
4	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	60分	●		●					
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●		●					
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●		●					
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●		●					
	S-1	80-120	mg	内服		→							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C040S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Panitumumab単剤

進行・再発大腸がん

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

ベクティビックス

6

6	mg/kg
---	-------

点滴静注

day 1

[illegible][illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C050S

診療科	消化器外科
レジメン名	Cetuximab単剤(1クール目)
対象疾患名	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

[illegible]

投与周期 7日

休薬

--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C051S

診療科	消化器外科
レジメン名	Cetuximab単剤(2クール目以降)
対象疾患名	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 7日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C052S

診療科	
レジメン名	Cetuximab単剤(2week)
対象疾患名	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 14日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C061M

診療科	
レジメン名	Cetuximab+CPT-11(2クール目以降)
対象疾患名	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22
イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C070M

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名	XELOX
-------	-------

対象疾患：進行大腸癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C071M

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Bevacizumab+XELOX	
-------------------	--

对象疾患名

進行大腸癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	点滴静注	1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C072S

診療科	
レジメン名	Bevacizumab+XELOX (OX抜き)
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C080M

診療科	
レジメン名	FOLFIRI
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1
5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C081M

診療科 申請医師 備考欄
 レジメン名 Bevacizumab (5mg/kg) + FOLFIRI
 対象疾患名 進行大腸癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	100	mL	90分→60分→30分		●							
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	ポート		●							
4-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
4-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	イリノテカン	150	mg/m ²	ポート	90分	●							
5	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
6	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150mL		ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C083M

診療科		申請医師	
レジメン名	Panitumumab+FOLFIRI		
対象疾患名	進行大腸癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
4	生食	100	mL	ポート		●							
	ベクティビックス	6	mg/kg	ポート	1時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	イリノテカン	150	mg/m ²	ポート	90分	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150mL		ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C084M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	サイラムザ	8	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート	点滴	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
4	生食	250	mL	ポート		●							
	サイラムザ	8	mg/kg	ポート	60分→30分	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	イリノテカン	150	mg/m ²	ポート	90分	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150mL		ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C090M

診療科	
レジメン名	FOLFOX6
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
3-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●							
4	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
5	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C091L

診療科	
レジメン名	FOLFOX6(OX抜き)
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C100M

診療科	
レジメン名	Bevacizumab (5mg/kg)+mFOLFOX6
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	100	mL	ポート		●							
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	90分→30分		●							
4-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
4-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●							
5	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
6	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C102L

診療科		申請医師	
レジメン名	Bevacizumab (5mg/kg) +mFOLFOX6 (OX抜き)		
対象疾患名	進行大腸癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬	
----	--

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート	点滴	●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	100	mL	ポート		●							
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	90分→30分		●							
4	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
5	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
6	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C110M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	単位	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
4	生食	100	mL	ポート		●							
	ベクティビックス	6	mg/kg	ポート	1時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C111L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベクティビックス	6	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	単位	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
4	生食	100	mL	ポート		●							
	ベクティビックス	6	mg/kg	ポート	1時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C121M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

Bevacizumab + SIR 3week

進行・再発大腸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

S-1

80-120

mg

經口

day 1-1

ベノバ

7.5

5	mg/kg
---	-------

点滴静

day 1

イリノテカン

125

 mg/m^2

点滴静

day 1

[illegible]

--	--

[illegible]

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期

21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C122M

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Cetuximab+SIR 3week(初回)

進行・再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

S-1

80-120

mg

經口

day1-14

ア—

400

mg/r

点滴静注

day1

アービタックス

250

mg/r

点滴静注

day8,	
-------	--

イリノテカン

100

mg/r

点滴静注

day 1

[illegible]

	1997	1998	1999
1997			
1998			
1999			

	C

[illegible][illegible]投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	120分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注			●	●					
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分		●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●							
6	S-1	80-120	mg	内服		1	→	14					

レジメン記入フォーマット

登録番号 C123M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

Cetuximab+SIR 3week(2回目以降)	
----------------------------	--

進行・再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

S-1	80-120	mg	経口	day1-14
アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	ポラミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●	●	●					
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	生食	500	mL	点滴静注		●							
	イリノテカン	100	mg/m ²	点滴静注	90分	●							
6	S-1	80-120	mg	内服		1	→	14					

レジメン記入フォーマット

登録番号 **C130M**

診療科	
レジメン名	SOX
対象疾患名	進行・再発大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg	経口	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 **21日**[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C131M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

Bevacizumab+SOX

進行・再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg	経口	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	120分	●							
5	S-1	80-120	mg	内服									

レジメン記入フォーマット

登録番号 C140M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

Cetuximab+SOX(1クール目)

Kras wild-type大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg	経口	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	day1
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day8,15

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●		●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●		●				
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●		●				
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	120分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注			●		●				
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分		●		●				
6	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
7	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	120分	●							
8	S-1	80-120	mg	経口	内服								

レジメン記入フォーマット

登録番号 C141M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

Cetuximab+SOX(2クール目以降)

Kras wild-type大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg	経口	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(9-14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●		●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●		●				
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●	●		●				
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●	●		●				
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●		●				
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
6	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	120分	●							
7	S-1	80-120	mg	経口	内服	→	→	→	→				

レジメン記入フォーマット

登録番号 C150S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

UFT/LV/Bevacizumab

対象疾患名

切除不能進行再發大腸癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ユーエフティ

300

 mg/m^2

内服

day1-2

ホリナート

75

mg

内服

day1-2

ベバシズマブBS

5

mg/kg

点滴静注

day1,15

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C160M

診療科		申請医師	
レジメン名	Aflibercept+FOLFIRI		
対象疾患名	切除不能進行再発大腸癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ザルトラップ	4	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
4	生食	250	mL	ポート		●							
	ザルトラップ	4	mg/kg	ポート	1時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	イリノテカン	150	mg/m ²	ポート	90分	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150mL		ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C170H

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

FOLFOXIRI

对象疾患名

切除不能進行再発大腸癌

治療目的

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

レボホリナート

200

 mg/m^2

点滴静注

day1

オキサリプラチン

85

 mg/m^2

点滴静注

day1

イリノテカン

165

 mg/m^2

点滴静注

day1

5FU

3200

 mg/m^2

持續靜注

day1-3

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C171L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

5-FU/LV(FOLFOXIRI維持療法)

切除不能進行再發大腸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

レボホリナート

200

mg/m²

点滴静注

day1

5FU

3200

mg/m ²

持続静注

day1-3

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C180H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

Bevacizumab+FOLFOXIRI

切除不能進行再発大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	165	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	3200	mg/m ²	持続静注	day1-3

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	ポート		●							
	アロカリス	235	mg	ポート		●							
	デカドロン	9.9	mg	ポート	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	100	mL	ポート		●							
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	ポート	90分→30分	●							
5	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	イリノテカン	165	mg/m ²	ポート	1時間	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●							
7	5FU	3200	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注N	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150mL		ポート	3.7mL/h	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C181L

診療科		申請医師	
レジメン名	5-FU/LV+Bevacizumab(FOLFOXIRI+Bevacizumab維持療法)		
対象疾患名	切除不能進行再発大腸癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	3200	mg/m ²	持続静注	day1-3

投与周期 14日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C190S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴	day1
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	day1-7
	メクトビ	90	mg/day	内服	day1-7

投与周期 7日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	分1	●	●						
	メクトビ	90	mg/day	内服	分2	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C191S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴	day1
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	day1-7
	メクトビ	90	mg/day	内服	day1-7

投与周期 7日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	1時間	●							
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	分1	●	●						
	メクトビ	90	mg/day	内服	分2	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C200S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

Encorafenib+Cetuximab (初回)

対象疾患名

BRAF V600変異陽性の切除不能進行再発大腸癌

治療目的

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

薬品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

[illegible]投与周期 **7日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C192S

診療科		申請医師	
レジメン名	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab (2week)		
対象疾患名	BRAF V600変異陽性の切除不能進行再発大腸癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

[illegible]

投与周期 14日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C201S

診療科 [] 申請医師 []
 レジメン名 Encorafenib+Cetuximab（維持）
 対象疾患名 BRAF V600変異陽性の切除不能進行再発大腸癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

[illegible]

投与周期 7日

休薬	
----	--

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ポララミン	5	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	1時間	●							
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	分1	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C202S

診療科 申請医師
 レジメン名 Encorafenib+Cetuximab (2week)
 対象疾患名 BRAF V600変異陽性の切除不能進行再発大腸癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

[illegible]

投与周期 14日

休薬	
----	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C210S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術、石膏固定
産婦人科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診、分娩
泌尿器科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、透析
神経科	脳卒中	脳卒中	神経機能の回復	薬物療法、リハビリテーション
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクトレンズ
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の抑制	点眼薬、内服薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術、放射線療法
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術、化学療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法

申請医師

備考欄

Encorafenib+Cetuximab (2week)

高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

[illegible]

投与周期 21日

21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C211S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Ipilimumab + Nivolumab (結腸・直腸癌)

高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

480

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C220S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab+Pertuzumab (初回)	
-----------------------------	--

HER2陽性大腸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パージエタ	840	mg/body	点滴静注	day1
-------	-----	---------	------	------

トラスツズマブBS	8 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C221S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

	Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
--	-------------------------------

HER2陽性大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

[illegible]

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C230S

診療科	
レジメン名	Bevacizumab (5mg/kg)+TAS-102
対象疾患名	進行大腸癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ペバシズマブBS	5	mg/kg	点滴静注	1.15
	ロンサーフ	70	mg/m ²	内服	1-5.8-12

投与周期 28日

休薬	
----	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

Bevacizumab (5mg/kg)+TAS-102
切除不能な進行再発大腸癌
□術前 □術後補助 ■再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 C240M

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アービタックス	500	mg/m ²	点滴静注	day1
レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート	×	●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	ポララミン	5	mg	ポート	15分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
4	生食	250	mL	ポート		●							
	アービタックス	500	mg/m ²	ポート	2時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 C241L

診療科		申請医師	
レジメン名	Cetuximab (2W) + mFOLFOX6		
対象疾患名	切除不能な進行再発大腸癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	500	mg/m ²	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	単位	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	ポララミン	5	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
4	生食	250	mL	ポート		●							
	アービタックス	500	mg/m ²	ポート	2時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 **C250S**

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Sotorasib+Panitumumab	
-----------------------	--

KRAS G12C 変異陽性の切除不能進行再発大腸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

ベクティビックス

6

6 mg/kg

点滴静注

day 1

ルマケラス

960

mg/day

内服

day1-14

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C260M

診療科		申請医師	
レジメン名	Encorafenib + Cetuximab + mFOLFOX6		
対象疾患名	BRAFV600E変異を有する化学療法未治療の切除不能な進行再発大腸癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	500	mg/m ²	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	day1-14

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	ボララミン	5	mg	ポート	15分	●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
4	生食	250	mL	ポート		●							
	アービタックス	500	mg/m ²	ポート	2時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6-1	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
6-2	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート	2時間	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注M	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	分1	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C261L

診療科 申請医師 備考欄
 レジメン名 Encorafenib + Cetuximab + mFOLFOX6 (OX抜き)
 対象疾患名 BRAFV600E変異を有する化学療法未治療の切除不能な進行再発大腸癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	500	mg/m ²	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	day1-14

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	単位	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート	×	●							
2	生食	50	mL	ポート		●							
	ボララミン	5	mg	ポート	15分	●							
3	生食	50	mL	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
4	生食	250	mL	ポート		●							
	アービタックス	500	mg/m ²	ポート	2時間	●							
5	生食	50	mL	ポート	フラッシュ	●							
6	5%糖液	250	mL	ポート		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート	2時間	●							
7	生食	50	mL	ポート		●							
	5FU	400	mg/m ²	ポート	5分	●							
8	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●							
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●							
	ビラフトビ	300	mg/day	内服	分1	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 C270M

診療科		申請医師	
-----	--	------	--

レジメン名	CAPIRI
-------	--------

対象疾患：切除不能な進行再発大腸癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	イリノテカン	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	カペシタビン	1600	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日 休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C271M

診療科

--

申請医師

備考欄

レジメン名	Bevacizumab+CAPIRI
-------	--------------------

対象疾患: 切除不能な進行再発大腸癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	点滴静注	day1
	イリノテカン	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	カペシタビン	1600	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C280S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PHESGO(初回)(大腸)

HER2陽性大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

フェスゴ[®]IN

ヘルツスマフ 1200

1200

mg/body

皮下注

1001

トラスツスマブ 600

600

mg/body

皮卜注

day 1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 C281S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PHESGO(2回目以降)(大腸)

HER2陽性大腸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

フェスゴ[®]MA

ヘルツスマフ 600

600

600

mg/body

皮下注	
-----	--

day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]