

code	レジメン名
HN010L	wPTX+Cetuximab(初回)
HN011L	wPTX+Cetuximab(2回目以降)
HN020S	Nivolumab単剤(頭頸部癌)(2W)
HN030H	FP+Pembrolizumab
HN040M	FC+Pembrolizumab

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 wPTX+Cetuximab(初回)
 対象疾患名 再発・転移性頭頸部癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	day1
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()					
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	ボラミン	5	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注		●						
	5%ブドウ糖	250	mL	点滴静注	60分	●						
4	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●						
5	生食	500	mL	点滴静注		●						
	アービタックス	400	mg/m ²	点滴静注	120分	●						

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 wPTX+Cetuximab(2回目以降)
 対象疾患名 再発・転移性頭頸部癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	day1
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()						
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ボララミン	5	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●							
3	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%ブドウ糖	250	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	アービタックス	250	mg/m ²	点滴静注	60分	●							

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 | HN030H

診療科 申請医師 備考欄
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	シスプラチン	100	mg/m ²	点滴	day1
	5FU	1000	mg/m ²	点滴	day1-4

投与周期

休業

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()				
						●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●	●	●					
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
5	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
6	生食	50	mL	点滴静注			●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
7-1	生食	1000	mL	持続点滴		●	●	●					
	5FU	1000	mg/m ²	持続点滴	24時間	●	●	●					
7-2	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	100	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
8	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注			●						
	プリンペラン	1	A	点滴静注	2時間		●						
11	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●	●					
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80						

レジメン記入フォーマット

登録番号 HN040M

診療科
 レジメン名 FC+Pembrolizumab
 対象疾患名 頭頸部癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	カルボプラチン	AUC5	mg	点滴	day1
	5FU	1000	mg/m ²	点滴	day1-4

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()				
						●	●	●					
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
4-1	生食	1000	mL	持続点滴		●	●	●					
	5FU	1000	mg/m ²	持続点滴	24時間	●	●	●					
4-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC5		点滴静注	60分	●							
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●125	●80						