

| code | レジメン名 |
|------------------------|-----------------------|
| HN010L | wPTX+Cetuximab(初回) |
| HN011L | wPTX+Cetuximab(2回目以降) |
| HN020S | Nivolumab単剤(頭頸部癌)(2W) |
| HN021S | Nivolumab単剤(頭頸部癌)(4W) |
| HN030H | FP+Pembrolizumab |
| HN040M | FC+Pembrolizumab |

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 wPTX+Cetuximab(初回)
 対象疾患名 再発・転移性頭頸部癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|---------|-------|-------------------|------|------|
| | アービタックス | 400 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | パクリタキセル | 80 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|---------|-----|-------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | ボラミン | 5 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | ファモチジン | 20 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 3 | パクリタキセル | 80 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖 | 250 | mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | フラッシュ | ● | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 500 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | アービタックス | 400 | mg/m ² | 点滴静注 | 120分 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 wPTX+Cetuximab(2回目以降)
 対象疾患名 再発・転移性頭頸部癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|---------|-------|-------------------|------|------|
| | アービタックス | 250 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | パクリタキセル | 80 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|---------|-----|-------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | ボララミン | 5 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | ファモチジン | 20 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 3 | パクリタキセル | 80 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖 | 250 | mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | フラッシュ | ● | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 250 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | アービタックス | 250 | mg/m ² | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 HN020S

診療科 申請医師

レジメン名 Nivolumab単剤(頭頸部癌)(2W)

対象疾患名 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

備考欄

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-------|-------|---------|------|------|
| オブジーボ | 240 | mg/body | 点滴静注 | day1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投与周期 14日

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|--------|-----|---------|-------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | × | ● | | | | | | |
| 2 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| | オブジーボ | 240 | mg/body | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 HN021S

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Nivolumab単剤(頭頸部癌)(4W)

対象疾患名 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-------|-------|---------|------|------|
| オブジーボ | 480 | mg/body | 点滴静注 | day1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投与周期

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|--------|-------------|-------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 100 mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | オブジーボ | 480 mg/body | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

投与開始日

服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 | HN030H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名

対象疾患名

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|--------|-------|-------------------|------|--------|
| | キイトルーダ | 200 | mg/body | 点滴静注 | day1 |
| | シスプラチン | 100 | mg/m ² | 点滴 | day1 |
| | 5FU | 1000 | mg/m ² | 点滴 | day1-4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期

休業

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2-3) | Day(4) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|-----|------------|--------|-------------------|-------|----------------|----------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | ● | ● | | | | | |
| 2 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 3 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | キイトルーダ | 200 | mg/body | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| 5 | パロノセトロンバック | 0.75 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 6 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | | ● | ● | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | 15分 | | ● | ● | | | | | |
| 7-1 | 生食 | 1000 | mL | 持続点滴 | | ● | ● | ● | | | | | |
| | 5FU | 1000 | mg/m ² | 持続点滴 | 24時間 | ● | ● | ● | | | | | |
| 7-2 | 生食 | 400 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | シスプラチン | 100 | mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 8 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | フロセミド | 20 | mg | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 9 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 10 | ソルデム3A | 500 | mL | 点滴静注 | | | ● | | | | | | |
| | プリンペラン | 1 | A | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| 11 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | ● | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | mg | 内服 | | ●125 | ●80 | | | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 HN040M

診療科
 レジメン名 FC+Pembrolizumab
 対象疾患名 頭頸部癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|---------|-------|-------------------|------|--------|
| | キイトルーダ | 200 | mg/body | 点滴静注 | day1 |
| | カルボプラチン | AUC5 | mg | 点滴 | day1 |
| | 5FU | 1000 | mg/m ² | 点滴 | day1-4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期 21日

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2-3) | Day(4) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|-----|------------|--------|-------------------|-------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 30分 | ● | ● | ● | | | | | |
| 2 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | キイトルーダ | 200 | mg/body | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| 3 | パロノセトロンバック | 0.75 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 4-1 | 生食 | 1000 | mL | 持続点滴 | | ● | ● | ● | | | | | |
| | 5FU | 1000 | mg/m ² | 持続点滴 | 24時間 | ● | ● | ● | | | | | |
| 4-2 | 5%糖液 | 250 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | カルボプラチン | AUC5 | | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | mg | 内服 | | ●125 | ●80 | | | | | | |