

code	レジメン名
B020S	Trastuzumab (3w) (初回)
B021S	Trastuzumab (3w) (2回目以降)
B040L	Weekly PTX (3投1休)
B041L	Weekly PTX (12w)
B050L	PTX+Bevacizumab
B060L	Eribulin単剤
B070L	PTX+Trastuzumab
B080L	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
B081L	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)
B090S	Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
B091S	Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)
B100L	nab-PTX
B110H	ADR単剤
B120H	AC
B121H	dose-dense AC
B131M	TC
B143H	EC100
B144H	EC75
B145H	dose-dense EC
B150L	dose-dense PTX
B160L	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
B161L	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)
B170L	T-DM1
B180L	DTX75
B192L	DTX75+Trastuzumab(3w) (初回)
B193L	DTX75+Trastuzumab(3w) (2回目以降)
B200L	GEM (2投1休)
B212L	GEM(2投1休)+Trastuzumab (初回)
B213L	GEM(2投1休)+Trastuzumab (2回目以降)
B220L	GEM+PTX
B230L	VNR(2投1休)
B242L	VNR(2投1休)+Trastuzumab (初回)
B243L	VNR(2投1休)+Trastuzumab (2回目以降)
B244L	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
B245L	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)
B251M	CMF (modified)
B260M	CPT-11 original (3投2休)
B272M	TC+Trastuzumab (初回)
B273M	TC+Trastuzumab (2回目以降)
B280L	Eribulin+Trastuzumab (初回)
B281L	Eribulin+Trastuzumab (2回目以降)
B282L	Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)
B283L	Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)
B292M	DTX+CBDCA+Trastuzumab (初回)
B293M	DTX+CBDCA+Trastuzumab (2回目以降)
B300S	Capecitabine+Trastuzumab (初回)
B301S	Capecitabine+Trastuzumab (2回目以降)
B310L	Atezolizumab+nab-PTX
B320M	Trastuzumab Deruxtecan
B330L	Pembrolizumab+PTX
B340M	Pembrolizumab+GEM+CBDCA

レジメン記入フォーマット

登録番号 B020S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab (3w) (初回)	
-----------------------	--

HER2陽性乳癌

薬品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

トラスツズマブBS

8

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B021S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab (3w) (2回目以降)	
--------------------------	--

HER2陽性乳癌

薬品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

トラスツズマブBS

6

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科	内科	申請医師	
レジメン名	Weekly PTX (12w)		
対象疾患名	乳癌		
治療目的	<input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

登録番号 B041L

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78

投与周期 84日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B050L

診療科	
レジメン名	PTX+Bevacizumab
対象疾患名	乳癌
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師 河村 貴

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	パクリタキセル	90	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
	アバスチン	10	mg/kg	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

休薬	
----	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B060L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Eribulin単剤

乳癌、惡性軟部腫瘍

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

Eribulin

1.4

 mg/m^2

点滴静注

day1.8

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B070L

診療科	
レジメン名	PTX+Trastuzumab
対象疾患名	乳癌
治療目的	<input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

バクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78
トラスツズマブBS(初回)	4	mg/kg	点滴静注	day1
トラスツズマブBS(2～12回)	2	mg/kg	点滴静注	day8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78

投与周期 84日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B080L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)

HER2陽性乳癌

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	デカドロン錠	8	mg	経口	分1		●	●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師	
DTX+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)		
HER2陽性乳癌		

備考欄

登録番号 B081L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	デカドロン錠	8	mg	経口	分2		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B090S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab+Pertuzumab (初回)	
-----------------------------	--

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B091S

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)	
--------------------------------	--

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パーゼタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B100L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

nab-PTX

乳癌

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

アブラキサン

260

 mg/m^2

点滴静注

day 1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B110H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

ADR单剂

轉移性乳癌

☐ 術育 ☐ 術後補 ☒ 再発・進

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドキソルビン

75

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B120H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

AC

乳癌

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキソルビシン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンパツ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	30	mL	点滴静注		●						
	ドキソルビシン	60	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	30分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B121H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

dose-dense AC

乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与目

ドキソルビシン

60

 mg/m^2

点滴静注

day 1

エンドキサン

600

 mg/m^2

点滴静注

day 1

投与周期 14日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンパッチ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	30	mL	点滴静注		●						
	ドキソルビシン	60	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	30分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B131M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用薬

申請医師

備考欄

TC	
----	--

乳癌

術育 術後補 再発・進

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドセタキセル

75

 mg/m^2

点滴静注

day1

エンドキサン

600

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	30分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B143H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

EC100

乳癌

☐術前 ☒術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エピルビシン	100	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	エピルビシン	100	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	30分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B144H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

EC75

乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

エピルビシン

75

 mg/m^2

点滴静注

day1

エンドキサン

500

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	エビルピシン	75	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	30分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B145H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

☐ dose-dense EC
 乳癌
 ■術前 ■術後補助 □再発・進行

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エビルピシン	90	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	エビルピシン	90	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	30分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)	●(80)				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B150L

診療科	
レジメン名	dose-dense PTX
対象疾患名	乳癌
治療目的	

申請醫師

備考欄

[illegible]

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B160L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)

HER2陽性乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パーゼタ	840	mg/body	点滴静注	day1
------	-----	---------	------	------

トラスツズマブBS	8 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
---------	----------------------	------	-----------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B170L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

T-DM1

HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

カドサイラ

3.6

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B180L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

DTX75

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドセタキセル

75

 mg/m^2

点滴静注

day 1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B193L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

DTX75+Trastuzumab(3w)(2回目以降)
乳癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	6 mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B200L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術、石膏固定
婦人科	月経不調	月経不調	月経の正常化	ホルモン療法
産科	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	血圧のコントロール	内服薬、安静臥床
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	脂質のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	痔瘻の切除	手術
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性気管支炎	アレルギー性気管支炎	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能の維持	内服薬、食事療法
外科	胆石症	胆石症	胆石の切除	手術
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	筋腫の切除	手術
産科	前置胎盤	前置胎盤	出血のコントロール	安静臥床、手術
小児科	アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	症状の改善	点眼薬
内科	慢性肝臓病	慢性肝臓病	肝機能の維持	内服薬、食事療法
外科	膵臓癌	膵臓癌	癌の切除	手術
皮膚科	日光性角化症	日光性角化症	症状の改善	外用薬
小児科	アレルギー性気管支炎	アレルギー性気管支炎	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能の維持	内服薬、食事療法
外科	胆石症	胆石症	胆石の切除	手術
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	筋腫の切除	手術
産科	前置胎盤	前置胎盤	出血のコントロール	安静臥床、手術
小児科	アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	症状の改善	点眼薬
内科	慢性肝臓病	慢性肝臓病	肝機能の維持	内服薬、食事療法
外科	膵臓癌	膵臓癌	癌の切除	手術
皮膚科	日光性角化症	日光性角化症	症状の改善	外用薬

申請医師

備考欄

GEM(2投1休)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

ゲムシタビン

1250

mg/m²

点滴静注

day1,8

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B212L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

	GEM(2投1休)+Trastuzumab(初回)
--	---------------------------

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day 1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day 1

投与周期 **21日**

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食 デカドロン	50 6.6	mL mg	点滴静注 点滴静注	15分	●	●						
3	生食 ゲムシタビン	100 1250	mL mg/m ²	点滴静注 点滴静注	30分	●	●						
4	生食 トラスツズマブBS	250 8	mL mg/kg	点滴静注 点滴静注	90分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B213L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

GEM(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)	
------------------------------	--

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食 デカドロン	50 6.6	mL mg	点滴静注 点滴静注	15分	●	●						
3	生食 ゲムシタビン	100 1250	mL mg/m ²	点滴静注 点滴静注	30分	●	●						
4	生食 トラスツズマブBS	250 6	mL mg/kg	点滴静注 点滴静注	90→30分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B220L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

GEM+PTX

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路 投与日

投与目

ゲムシタビン

1250

 mg/m^2

点滴静注

dav1.8

パクリタキセル

175

 mg/m^2

点滴静注

day 1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●	●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●							
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B230L

診療科

レジメン名	VNR(2投1休)
-------	-----------

対象疾患名 **乳癌**

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B242L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

VNR(2投1休)+Trastuzumab(初回)	
---------------------------	--

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B243L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

VNR(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B244L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用剤

申請医師

備考欄

VNR+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)	
---------------------------------	--

HER2陽性転移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パーゼタ	840	mg/body	点滴静注	day1
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B245L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)

HER2陽性轉移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B251M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CMF (modified)
乳癌
☐術前 ☒術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メソトレキセート	40	mg/m ²	点滴静注	day1,8
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1,8
5-FU	500	mg/m ²	点滴静注	day1,8

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	メソトレキセート	40	mg/m ²	点滴静注	20分	●	●					
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	5-FU	500	mg/m ²	点滴静注	20分	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B260M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

CPT-11 original(3投2休)
 乳癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	80-100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 35日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TC+Trastuzumab (初回)
乳癌

申請医師

備考欄

登録番号 B272M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	4	mg/kg	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	day8,15

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●		
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	4	mg/kg	点滴静注	90分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注					●	●		
	トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	90→30分				●	●		
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TC+Trastuzumab (2回目以降)
乳癌

申請医師

備考欄

登録番号 B273M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	day1,8,15

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●		
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●			●	●		
	トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	90→30分	●			●	●		
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B280L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab (初回)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

ハラヴェン

1.4

 mg/m^2

点滴静注

day1,8

トラスツズマブBS

8

mg/kg

点滴静注

day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食 デカドロン	50 6.6	mL mg	点滴静注 点滴静注		●	●						
3	生食 ハラヴェン	30 1.4	mL mg/m ²	点滴静注 点滴静注	全開 約2～5分	●	●						
4	生食 トラスツズマブBS	250 8	mL mg/kg	点滴静注 点滴静注		●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B281L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab (2回目以降)	
------------------------------	--

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

ハラヴェン

1.4

 mg/m^2

点滴静注

day1,8

トラスツズマブBS

6

mg/kg

点滴静注

day1

投与周期 **21日**

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B282L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)

HER2陽性転移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B283L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)

HER2陽性轉移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休藥

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B292M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
DTX+CBDCA+Trastuzumab (初回)	
乳癌	

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B293M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

DTX+CBDCA+Trastuzumab (2回目以降)

乳癌

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

トラスツズマブBS

6

mg/kg

点滴静注

day 1

ドセタキセル

75

 mg/m^2

点滴静注

day1

カルボプラチ

AUC 6

点滴静注

day1

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B300S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎治療薬	アトピー性皮膚炎	皮膚の炎症を抑え、かゆみを軽減する	外用薬（ステロイド、保湿剤）の塗布、保湿ケア
内科	高血圧治療薬	高血圧症	血圧を正常範囲に下げ、心血管リスクを減らす	経口薬（利尿剤、カルシウム拮抗薬など）の投与
外科	関節置換術	変形性関節症	痛みを軽減し、関節機能を回復させる	人工関節の手術、術後のリハビリテーション
小児科	喘息治療薬	喘息	気管支の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（ブロンходилレーター、ステロイド）の使用
婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を防ぐ	経口避妊薬（ピル）の服用、避妊具の使用
泌尿科	前立腺癌治療薬	前立腺癌	癌の進行を抑え、症状を軽減する	経口薬（ホルモン療法）、手術
眼科	緑内障治療薬	緑内障	眼圧を下げて視神経を保護する	点眼薬（降圧剤）の投与
耳鼻科	アレルギー性鼻炎治療薬	アレルギー性鼻炎	鼻の炎症を抑え、症状を軽減する	点鼻薬（ステロイド）、抗アレルギー薬
皮膚科	白癜治療薬	白癜	色素沈着を促進し、皮膚の色を正常化する	外用薬（ビタミンD誘導体）、光療法
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン感受性増進剤）、インスリン注射
外科	胆嚢切除術	胆嚢炎	胆嚢を切除し、炎症を軽減する	胆嚢切除手術
小児科	小児喘息治療薬	小児喘息	小児の気管支の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（ブロンходилレーター、ステロイド）の使用
婦人科	子宮頸がん予防薬	子宮頸がん予防	子宮頸がんの発生を予防する	ワクチン接種（HPVワクチン）
泌尿科	腎臓病治療薬	慢性腎臓病	腎臓機能を保護し、症状を軽減する	経口薬（降圧剤、利尿剤）、透析
眼科	糖尿病性網膜症治療薬	糖尿病性網膜症	網膜の血管障害を改善し、視力を保つ	点眼薬（抗VEGF薬）、レーザー治療
耳鼻科	中耳炎治療薬	中耳炎	中耳の炎症を抑え、聴力を回復させる	点耳薬（抗生剤、ステロイド）、手術
皮膚科	乾癬治療薬	乾癬	皮膚の炎症を抑え、症状を軽減する	外用薬（ステロイド、ビタミンD誘導体）、光療法
内科	心臓病治療薬	心臓病	心臓機能を改善し、症状を軽減する	経口薬（利尿剤、β遮断薬）、手術
外科	膵臓癌治療薬	膵臓癌	癌の進行を抑え、症状を軽減する	化学療法（抗がん剤）、手術
小児科	小児糖尿病治療薬	小児糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	インスリン注射
婦人科	更年期障害治療薬	更年期障害	更年期の症状を軽減する	経口薬（ホルモン療法）、漢方薬
泌尿科	前立腺癌治療薬	前立腺癌	癌の進行を抑え、症状を軽減する	経口薬（ホルモン療法）、手術
眼科	緑内障治療薬	緑内障	眼圧を下げて視神経を保護する	点眼薬（降圧剤）、手術
耳鼻科	アレルギー性鼻炎治療薬	アレルギー性鼻炎	鼻の炎症を抑え、症状を軽減する	点鼻薬（ステロイド）、抗アレルギー薬
皮膚科	白癜治療薬	白癜	色素沈着を促進し、皮膚の色を正常化する	外用薬（ビタミンD誘導体）、光療法
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン感受性増進剤）、インスリン注射
外科	胆嚢切除術	胆嚢炎	胆嚢を切除し、炎症を軽減する	胆嚢切除手術
小児科	小児喘息治療薬	小児喘息	小児の気管支の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（ブロンходилレーター、ステロイド）の使用
婦人科	子宮頸がん予防薬	子宮頸がん予防	子宮頸がんの発生を予防する	ワクチン接種（HPVワクチン）
泌尿科	腎臓病治療薬	慢性腎臓病	腎臓機能を保護し、症状を軽減する	経口薬（降圧剤、利尿剤）、透析
眼科	糖尿病性網膜症治療薬	糖尿病性網膜症	網膜の血管障害を改善し、視力を保つ	点眼薬（抗VEGF薬）、レーザー治療
耳鼻科	中耳炎治療薬	中耳炎	中耳の炎症を抑え、聴力を回復させる	点耳薬（抗生剤、ステロイド）、手術
皮膚科	乾癬治療薬	乾癬	皮膚の炎症を抑え、症状を軽減する	外用薬（ステロイド、ビタミンD誘導体）、光療法
内科	心臓病治療薬	心臓病	心臓機能を改善し、症状を軽減する	経口薬（利尿剤、β遮断薬）、手術
外科	膵臓癌治療薬	膵臓癌	癌の進行を抑え、症状を軽減する	化学療法（抗がん剤）、手術
小児科	小児糖尿病治療薬	小児糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	インスリン注射
婦人科	更年期障害治療薬	更年期障害	更年期の症状を軽減する	経口薬（ホルモン療法）、漢方薬
泌尿科	前立腺癌治療薬	前立腺癌	癌の進行を抑え、症状を軽減する	経口薬（ホルモン療法）、手術
眼科	緑内障治療薬	緑内障	眼圧を下げて視神経を保護する	点眼薬（降圧剤）、手術
耳鼻科	アレルギー性鼻炎治療薬	アレルギー性鼻炎	鼻の炎症を抑え、症状を軽減する	点鼻薬（ステロイド）、抗アレルギー薬
皮膚科	白癜治療薬	白癜	色素沈着を促進し、皮膚の色を正常化する	外用薬（ビタミンD誘導体）、光療法
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン感受性増進剤）、インスリン注射
外科	胆嚢切除術	胆嚢炎	胆嚢を切除し、炎症を軽減する	胆嚢切除手術
小児科	小児喘息治療薬	小児喘息	小児の気管支の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（ブロンходилレーター、ステロイド）の使用
婦人科	子宮頸がん予防薬	子宮頸がん予防	子宮頸がんの発生を予防する	ワクチン接種（HPVワクチン）
泌尿科	腎臓病治療薬	慢性腎臓病	腎臓機能を保護し、症状を軽減する	経口薬（降圧剤、利尿剤）、透析
眼科	糖尿病性網膜症治療薬	糖尿病性網膜症	網膜の血管障害を改善し、視力を保つ	点眼薬（抗VEGF薬）、レーザー治療
耳鼻科	中耳炎治療薬	中耳炎	中耳の炎症を抑え、聴力を回復させる	点耳薬（抗生剤、ステロイド）、手術
皮膚科	乾癬治療薬	乾癬	皮膚の炎症を抑え、症状を軽減する	外用薬（ステロイド、ビタミンD誘導体）、光療法
内科	心臓病治療薬	心臓病	心臓機能を改善し、症状を軽減する	経口薬（利尿剤、β遮断薬）、手術
外科	膵臓癌治療薬	膵臓癌	癌の進行を抑え、症状を軽減する	化学療法（抗がん剤）、手術
小児科	小児糖尿病治療薬	小児糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	インスリン注射
婦人科	更年期障害治療薬	更年期障害	更年期の症状を軽減する	経口薬（ホルモン療法）、漢方薬
泌尿科	前立腺癌治療薬	前立腺癌	癌の進行を抑え、症状を軽減する	経口薬（ホルモン療法）、手術
眼科	緑内障治療薬	緑内障	眼圧を下げて視神経を保護する	点眼薬（降圧剤）、手術
耳鼻科	アレルギー性鼻炎治療薬	アレルギー性鼻炎	鼻の炎症を抑え、症状を軽減する	点鼻薬（ステロイド）、抗アレルギー薬
皮膚科	白癜治療薬	白癜	色素沈着を促進し、皮膚の色を正常化する	外用薬（ビタミンD誘導体）、光療法
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン感受性増進剤）、インスリン注射
外科	胆嚢切除術	胆嚢炎	胆嚢を切除し、炎症を軽減する	胆嚢切除手術
小児科				

申請医師

備考欄

Capecitabine+Trastuzumab(初回)

HER2陽性転移再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	8 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

カペシタビン	2500	mg/m ² /day	経口	day1-14
--------	------	------------------------	----	---------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬 7日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B301S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	骨折	骨折	骨折の治癒	手術療法、固定療法
婦人科	月経不調	月経不調	月経の正常化	ホルモン療法、生活習慣の改善
産科	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	血圧のコントロール	内服薬、安静臥床
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能の維持	食事療法、薬物療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	運動症状の改善	内服薬、手術療法
精神科	統合失調症	統合失調症	症状の改善	内服薬、心理療法
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	視力維持	レーザー治療、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の抑制	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の改善	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	脂質コントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の改善	手術療法、坐薬
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状の改善	ホルモン療法、手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	出血の抑制	安静臥床、手術療法
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能維持	食事療法、薬物療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	運動症状改善	内服薬、手術療法
精神科	統合失調症	統合失調症	症状改善	内服薬、心理療法
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	視力維持	レーザー治療、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症抑制	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状改善	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	脂質コントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状改善	手術療法、坐薬
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状改善	ホルモン療法、手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	出血抑制	安静臥床、手術療法
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能維持	食事療法、薬物療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	運動症状改善	内服薬、手術療法
精神科	統合失調症	統合失調症	症状改善	内服薬、心理療法
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	視力維持	レーザー治療、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症抑制	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状改善	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	脂質コントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状改善	手術療法、坐薬
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状改善	ホルモン療法、手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	出血抑制	安静臥床、手術療法
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能維持	食事療法、薬物療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	運動症状改善	内服薬、手術療法
精神科	統合失調症	統合失調症	症状改善	内服薬、心理療法
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	視力維持	レーザー治療、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症抑制	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状改善	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	脂質コントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状改善	手術療法、坐薬
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状改善	ホルモン療法、手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	出血抑制	安静臥床、手術療法
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能維持	食事療法、薬物療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	運動症状改善	内服薬、手術療法
精神科	統合失調症	統合失調症	症状改善	内服薬、心理療法
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	視力維持	レーザー治療、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症抑制	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状改善	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	脂質コントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状改善	手術療法、坐薬
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状改善	ホルモン療法、手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	出血抑制	安静臥床、手術療法
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能維持	食事療法、薬物療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	運動症状改善	内服薬、手術療法
精神科	統合失調症	統合失調症	症状改善	内服薬、心理療法
眼科	糖尿病性網膜症	糖尿病性網膜症	視力維持	レーザー治療、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症抑制	点眼薬、内服薬
皮膚科	乾癬	乾癬	症状改善	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状改善	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	脂質コントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状改善	手術療法、坐薬
婦人科	子宮筋腫	子宮筋腫	症状改善	ホルモン療法、手術療法
産科	前置胎盤	前置胎盤	出血抑制	安静臥床、手術療法
泌尿器科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能維持	食事療法、薬物療法
神経科	パーキンソン病	パーキンソン病	運動症状改善	内服薬、手術療法

申請医師

備考欄

Capecitabine+Trastuzumab(2回目以降)

HER2陽性転移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	6 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

カペシタビン	2500	mg/m ² /day	経口	day1-14
--------	------	------------------------	----	---------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬	7日
----	----

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
	カペシタビン	2500	mg/m ² /day	経口		———→							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B310L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Atezolizumab+nab-PTX

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	840	mg/body	点滴静注	day1,15
アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期

休薬

28日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	250	mL	点滴静注		●		●					
	テセントリク	840	mg/body	点滴静注	60→30分	●		●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●		●					
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
6	生食	20	mL/m ²	点滴静注		●	●	●					
	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B320M

診療科		申請医師
レジメン名	Trastuzumab Deruxtecan	
対象疾患名	HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌	
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	
治療内容		

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+PTX		
対象疾患名	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

登録番号 B330L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1 q3w
パクリタキセル	90	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15 q4w

投与周期	84日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B340M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄


Pembrolizumab+GEM+CBDCA

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	day1,8

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●						
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●					
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●					
5	生食	250	mL	点滴静注		●	●					
	カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	60分	●	●					