

code	レジメン名
<a href="#">B020S</a>	Trastuzumab(3w)(初回)
<a href="#">B021S</a>	Trastuzumab(3w)(2回目以降)
<a href="#">B040L</a>	Weekly PTX(3投1休)
<a href="#">B041L</a>	Weekly PTX(12w)
<a href="#">B050L</a>	PTX+Bevacizumab
<a href="#">B060L</a>	Eribulin単剤
<a href="#">B070L</a>	PTX+Trastuzumab
<a href="#">B080L</a>	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
<a href="#">B081L</a>	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
<a href="#">B090S</a>	Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
<a href="#">B091S</a>	Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
<a href="#">B100L</a>	nab-PTX
<a href="#">B110H</a>	ADR単剤
<a href="#">B120H</a>	AC
<a href="#">B121H</a>	dose-dense AC
<a href="#">B131M</a>	TC
<a href="#">B143H</a>	EC100
<a href="#">B144H</a>	EC75
<a href="#">B145H</a>	dose-dense EC
<a href="#">B150L</a>	dose-dense PTX
<a href="#">B160L</a>	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
<a href="#">B161L</a>	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
<a href="#">B170L</a>	T-DM1
<a href="#">B180L</a>	DTX75
<a href="#">B192L</a>	DTX75+Trastuzumab(3w)(初回)
<a href="#">B193L</a>	DTX75+Trastuzumab(3w)(2回目以降)
<a href="#">B200L</a>	GEM(2投1休)
<a href="#">B212L</a>	GEM(2投1休)+Trastuzumab(初回)
<a href="#">B213L</a>	GEM(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)
<a href="#">B220L</a>	GEM+PTX
<a href="#">B230L</a>	VNR(2投1休)
<a href="#">B242L</a>	VNR(2投1休)+Trastuzumab(初回)
<a href="#">B243L</a>	VNR(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)
<a href="#">B244L</a>	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
<a href="#">B245L</a>	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
<a href="#">B251M</a>	CMF(modified)
<a href="#">B260M</a>	CPT-11 original(3投2休)
<a href="#">B272M</a>	TC+Trastuzumab(初回)
<a href="#">B273M</a>	TC+Trastuzumab(2回目以降)
<a href="#">B280L</a>	Eribulin+Trastuzumab(初回)
<a href="#">B281L</a>	Eribulin+Trastuzumab(2回目以降)
<a href="#">B282L</a>	Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
<a href="#">B283L</a>	Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
<a href="#">B292M</a>	DTX+CBDCA+Trastuzumab(初回)
<a href="#">B293M</a>	DTX+CBDCA+Trastuzumab(2回目以降)
<a href="#">B300S</a>	Capecitabine+Trastuzumab(初回)
<a href="#">B301S</a>	Capecitabine+Trastuzumab(2回目以降)

code	レジメン名
<a href="#">B310L</a>	Atezolizumab+nab-PTX
<a href="#">B320H</a>	Trastuzumab Deruxtecan
<a href="#">B330L</a>	Pembrolizumab+PTX
<a href="#">B340M</a>	Pembrolizumab+GEM+CBDCA
<a href="#">B350M</a>	Pembrolizumab+PTX+CBDCA(3W)
<a href="#">B360M</a>	Pembrolizumab+PTX+CBDCA(1W)
<a href="#">B370H</a>	Pembrolizumab+EC
<a href="#">B380S</a>	Pembrolizumab単剤(術後)(3W)
<a href="#">B381S</a>	Pembrolizumab単剤(術後)(6W)
<a href="#">B390S</a>	PHESGO(初回)
<a href="#">B391S</a>	PHESGO(2回目以降)
<a href="#">B400L</a>	PHESGO+PTX(初回)
<a href="#">B401L</a>	PHESGO+PTX(2回目以降)
<a href="#">B410L</a>	PHESGO+DTX(初回)
<a href="#">B411L</a>	PHESGO+DTX(2回目以降)
<a href="#">B420L</a>	PHESGO+Eribulin(初回)
<a href="#">B421L</a>	PHESGO+Eribulin(2回目以降)
<a href="#">B430M</a>	DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
<a href="#">B431M</a>	DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
<a href="#">B432M</a>	PHESGO+DTX+CBDCA(初回)
<a href="#">B433M</a>	PHESGO+DTX+CBDCA(2回目以降)
<a href="#">B440M</a>	Sacituzumab Govitecan(投与量850mg未満)
<a href="#">B441M</a>	Sacituzumab Govitecan(投与量850mg以上)
<a href="#">B450M</a>	Datopotamab Deruxtecan

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B020S

診療科

レジメン名

对象疾患名

### 治療目的

## 治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab (3w) (初回)

HER2陽性乳癌

藥品名

## 標準投与量

單位

投与経路 投与日

投与日

トラスツズマブBS

8

3 mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B021S

診療科

レジメン名

对象疾患名

### 治療目的

### 治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab (3w) (2回目以降)

HER2陽性乳癌

藥品名

## 標準投与量

单位

投与経路 投与日

トラスツズマブBS

6

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B041L

診療科 内科 申請医師

レジメン名 Weekly PTX (12w)

対象疾患名 乳癌

治療目的 ☒術前 ☒術後補助 ☐再発・進行

備考欄

[illegible]

投与周期 **84日**

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B050L

診療科

レジメン名

对象疾患名

### 治療目的

\_\_\_\_\_

PTX + Bevacizumab

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

\_\_\_\_\_

備考欄

## 治療内容

藥品名

### 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

**パクリタキセル**

90

 $\text{mg/m}^2$ 

点滴静注

day1,8,15
-----------

ベバシズマブBS

10

mg/kg

点滴静注

day1,15
---------

投与周期 28日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B060L

診療科

レジメン名

对象疾患名

### 治療目的

## 治療内容

申請医師

備考欄

Eribulin単剤

**乳癌、惡性軟部腫瘍**

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

Eribulin

1.4

 $\text{mg/m}^2$ 

### 点滴静注

day1,8

投与周期 **21日**

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B070L

診療科	
-----	--

申請醫師 

備考欄

レジメン名	PTX+Trastuzumab
-------	-----------------

对象疾患名	乳癌
-------	----

治療目的 ■術前 ■術後補助 ■再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78
トラスツズマブBS(初回)	4	mg/kg	点滴静注	day1
トラスツズマブBS(2～12回)	2	mg/kg	点滴静注	day8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78

投与周期 84日

休薬	
----	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B080L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
	デカドロン錠	8	mg	経口	分1		●	●					



レジメン記入フォーマット

登録番号 B081L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師	
DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)		
HER2陽性乳癌		

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
	デカドロン錠	8	mg	経口	分2		●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B090S

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Trastuzumab+Pertuzumab (初回)	
-----------------------------	--

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
-------	-----	---------	------	------

トラスツズマブBS	8 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B091S

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

備考欄

	Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)	
--	-------------------------------	--

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

[illegible]

投与周期 21日

休薬

[illegible]

登録番号 B100L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アブラキサン	260	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

月 21 日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )	Day(    )
1	生食	100	mL	フラッシュ		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	生食	52	mL/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							
	アブラキサン	260	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●							

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B110H

診療科

レジメン名

对象疾患名

## 治療目的

## 治療内容

申請医師

備考欄

#### ADR单剂

## 轉移性乳癌

☐ 俯削 ☐ 俯俊補 ☐ 再充・進

藥品名

## 標準投与量

單位

## 投与経路

投与日

## ドキソルビン

75

5 mg/m<sup>2</sup>

#### 点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B120H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

備考欄

AC

乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

藥品名

### 標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

ドキシソルビシン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B121H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

dose-dense AC	
乳癌	

■術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキシソルビシン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B131M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

TC

乳癌

☐術前☐術後補☐再発・進

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B143H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

EC100  
乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

申請醫師 

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エピルビシン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B145H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

dose-dense EC  
乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

申請醫師 

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エピルビシン	90	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B150L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

dose-dense PTX

乳癌

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	パクリタキセル	175	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	175	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B160L

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

PTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)	
---------------------------------	--

HER2陽性乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B161L

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

PTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)	
------------------------------------	--

HER2陽性乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B170L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

T-DM1

HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

投与経路 投与日

カドサイラ

### 3.6

mg/kg

**点滴静注**

day 1

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B180L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	骨折	骨折	骨折の固定	手術、石膏固定
婦人科	月経不調	月経不調	月経の正常化	ホルモン療法
産科	妊娠高血圧症候群	妊娠高血圧症候群	血圧のコントロール	内服薬、安静
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	吸入薬、点鼻薬
内科	高脂血症	高脂血症	脂質のコントロール	内服薬、食事療法
内科	慢性腎臓病	慢性腎臓病	腎機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性肝臓病	慢性肝臓病	肝機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性心臓病	慢性心臓病	心機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性呼吸器疾患	慢性呼吸器疾患	呼吸機能の維持	吸入薬、内服薬
内科	慢性消化器疾患	慢性消化器疾患	消化機能の維持	内服薬、食事療法
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、内服薬
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	眼機能の維持	点眼薬、内服薬
内科	慢性耳鼻科疾患	慢性耳鼻科疾患	耳鼻科機能の維持	点鼻薬、点耳薬
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患	口腔機能の維持	点舌薬、点口薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、内服薬
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	眼機能の維持	点眼薬、内服薬
内科	慢性耳鼻科疾患	慢性耳鼻科疾患	耳鼻科機能の維持	点鼻薬、点耳薬
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患	口腔機能の維持	点舌薬、点口薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、内服薬
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	眼機能の維持	点眼薬、内服薬
内科	慢性耳鼻科疾患	慢性耳鼻科疾患	耳鼻科機能の維持	点鼻薬、点耳薬
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患	口腔機能の維持	点舌薬、点口薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、内服薬
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	眼機能の維持	点眼薬、内服薬
内科	慢性耳鼻科疾患	慢性耳鼻科疾患	耳鼻科機能の維持	点鼻薬、点耳薬
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患	口腔機能の維持	点舌薬、点口薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、内服薬
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	眼機能の維持	点眼薬、内服薬
内科	慢性耳鼻科疾患	慢性耳鼻科疾患	耳鼻科機能の維持	点鼻薬、点耳薬
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患	口腔機能の維持	点舌薬、点口薬
内科	慢性泌尿器疾患	慢性泌尿器疾患	泌尿機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性神経疾患	慢性神経疾患	神経機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性免疫疾患	慢性免疫疾患	免疫機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性代謝疾患	慢性代謝疾患	代謝機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性循環器疾患	慢性循環器疾患	循環機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性内分泌疾患	慢性内分泌疾患	内分泌機能の維持	内服薬、生活習慣改善
内科	慢性皮膚疾患	慢性皮膚疾患	皮膚機能の維持	外用薬、内服薬
内科	慢性眼疾患	慢性眼疾患	眼機能の維持	点眼薬、内服薬
内科	慢性耳鼻科疾患	慢性耳鼻科疾患	耳鼻科機能の維持	点鼻薬、点耳薬
内科	慢性口腔疾患	慢性口腔疾患		

DTX75
乳癌

申請医師

\_\_\_\_\_

備考欄

全球留學 | GLOBE

[illegible]投与周期 21日

21日
-----

[illegible]



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B192L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

DTX75+Trastuzumab(3w)(初回)
乳癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師 

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B193L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

DTX75+Trastuzumab(3w)(2回目以降)  
乳癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B200L

診療科

レジメン名

対象疾患名

### 治療目的

## 治療内容

申請醫師

備考欄

GEM(2投1休)

**乳癌**

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

### 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

**ゲムシタビン**

1250

0 mg/m<sup>2</sup>

### 点滴静注

day1,8

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B212L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

GEM(2投1休)+Trastuzumab(初回)	
---------------------------	--

对象疾患名

乳癌

### 治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

### 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B213L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

GEM(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)

对象疾患名

乳癌

### 治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

### 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1250	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B220L

診療科

レジメン名

对象疾患名

### 治療目的

### 治療内容

申請医師

備考欄

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

**ゲムシタビン**

1250

 $\text{mg/m}^2$ 

## 点滴静注

day1.8

パクリタキセル

175

 $\text{mg/m}^2$ 

点滴静注

day1
------

[illegible]

--

	8

--	--

--	--

投与周期 **21日**

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●	●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●							
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	175	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
	ゲムシタビン	1250	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●	●						

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B230L

診療科

レジメン名	VNR(2投1休)
-------	-----------

対象疾患名 **乳癌**

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

## 治療内容

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 21日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B242L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

VNR(2投1休)+Trastuzumab(初回)

対象疾患名

**乳癌**

### 治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

## 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B243L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

VNR(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)

対象疾患名

**乳癌**

### 治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

## 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●	●						

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B244L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
--------------------------------

对象疾患名

HER2陽性転移再発乳癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

### 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●	●						

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B245L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
-----------------------------------

对象疾患名

HER2陽性転移再発乳癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

## 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	全開	●	●						

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

CMF (modified)
乳癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 B251M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メソトレキセート	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
5-FU	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	メソトレキセート	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	20分	●	●					
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	5-FU	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	20分	●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B260M

診療科

申請醫師

備考欄

レジメン名

CPT-11 original(3投2休)
-----------------------

対象疾患名

**乳癌**

### 治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

## 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	80-100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15

投与周期 35日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
3	5%糖液	500	mL	点滴静注		●	●	●					
	イリノテカン	80-100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	●	●	●					

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

TC+Trastuzumab (初回)
乳癌

申請医師

備考欄

登録番号 B272M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	4	mg/kg	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	day8,15

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day(   )	Day(   )
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●		
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	4	mg/kg	点滴静注	90分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注					●	●		
	トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	90→30分				●	●		
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

TC+Trastuzumab(2回目以降)
乳癌

申請医師

備考欄

登録番号 B273M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	day1,8,15

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●		
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●			●	●		
	トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	90→30分	●			●	●		
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

Eribulin+Trastuzumab (初回)
乳癌
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 B280L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハラヴェン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B281L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab(2回目以降)	
-----------------------------	--

乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

### 標準投与量

單位

## 投与経路

投与日

ハラヴェン

1.4

 $\text{mg/m}^2$ 

点滴静注

day1,8
--------

トラスツズマブBS

6

mg/kg

点滴静注

day1
------


---


--	--

--	--

投与周期 **21日**

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)  
HER2陽性転移再発乳癌  
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 B282L

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハラヴェン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

		申請医師	
Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)			
HER2陽性転移再発乳癌			
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行			
薬品名	標準投与量	単位	投与経路 投与日
ハラヴェン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1,8
パージェタ	420	mg/body	点滴静注 day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注 day1

備考欄

登録番号 B283L

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師
DTX+CBDCA+Trastuzumab(初回)	
乳癌	

備考欄

登録番号 B292M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

	申請医師
DTX+CBDCA+Trastuzumab(2回目以降)	
乳癌	

申請医師

備考欄

登録番号 B293M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B300S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎治療薬	アトピー性皮膚炎	皮膚の炎症を抑え、かゆみを軽減する	外用薬（ステロイド、保湿剤）の塗布、保湿ケア
内科	高血圧治療薬	高血圧症	血圧を正常範囲内に保ち、心血管リスクを減らす	経口薬（利尿剤、カルシウム拮抗薬、ACE阻害薬など）の投与
外科	関節鏡手術	膝関節の損傷（半月板損傷、前十字靭帯断裂など）	関節内の損傷部位を修復し、機能回復を図る	関節鏡を用いた手術、術後のリハビリテーション
小児科	喘息治療薬	喘息	気道の炎症を抑え、発作を予防・軽減する	吸入薬（ブロム化カルシウム、ステロイドなど）の投与

## 申請医師

備考欄

Capecitabine+Trastuzumab(初回)

HER2陽性転移再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	8 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

カペシタビン	2500	mg/m <sup>2</sup> /day	経口	day1-14
--------	------	------------------------	----	---------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬 7日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B301S

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

	Capecitabine+Trastuzumab(2回目以降)
--	---------------------------------

HER2陽性転移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

トラスツズマブBS

6

mg/kg

### 点滴静注

day1
------

カペシタビン

2500

 $\text{mg/m}^2/\text{day}$ 

經口

day1-14
---------

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 14 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
	カペシタビン	2500	mg/m <sup>2</sup> /day	経口		————→							

# レジメン記入フォーマット

登録番号 B310L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

Atezolizumab+nab-PTX

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
テセントリク	1680	mg/body	点滴静注	day1,15
アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 8 )	Day( 15 )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )	Day(   )
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1680	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●		●					
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
6	生食	20	mL/m <sup>2</sup>	点滴静注		●	●	●					
	アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	●	●	●					



レジメン記入フォーマット

登録番号 B320H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.27	mL/kg	点滴静注		●							
	エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	90分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

## レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+PTX		
対象疾患名	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

登録番号 B330L

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ <sup>®</sup>	200	mg/body	点滴静注	day1 q3w
パクリタキセル	90	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15 q4w

投与周期 **84日**

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B340M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+GEM+CBDCA
-------------------------

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	day1,8

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B350M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+PTX+CBDCA(3W)		
対象疾患名	ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌		
治療目的	■術前 □術後補助 □再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC5		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B360M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+PTX+CBDCA(1W)	
-----------------------------	--

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC1.5		点滴静注	day1,8,15

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B370H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+EC

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

藥品名

### 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
エピルビシン	90	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B380S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

Pembrolizumab単剤(術後)(3W)
-------------------------

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

□術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ <sup>®</sup>	200	mg/body	点滴静注	day1
---------------------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--


--	--	--	--	--

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B381S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

Pembrolizumab単剤(術後)(6W)
-------------------------

## ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

□術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ	400	mg/body	点滴静注	day1
--------	-----	---------	------	------







--	--	--	--	--

投与周期 42日

[illegible]



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B390S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用剤

申請医師

備考欄

PHESGO (初回)

HER2陽性乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

### 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

フェスゴIN

ヘルツスマフ 1200

mg/body
---------

皮下注

day 1

トラスツズマブ	600
---------	-----

mg/body

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B391S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用剤

申請医師

備考欄

PHESGO(2回目以降)

HER2陽性乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

フェスゴ<sup>TM</sup>MA

ヘルツスマフ 600

mg/body
---------

皮下注

day1

**トラスツスマブ 600**

mg/body

反下注	
-----	--

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25	Day 26	Day 27	Day 28	Day 29	Day 30	Day 31	Day 32	Day 33	Day 34	Day 35	Day 36	Day 37	Day 38	Day 39	Day 40	Day 41	Day 42	Day 43	Day 44	Day 45	Day 46	Day 47	Day 48	Day 49	Day 50	Day 51	Day 52	Day 53	Day 54	Day 55	Day 56	Day 57	Day 58	Day 59	Day 60	Day 61	Day 62	Day 63	Day 64	Day 65	Day 66	Day 67	Day 68	Day 69	Day 70	Day 71	Day 72	Day 73	Day 74	Day 75	Day 76	Day 77	Day 78	Day 79	Day 80	Day 81	Day 82	Day 83	Day 84	Day 85	Day 86	Day 87	Day 88	Day 89	Day 90	Day 91	Day 92	Day 93	Day 94	Day 95	Day 96	Day 97	Day 98	Day 99	Day 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

投与周期 21日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B400L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

PHESGO+PTX(初回)

## HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴIN	ヘルツスマブ 1200	mg/body	皮下注	day1
	トラスツスマブ 600	mg/body		
パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B401L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用薬

PHESGO+PTX(2回目以降)	
HER2陽性乳癌	

申請医師 

備考欄

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴMA	ヘルツスマブ 600	mg/body	皮下注	day1
	トラスツスマブ 600	mg/body		
パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B410L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

PHESGO+DTX(初回)

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴIN	ヘルツス・マフ <sup>*</sup> 1200	mg/body	皮下注	day1
	トラスツス・マフ <sup>*</sup> 600	mg/body		
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B411L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

PHESGO+DTX(2回目以降)	
HER2陽性乳癌	

申請医師 

備考欄

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴMA	ヘルツスマブ 600	mg/body	皮下注	day1
	トラスツスマブ 600	mg/body		
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B420L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	保湿剤、ステロイド外用薬

PHESGO+Eribulin(初回)	
HER2陽性乳癌	

申請医師 

備考欄

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴIN	ヘルツスマブ 1200	mg/body	皮下注	day1
	トラスツスマブ 600	mg/body		
ハラヴェン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B421L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

PHESGO+Eribulin(2回目以降)

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴMA	ヘルツス・マフ 600	mg/body	皮下注	day1
	トラスツス・マフ 600	mg/body		
ハラヴェン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8

投与周期 21日

休薬

[illegible]



## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

		申請医師	
DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)			
HER2陽性乳癌			
<input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行			
薬品名	標準投与量	単位	投与経路 投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注 day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注 day1
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注 day1

備考欄

登録番号 B430M

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師	
DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)	
HER2陽性乳癌	
<input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	
薬品名	標準投与量 単位 投与経路 投与日
パージェタ	420 mg/body 点滴静注 day1
トラスツズマブBS	6 mg/kg 点滴静注 day1
ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 day1
カルボプラチン	AUC 6 点滴静注 day1

備考欄

登録番号 B431M

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

PHESGO+DTX+CBDCA(初回)
HER2陽性乳癌

申請医師

備考欄

登録番号 B432M

■術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴIN	ヘルツスマブ 1200	mg/body	皮下注	day1
	トラスツスマブ 600	mg/body		
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期 21日  
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	フェスゴIN	ヘルツスマブ 1200 トラスツスマブ 600	mg/body mg/body	皮下注	8分以上	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B433M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

備考欄

PHESGO+DTX+CBDCA(2回目以降)
HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴMA	ヘルツス・マフ 600	mg/body	皮下注	day1
	トラスツス・マフ 600	mg/body		
ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	フェスゴMA	ヘルツス・マブ 600	mg/body	皮下注	5分以上	●							
		トラスツス・マブ 600	mg/body										
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	●							
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B440M

備考欄

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法、運動療法
外科	骨折	骨折	骨折の治癒	手術、固定、石膏
産婦人科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診、栄養指導
泌尿器科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、薬物療法
神経科	脳卒中	脳卒中	神経機能の回復	薬物療法、リハビリテーション
眼科	近視	近視	視力の改善	眼鏡、コンタクトレンズ
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の抑制	点眼薬、点耳薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術、放射線療法
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術、化学療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
神経科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法、放射線療法

申請医師

Sacituzumab Govitecan (投与量850mg未満)
------------------------------------

化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

[illegible]

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B441M

備考欄

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

Sacituzumab Govitecan (投与量850mg以上)
------------------------------------

化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

[illegible]

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B450M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Datopotamab	Deruxtecan
-------------	------------

化学療法歴のあるホルモン受容体陽性HER2陰性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

**ダトロウェイ**

	6
--	---

mg/kg

点滴静注

day 1
-------

投与周期 21日

[illegible]