

| code                  | レジメン名                                  |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">B020S</a> | Trastuzumab(3w)(初回)                    |
| <a href="#">B021S</a> | Trastuzumab(3w)(2回目以降)                 |
| <a href="#">B040L</a> | Weekly PTX(3投1休)                       |
| <a href="#">B041L</a> | Weekly PTX(12w)                        |
| <a href="#">B050L</a> | PTX+Bevacizumab                        |
| <a href="#">B060L</a> | Eribulin単剤                             |
| <a href="#">B070L</a> | PTX+Trastuzumab                        |
| <a href="#">B080L</a> | DTX+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)         |
| <a href="#">B081L</a> | DTX+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)      |
| <a href="#">B090S</a> | Trastuzumab+Pertuzumab(初回)             |
| <a href="#">B091S</a> | Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)          |
| <a href="#">B100L</a> | nab-PTX                                |
| <a href="#">B110H</a> | ADR単剤                                  |
| <a href="#">B120H</a> | AC                                     |
| <a href="#">B121H</a> | dose-dense AC                          |
| <a href="#">B131M</a> | TC                                     |
| <a href="#">B143H</a> | EC100                                  |
| <a href="#">B144H</a> | EC75                                   |
| <a href="#">B145H</a> | dose-dense EC                          |
| <a href="#">B146H</a> | EC90                                   |
| <a href="#">B150L</a> | dose-dense PTX                         |
| <a href="#">B160L</a> | PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)         |
| <a href="#">B161L</a> | PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)      |
| <a href="#">B170L</a> | T-DM1                                  |
| <a href="#">B180L</a> | DTX75                                  |
| <a href="#">B192L</a> | DTX75+Trastuzumab(3w)(初回)              |
| <a href="#">B193L</a> | DTX75+Trastuzumab(3w)(2回目以降)           |
| <a href="#">B200L</a> | GEM(2投1休)                              |
| <a href="#">B212L</a> | GEM(2投1休)+Trastuzumab(初回)              |
| <a href="#">B213L</a> | GEM(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)           |
| <a href="#">B220L</a> | GEM+PTX                                |
| <a href="#">B230L</a> | VNR(2投1休)                              |
| <a href="#">B242L</a> | VNR(2投1休)+Trastuzumab(初回)              |
| <a href="#">B243L</a> | VNR(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)           |
| <a href="#">B244L</a> | VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)         |
| <a href="#">B245L</a> | VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)      |
| <a href="#">B251M</a> | CMF(modified)                          |
| <a href="#">B260M</a> | CPT-11 original(3投2休)                  |
| <a href="#">B272M</a> | TC+Trastuzumab(初回)                     |
| <a href="#">B273M</a> | TC+Trastuzumab(2回目以降)                  |
| <a href="#">B280L</a> | Eribulin+Trastuzumab(初回)               |
| <a href="#">B281L</a> | Eribulin+Trastuzumab(2回目以降)            |
| <a href="#">B282L</a> | Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)    |
| <a href="#">B283L</a> | Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降) |
| <a href="#">B292M</a> | DTX+CBDCA+Trastuzumab(初回)              |
| <a href="#">B293M</a> | DTX+CBDCA+Trastuzumab(2回目以降)           |
| <a href="#">B300S</a> | Capecitabine+Trastuzumab(初回)           |
| <a href="#">B301S</a> | Capecitabine+Trastuzumab(2回目以降)        |

| code                  | レジメン名                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">B310L</a> | Atezolizumab+nab-PTX                      |
| <a href="#">B320H</a> | Trastuzumab Deruxtecan                    |
| <a href="#">B330L</a> | Pembrolizumab+PTX                         |
| <a href="#">B340M</a> | Pembrolizumab+GEM+CBDCA                   |
| <a href="#">B350M</a> | Pembrolizumab+PTX+CBDCA(3W)               |
| <a href="#">B360M</a> | Pembrolizumab+PTX+CBDCA(1W)               |
| <a href="#">B370H</a> | Pembrolizumab+EC                          |
| <a href="#">B380S</a> | Pembrolizumab単剤(術後)(3W)                   |
| <a href="#">B381S</a> | Pembrolizumab単剤(術後)(6W)                   |
| <a href="#">B390S</a> | PHESGO(初回)                                |
| <a href="#">B391S</a> | PHESGO(2回目以降)                             |
| <a href="#">B400L</a> | PHESGO+PTX(初回)                            |
| <a href="#">B401L</a> | PHESGO+PTX(2回目以降)                         |
| <a href="#">B410L</a> | PHESGO+DTX(初回)                            |
| <a href="#">B411L</a> | PHESGO+DTX(2回目以降)                         |
| <a href="#">B420L</a> | PHESGO+Eribulin(初回)                       |
| <a href="#">B421L</a> | PHESGO+Eribulin(2回目以降)                    |
| <a href="#">B430M</a> | DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)      |
| <a href="#">B431M</a> | DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)   |
| <a href="#">B432M</a> | PHESGO+DTX+CBDCA(初回)                      |
| <a href="#">B433M</a> | PHESGO+DTX+CBDCA(2回目以降)                   |
| <a href="#">B440M</a> | Sacituzumab Govitecan(投与量850mg未満)         |
| <a href="#">B441M</a> | Sacituzumab Govitecan(投与量850mg以上)         |
| <a href="#">B450M</a> | Datopotamab Deruxtecan                    |
| <a href="#">B460S</a> | Tucatinib+Trastuzumab+Capecitabine(初回)    |
| <a href="#">B461S</a> | Tucatinib+Trastuzumab+Capecitabine(2回目以降) |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B020S

診療科

レジメン名

对象疾患名

### 治療目的

### 治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab (3w) (初回)

HER2陽性乳癌

藥品名

## 標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

トラスツズマブBS

8

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B021S

診療科

レジメン名

对象疾患名

### 治療目的

## 治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab (3w) (2回目以降)

HER2陽性乳癌

藥品名

## 標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

トラスツズマブBS

6

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

診療科 内科 申請医師

レジメン名 Weekly PTX (12w)

対象疾患名 乳癌

治療目的 ☒術前 ☒術後補助 ☐再発・進行

備考欄

登録番号 B041L

| 治療内容 | 薬品名     | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日                               |
|------|---------|-------|-------------------|------|-----------------------------------|
|      | パクリタキセル | 80    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78 |
|      |         |       |                   |      |                                   |
|      |         |       |                   |      |                                   |
|      |         |       |                   |      |                                   |
|      |         |       |                   |      |                                   |
|      |         |       |                   |      |                                   |

投与周期 84日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B050L

診療科

レジメン名

对象疾患名

### 治療目的

\_\_\_\_\_

申請医師

備考欄

PTX + Bevacizumab

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

## 治療内容

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

パクリタキセル

90

 $\text{mg/m}^2$ 

### 点滴静注

day1,8,15

ベバシズマブBS

10

mg/kg

**点滴静注**

|         |
|---------|
| day1,15 |
|---------|

投与周期 28日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B060L

診療科

レジメン名

对象疾患名

### 治療目的

## 治療内容

申請医師

備考欄

Eribulin単剤

**乳癌、惡性軟部腫瘍**

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

Eribulin

|  |     |
|--|-----|
|  | 1.4 |
|--|-----|

 $\text{mg/m}^2$ 

点滴静注

day 1,8

投与周期 **21日**

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B070L

|     |  |
|-----|--|
| 診療科 |  |
|-----|--|

申請醫師 

備考欄

|       |                 |
|-------|-----------------|
| レジメン名 | PTX+Trastuzumab |
|-------|-----------------|

|       |    |
|-------|----|
| 对象疾患名 | 乳癌 |
|-------|----|

治療目的 ■術前 ■術後補助 ■再発・進行

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|-----|-------|----|------|-----|
|------|-----|-------|----|------|-----|

|                  |    |                   |      |                                      |
|------------------|----|-------------------|------|--------------------------------------|
| パクリタキセル          | 80 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78 |
| トラスツズマブBS(初回)    | 4  | mg/kg             | 点滴静注 | day1                                 |
| トラスツズマブBS(2～12回) | 2  | mg/kg             | 点滴静注 | day8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78   |
|                  |    |                   |      |                                      |
|                  |    |                   |      |                                      |

投与周期 84日

|    |  |
|----|--|
| 休薬 |  |
|----|--|

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B080L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
|                                 | 申請医師 |
| DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回) |      |
| HER2陽性乳癌                        |      |

備考欄

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|-----------|-------|-------------------|------|------|
| パージェタ     | 840   | mg/body           | 点滴静注 | day1 |
| トラスツズマブBS | 8     | mg/kg             | 点滴静注 | day1 |
| ドセタキセル    | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 単位                | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|-----|-------------------|-------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | パージェタ     | 840 | mg                | 点滴静注  | 60→30分 | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 3  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 8   | mg/kg             | 点滴静注  | 90→30分 | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 4  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン     | 6.6 | mg                | 点滴静注  | 15分    | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 5  | 5%糖液液     | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | ドセタキセル    | 75  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分    | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン錠    | 8   | mg                | 経口    | 分1     |          | ●        | ●        |        |        |        |        |        |



レジメン記入フォーマット

登録番号 B081L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                                    |      |  |
|------------------------------------|------|--|
|                                    | 申請医師 |  |
| DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降) |      |  |
| HER2陽性乳癌                           |      |  |

備考欄

|  |
|--|
|  |
|--|

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|-----------|-------|-------------------|------|------|
| パージェタ     | 420   | mg/body           | 点滴静注 | day1 |
| トラスツズマブBS | 6     | mg/kg             | 点滴静注 | day1 |
| ドセタキセル    | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 単位                | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|-----|-------------------|-------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | パージェタ     | 420 | mg                | 点滴静注  | 60→30分 | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 3  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 6   | mg/kg             | 点滴静注  | 90→30分 | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 4  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン     | 6.6 | mg                | 点滴静注  | 15分    | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 5  | 5%糖液      | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | ドセタキセル    | 75  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分    | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン錠    | 8   | mg                | 経口    | 分2     |          | ●        | ●        |        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B090S

|       |  |
|-------|--|
| 診療科   |  |
| レジメン名 |  |
| 対象疾患名 |  |
| 治療目的  |  |
| 治療内容  |  |

申請医師

備考欄

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Trastuzumab+Pertuzumab (初回) |  |
|-----------------------------|--|

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-----|-------|----|------|-----|
|-----|-------|----|------|-----|

|      |     |         |      |      |
|------|-----|---------|------|------|
| パーゼタ | 840 | mg/body | 点滴静注 | day1 |
|------|-----|---------|------|------|

|           |         |      |      |
|-----------|---------|------|------|
| トラスツズマブBS | 8 mg/kg | 点滴静注 | day1 |
|-----------|---------|------|------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B091S

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

備考欄

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降) |
|--|-------------------------------|

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位      | 投与経路 | 投与日  |
|-----------|-------|---------|------|------|
| パージェタ     | 420   | mg/body | 点滴静注 | day1 |
| トラスツズマブBS | 6     | mg/kg   | 点滴静注 | day1 |
|           |       |         |      |      |
|           |       |         |      |      |
|           |       |         |      |      |
|           |       |         |      |      |
|           |       |         |      |      |

投与周期 21日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B100L

| 診療科  | レジメン名 | 対象疾患名 | 治療目的 | 治療内容 |
|------|-------|-------|------|------|
| 消化器科 | 肝臓がん  | 肝臓がん  | 肝臓がん | 肝臓がん |

申請医師

備考欄

nab-PTX

**乳癌**

藥品名

**標準投与量 単位**

单位

## 投与経路

投与日

**アブラキサン**

260

mg/m<sup>2</sup>

### 点滴静注

|      |
|------|
| day1 |
|------|

投与周期 21日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B110H

診療科

レジメン名

对象疾患名

## 治療目的

## 治療内容

申請医師

備考欄

#### ADR单剂

## 轉移性乳癌

◻ 俯削 ◻ 俯俊補 ◻ 再兇・進

藥品名

## 標準投与量

單位

## 投与経路

投与日

## ドキソルビン

75

5 mg/m<sup>2</sup>

### 点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B120H

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的       | 治療内容     |
|-----|----------|----------|------------|----------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬  |
| 小児科 | 喘息       | 喘息       | 症状の軽減      | 吸入薬、内服薬  |
| 内科  | 糖尿病      | 糖尿病      | 血糖値のコントロール | 内服薬、食事療法 |
| 外科  | 痔瘻       | 痔瘻       | 症状の軽減      | 手術療法     |
| 婦人科 | 月経不調     | 月経不調     | 症状の軽減      | ホルモン療法   |
| 泌尿科 | 腎臓病      | 腎臓病      | 腎機能の維持     | 透析療法     |
| 眼科  | 近視       | 近視       | 視力の矯正      | 眼鏡、コンタクト |
| 耳鼻科 | 中耳炎      | 中耳炎      | 症状の軽減      | 点眼薬、点耳薬  |
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬  |
| 小児科 | 喘息       | 喘息       | 症状の軽減      | 吸入薬、内服薬  |
| 内科  | 糖尿病      | 糖尿病      | 血糖値のコントロール | 内服薬、食事療法 |
| 外科  | 痔瘻       | 痔瘻       | 症状の軽減      | 手術療法     |
| 婦人科 | 月経不調     | 月経不調     | 症状の軽減      | ホルモン療法   |
| 泌尿科 | 腎臓病      | 腎臓病      | 腎機能の維持     | 透析療法     |
| 眼科  | 近視       | 近視       | 視力の矯正      | 眼鏡、コンタクト |
| 耳鼻科 | 中耳炎      | 中耳炎      | 症状の軽減      | 点眼薬、点耳薬  |

申請医師

備考欄

AC

乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

|        |     |                   |      |      |
|--------|-----|-------------------|------|------|
| ドキシゾリン | 60  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| エンドキサン | 600 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|        |     |                   |      |      |
|        |     |                   |      |      |
|        |     |                   |      |      |
|        |     |                   |      |      |
|        |     |                   |      |      |

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B121H

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的       | 治療内容     |
|-----|----------|----------|------------|----------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬  |
| 小児科 | 喘息       | 喘息       | 症状の軽減      | 吸入薬、内服薬  |
| 内科  | 糖尿病      | 糖尿病      | 血糖値のコントロール | 内服薬、食事療法 |
| 外科  | 痔瘻       | 痔瘻       | 症状の軽減      | 手術療法     |
| 婦人科 | 月経不調     | 月経不調     | 症状の軽減      | ホルモン療法   |
| 泌尿科 | 腎臓病      | 腎臓病      | 腎機能の維持     | 内服薬、食事療法 |
| 眼科  | 近視       | 近視       | 視力の矯正      | 眼鏡、コンタクト |
| 耳鼻科 | 中耳炎      | 中耳炎      | 炎症の軽減      | 点眼薬、内服薬  |
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬  |
| 小児科 | 喘息       | 喘息       | 症状の軽減      | 吸入薬、内服薬  |
| 内科  | 糖尿病      | 糖尿病      | 血糖値のコントロール | 内服薬、食事療法 |
| 外科  | 痔瘻       | 痔瘻       | 症状の軽減      | 手術療法     |
| 婦人科 | 月経不調     | 月経不調     | 症状の軽減      | ホルモン療法   |
| 泌尿科 | 腎臓病      | 腎臓病      | 腎機能の維持     | 内服薬、食事療法 |
| 眼科  | 近視       | 近視       | 視力の矯正      | 眼鏡、コンタクト |
| 耳鼻科 | 中耳炎      | 中耳炎      | 炎症の軽減      | 点眼薬、内服薬  |

申請医師

備考欄

dose-dense AC

乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

藥品名

## 標準投与量

單位

## 投与経路

投与日

**ドキソルビシン**

60

 $\text{mg/m}^2$ 

点滴静注

day1

エンドキサン

600

 $\text{mg/m}^2$ 

点滴静注

|      |
|------|
| day1 |
|------|

投与周期 14日[illegible]

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TC                                                                                     |
| 乳癌                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補 <input type="checkbox"/> 再発・進 |

申請医師

備考欄

登録番号 B131M

| 薬品名    | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|--------|-------|-------------------|------|------|
| ドセタキセル | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| エンドキサン | 600   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |

投与周期 21日

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量  | 単位                | 投与ルー | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) |
|----|------------|------|-------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |            |      |                   |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
| 1  | 生食         | 100  | mL                | 点滴静注 |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 2  | パロノセトロンバッグ | 0.75 | mg                | 点滴静注 |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン      | 6.6  | mg                | 点滴静注 | 15分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 3  | 5%糖液       | 250  | mL                | 点滴静注 |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | ドセタキセル     | 75   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 60分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 4  | 生食         | 250  | mL                | 点滴静注 |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | エンドキサン     | 600  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン      | 8    | mg                | 内服   | 分1   |          | ●        | ●        |          |          |          |          |



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B143H

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的       | 治療内容            |
|-----|----------|----------|------------|-----------------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬、保湿剤     |
| 小児科 | 喘息       | 喘息       | 症状の軽減      | 吸入薬、内服薬         |
| 内科  | 糖尿病      | 糖尿病      | 血糖値のコントロール | 内服薬、食事療法、運動療法   |
| 外科  | 骨折       | 骨折       | 骨折の治癒      | 手術、固定、リハビリテーション |
| 婦人科 | 月経不調     | 月経不調     | 月経の正常化     | ホルモン療法、生活習慣の改善  |
| 産科  | 妊娠高血圧症候群 | 妊娠高血圧症候群 | 血圧のコントロール  | 内服薬、安静、経過観察     |
| 泌尿科 | 慢性腎臓病    | 慢性腎臓病    | 腎機能の維持     | 食事療法、薬物療法       |
| 神経科 | パーキンソン病  | パーキンソン病  | 運動症状の軽減    | 内服薬、手術療法        |
| 精神科 | 統合失調症    | 統合失調症    | 症状の軽減      | 内服薬、心理療法        |
| 眼科  | 糖尿病性網膜病変 | 糖尿病性網膜病変 | 視力維持       | レーザー治療、手術療法     |
| 耳鼻科 | 中耳炎      | 中耳炎      | 炎症の軽減      | 点眼薬、内服薬         |
| 皮膚科 | 乾癬       | 乾癬       | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬、光線療法    |
| 小児科 | アレルギー性鼻炎 | アレルギー性鼻炎 | 症状の軽減      | 吸入薬、点鼻薬         |
| 内科  | 高脂血症     | 高脂血症     | 脂質のコントロール  | 内服薬、食事療法、運動療法   |
| 外科  | 痔瘻       | 痔瘻       | 症状の軽減      | 手術療法、薬物療法       |
| 婦人科 | 子宮筋腫     | 子宮筋腫     | 症状の軽減      | ホルモン療法、手術療法     |
| 産科  | 前置胎盤     | 前置胎盤     | 経過観察       | 安静、経過観察         |
| 泌尿科 | 慢性腎臓病    | 慢性腎臓病    | 腎機能の維持     | 食事療法、薬物療法       |
| 神経科 | パーキンソン病  | パーキンソン病  | 運動症状の軽減    | 内服薬、手術療法        |
| 精神科 | 統合失調症    | 統合失調症    | 症状の軽減      | 内服薬、心理療法        |
| 眼科  | 糖尿病性網膜病変 | 糖尿病性網膜病変 | 視力維持       | レーザー治療、手術療法     |
| 耳鼻科 | 中耳炎      | 中耳炎      | 炎症の軽減      | 点眼薬、内服薬         |
| 皮膚科 | 乾癬       | 乾癬       | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬、光線療法    |
| 小児科 | アレルギー性鼻炎 | アレルギー性鼻炎 | 症状の軽減      | 吸入薬、点鼻薬         |
| 内科  | 高脂血症     | 高脂血症     | 脂質のコントロール  | 内服薬、食事療法、運動療法   |
| 外科  | 痔瘻       | 痔瘻       | 症状の軽減      | 手術療法、薬物療法       |
| 婦人科 | 子宮筋腫     | 子宮筋腫     | 症状の軽減      | ホルモン療法、手術療法     |
| 産科  | 前置胎盤     | 前置胎盤     | 経過観察       | 安静、経過観察         |
| 泌尿科 | 慢性腎臓病    | 慢性腎臓病    | 腎機能の維持     | 食事療法、薬物療法       |
| 神経科 | パーキンソン病  | パーキンソン病  | 運動症状の軽減    | 内服薬、手術療法        |
| 精神科 | 統合失調症    | 統合失調症    | 症状の軽減      | 内服薬、心理療法        |
| 眼科  | 糖尿病性網膜病変 | 糖尿病性網膜病変 | 視力維持       | レーザー治療、手術療法     |
| 耳鼻科 | 中耳炎      | 中耳炎      | 炎症の軽減      | 点眼薬、内服薬         |
| 皮膚科 | 乾癬       | 乾癬       | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬、光線療法    |
| 小児科 | アレルギー性鼻炎 | アレルギー性鼻炎 | 症状の軽減      | 吸入薬、点鼻薬         |
| 内科  | 高脂血症     | 高脂血症     | 脂質のコントロール  | 内服薬、食事療法、運動療法   |
| 外科  | 痔瘻       | 痔瘻       | 症状の軽減      | 手術療法、薬物療法       |
| 婦人科 | 子宮筋腫     | 子宮筋腫     | 症状の軽減      | ホルモン療法、手術療法     |
| 産科  | 前置胎盤     | 前置胎盤     | 経過観察       | 安静、経過観察         |
| 泌尿科 | 慢性腎臓病    | 慢性腎臓病    | 腎機能の維持     | 食事療法、薬物療法       |
| 神経科 | パーキンソン病  | パーキンソン病  | 運動症状の軽減    | 内服薬、手術療法        |
| 精神科 | 統合失調症    | 統合失調症    | 症状の軽減      | 内服薬、心理療法        |
| 眼科  | 糖尿病性網膜病変 | 糖尿病性網膜病変 | 視力維持       | レーザー治療、手術療法     |
| 耳鼻科 | 中耳炎      | 中耳炎      | 炎症の軽減      | 点眼薬、内服薬         |
| 皮膚科 | 乾癬       | 乾癬       | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬、光線療法    |
| 小児科 | アレルギー性鼻炎 | アレルギー性鼻炎 | 症状の軽減      | 吸入薬、点鼻薬         |
| 内科  | 高脂血症     | 高脂血症     | 脂質のコントロール  | 内服薬、食事療法、運動療法   |
| 外科  | 痔瘻       | 痔瘻       | 症状の軽減      | 手術療法、薬物療法       |
| 婦人科 | 子宮筋腫     | 子宮筋腫     | 症状の軽減      | ホルモン療法、手術療法     |
| 産科  | 前置胎盤     | 前置胎盤     | 経過観察       | 安静、経過観察         |
| 泌尿科 | 慢性腎臓病    | 慢性腎臓病    | 腎機能の維持     | 食事療法、薬物療法       |
| 神経科 | パーキンソン病  | パーキンソン病  | 運動症状の軽減    | 内服薬、手術療法        |
| 精神科 | 統合失調症    | 統合失調症    | 症状の軽減      | 内服薬、心理療法        |
| 眼科  | 糖尿病性網膜病変 | 糖尿病性網膜病変 | 視力維持       | レーザー治療、手術療法     |
| 耳鼻科 | 中耳炎      | 中耳炎      | 炎症の軽減      | 点眼薬、内服薬         |
| 皮膚科 | 乾癬       | 乾癬       | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬、光線療法    |
| 小児科 | アレルギー性鼻炎 | アレルギー性鼻炎 | 症状の軽減      | 吸入薬、点鼻薬         |
| 内科  | 高脂血症     | 高脂血症     | 脂質のコントロール  | 内服薬、食事療法、運動療法   |
| 外科  | 痔瘻       | 痔瘻       | 症状の軽減      | 手術療法、薬物療法       |
| 婦人科 | 子宮筋腫     | 子宮筋腫     | 症状の軽減      | ホルモン療法、手術療法     |
| 産科  | 前置胎盤     | 前置胎盤     | 経過観察       | 安静、経過観察         |
| 泌尿科 | 慢性腎臓病    | 慢性腎臓病    | 腎機能の維持     | 食事療法、薬物療法       |
| 神経科 | パーキンソン病  | パーキンソン病  | 運動症状の軽減    | 内服薬、手術療法        |
| 精神科 | 統合失調症    | 統合失調症    | 症状の軽減      | 内服薬、心理療法        |
| 眼科  | 糖尿病性網膜病変 | 糖尿病性網膜病変 | 視力維持       | レーザー治療、手術療法     |
| 耳鼻科 | 中耳炎      | 中耳炎      | 炎症の軽減      | 点眼薬、内服薬         |
| 皮膚科 | 乾癬       | 乾癬       | 症状の軽減      | 外用薬、内服薬、光線療法    |
| 小児科 | アレルギー性鼻炎 | アレルギー性鼻炎 | 症状の軽減      | 吸入薬、点鼻薬         |
| 内科  | 高脂血症     | 高脂血症     | 脂質のコントロール  | 内服薬、食事療法、運動療法   |
| 外科  | 痔瘻       | 痔瘻       | 症状の軽減      | 手術療法、薬物療法       |
| 婦人科 | 子宮筋腫     | 子宮筋腫     | 症状の軽減      | ホルモン療法、手術療法     |
| 産科  | 前置胎盤     | 前置胎盤     | 経過観察       | 安静、経過観察         |
| 泌尿科 | 慢性腎臓病    |          |            |                 |

EC100  
乳癌  
□術前 ■術後補助 ■再発・進行

申請醫師 

備考欄

| 薬品名    | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|--------|-------|-------------------|------|------|
| エピルビシン | 100   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| エンドキサン | 500   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B144H

| 診療科 | レジメン名 | 対象疾患名 | 治療目的 | 治療内容 |
|-----|-------|-------|------|------|
|-----|-------|-------|------|------|

EC75  
乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

申請醫師 

備考欄

| 薬品名    | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|--------|-------|-------------------|------|------|
| エピルビシン | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| エンドキサン | 500   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B145H

| 診療科 | レジメン名 | 対象疾患名 | 治療目的 | 治療内容 |
|-----|-------|-------|------|------|
|     |       |       |      |      |

dose-dense EC  
乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

申請醫師 

備考欄

| 薬品名    | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|--------|-------|-------------------|------|------|
| エピルビシン | 90    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| エンドキサン | 600   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |

投与周期 14日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B146H

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

EC90  
乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

申請醫師 

備考欄

| 薬品名    | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|--------|-------|-------------------|------|------|
| エピルビシン | 90    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| エンドキサン | 600   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |
|        |       |                   |      |      |

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B150L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

dose-dense PTX

乳癌

申請医師

備考欄

| 治療内容 | 薬品名     | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|------|---------|-------|-------------------|------|------|
|      | パクリタキセル | 175   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|      |         |       |                   |      |      |
|      |         |       |                   |      |      |
|      |         |       |                   |      |      |
|      |         |       |                   |      |      |
|      |         |       |                   |      |      |
|      |         |       |                   |      |      |

投与周期 14日

休薬

| Rp | 薬品名・規格   | 投与量  |                   | 投与ルート | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) |
|----|----------|------|-------------------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |          |      |                   |       |      |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 0  | レスタミンコーワ | 50   | mg                | 内服    |      | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 1  | 生食       | 100  | mL                | 点滴静注  | ×    | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 2  | 生食       | 50   | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | ファモチジン   | 20   | mg                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン    | 19.8 | mg                | 点滴静注  | 15分  | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食       | 500  | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | パクリタキセル  | 175  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 180分 | ●        |          |          |          |          |          |          |          |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B160L

| 診療科 | レジメン名 | 対象疾患名 | 治療目的 | 治療内容 |
|-----|-------|-------|------|------|
|     |       |       |      |      |

申請医師

備考欄

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| PTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回) |  |
|---------------------------------|--|

HER2陽性乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-----|-------|----|------|-----|
|-----|-------|----|------|-----|

|           |     |                   |      |           |
|-----------|-----|-------------------|------|-----------|
| パージェタ     | 840 | mg/body           | 点滴静注 | day1      |
| トラスツズマブBS | 8   | mg/kg             | 点滴静注 | day1      |
| パクリタキセル   | 80  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8,15 |
|           |     |                   |      |           |
|           |     |                   |      |           |
|           |     |                   |      |           |
|           |     |                   |      |           |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B161L

|       |  |
|-------|--|
| 診療科   |  |
| レジメン名 |  |
| 対象疾患名 |  |
| 治療目的  |  |
| 治療内容  |  |

申請医師

備考欄

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| PTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降) |  |
|------------------------------------|--|

HER2陽性乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

|           |     |                   |      |           |
|-----------|-----|-------------------|------|-----------|
| パージェタ     | 420 | mg/body           | 点滴静注 | day1      |
| トラスツズマブBS | 6   | mg/kg             | 点滴静注 | day1      |
| パクリタキセル   | 80  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8,15 |
|           |     |                   |      |           |
|           |     |                   |      |           |
|           |     |                   |      |           |
|           |     |                   |      |           |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B170L

診療科

レジメン名

对象疾患名

### 治療目的

## 治療内容

申請医師

備考欄

T-DM1

HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

## 標準投与量

單位

投与経路 投与日

**カドサイラ**

### 3.6

mg/kg

### 点滴静注

day 1

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

投与周期 21日

[illegible]



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B180L

|       |  |
|-------|--|
| 診療科   |  |
| レジメン名 |  |
| 対象疾患名 |  |
| 治療目的  |  |
| 治療内容  |  |

|       |
|-------|
|       |
| DTX75 |
| 乳癌    |

申請医師

\_\_\_\_\_

備考欄

| Date | Time | Location | Description |
|------|------|----------|-------------|
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |
|      |      |          |             |

[illegible]投与周期 21日

|     |
|-----|
| 21日 |
|-----|

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B192L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |
| DTX75+Trastuzumab(3w)(初回)                                                                |
| 乳癌                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行 |

申請医師 

備考欄

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|-----------|-------|-------------------|------|------|
| トラスツズマブBS | 8     | mg/kg             | 点滴静注 | day1 |
| ドセタキセル    | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 単位                | 投与ルート | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|-----|-------------------|-------|------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
|    |           |     |                   |       |      |          |          |          |        |        |        |        |
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 8   | mg/kg             | 点滴静注  | 90分  | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 3  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | デカドロン     | 6.6 | mg                | 点滴静注  | 15分  | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 4  | 5%糖液      | 250 | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | ドセタキセル    | 75  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分  | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | デカドロン     | 8   | mg                | 内服    | 分1   |          | ●        | ●        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B193L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

DTX75+Trastuzumab(3w)(2回目以降)  
乳癌  
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師 

備考欄

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|-----------|-------|-------------------|------|------|
| トラスツズマブBS | 6     | mg/kg             | 点滴静注 | day1 |
| ドセタキセル    | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 単位                | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|-----|-------------------|-------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 6   | mg/kg             | 点滴静注  | 90→30分 | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 3  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | デカドロン     | 6.6 | mg                | 点滴静注  | 15分    | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 4  | 5%糖液      | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | ドセタキセル    | 75  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分    | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | デカドロン     | 8   | mg                | 内服    | 分1     |          | ●        | ●        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B200L

診療科

レジメン名

対象疾患名

### 治療目的

## 治療内容

申請醫師

備考欄

GEM(2投1休)

**乳癌**

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

**ゲムシタビン**

1250

0 mg/m<sup>2</sup>

### 点滴静注

day1,8

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B212L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

GEM(2投1休)+Trastuzumab(初回)

对象疾患名

乳癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

## 治療内容

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|-----------|-------|-------------------|------|--------|
| ゲムシタビン    | 1250  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| トラスツズマブBS | 8     | mg/kg             | 点滴静注 | day1   |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |

投与周期 21日[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B213L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

GEM(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)

对象疾患名

乳癌

### 治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

### 治療内容

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|-----------|-------|-------------------|------|--------|
| ゲムシタビン    | 1250  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| トラスツズマブBS | 6     | mg/kg             | 点滴静注 | day1   |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B220L

診療科

レジメン名

対象疾患名

## 治療目的

## 治療内容

申請醫師

備考欄

藥品名

### 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

**ゲムシタビン**

1250

0 mg/m<sup>2</sup>

### 点滴静注

day1,8

パクリタキセル

175

5 mg/m<sup>2</sup>

点滴静注

|      |
|------|
| day1 |
|------|

投与周期 21日

| Rp | 薬品名・規格   | 投与量  | 手技                | 投与ルー | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|----------|------|-------------------|------|------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |          |      |                   |      |      |          |          |        |        |        |        |        |        |
| 0  | レスタミンコーワ | 50   | mg                | 内服   |      | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
| 1  | 生食       | 100  | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食       | 50   | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン    | 6.6  | mg                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | ファモチジン   | 20   | mg                | 点滴静注 | 15分  | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
| 3  | 5%糖液     | 250  | mL                | 点滴静注 |      | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
|    | パクリタキセル  | 175  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 180分 | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
| 4  | 生食       | 100  | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | ゲムシタビン   | 1250 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分  | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B230L

診療科

|       |           |
|-------|-----------|
| レジメン名 | VNR(2投1休) |
|-------|-----------|

对象疾患名 乳癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

### 治療内容

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B242L

診療科

## 申請医師

## 備考欄

レジメン名

VNR(2投1休)+Trastuzumab(初回)

対象疾患名

**乳癌**

## 治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

## 治療内容

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|-----------|-------|-------------------|------|--------|
| ロゼウス      | 25    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| トラスツズマブBS | 8     | mg/kg             | 点滴静注 | day1   |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |

投与周期 **21日**

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 手技                | 投与ルー | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|-----|-------------------|------|------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |           |     |                   |      |      |          |          |        |        |        |        |        |        |
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注 |      | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 8   | mg/kg             | 点滴静注 | 90分  | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
| 3  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | ロゼウス      | 25  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 全開   | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B243L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

VNR(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)

対象疾患名

**乳癌**

### 治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

## 治療内容

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|-----------|-------|-------------------|------|--------|
| ロゼウス      | 25    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| トラスツズマブBS | 6     | mg/kg             | 点滴静注 | day1   |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B244L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

|                                |
|--------------------------------|
| VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(初回) |
|--------------------------------|

对象疾患名

## HER2陽性転移再発乳癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

## 治療内容

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|-----------|-------|-------------------|------|--------|
| パージェタ     | 840   | mg/body           | 点滴静注 | day1   |
| ロゼウス      | 25    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| トラスツズマブBS | 8     | mg/kg             | 点滴静注 | day1   |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |

投与周期 21日

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 手技                | 投与ルー | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|-----|-------------------|------|------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |           |     |                   |      |      |          |          |        |        |        |        |        |        |
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注 |      | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
|    | パージェタ     | 840 | mg                | 点滴静注 | 60分  | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
| 3  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注 |      | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 8   | mg/kg             | 点滴静注 | 90分  | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
| 4  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | ロゼウス      | 25  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 全開   | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B245L

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

|                                   |
|-----------------------------------|
| VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降) |
|-----------------------------------|

对象疾患名

HER2陽性転移再発乳癌

### 治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

### 治療内容

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|-----------|-------|-------------------|------|--------|
| パージェタ     | 420   | mg/body           | 点滴静注 | day1   |
| ロゼウス      | 25    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| トラスツズマブBS | 6     | mg/kg             | 点滴静注 | day1   |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |

投与周期 21日

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 手技                | 投与ルー | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|-----|-------------------|------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注 |        | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注 |        | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
|    | パージェタ     | 420 | mg                | 点滴静注 | 60→30分 | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注 |        | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 6   | mg/kg             | 点滴静注 | 90→30分 | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
| 3  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注 |        | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | ロゼウス      | 25  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 全開     | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |
| CMF (modified)                                                                                                 |
| 乳癌                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行 |

申請医師

備考欄

登録番号 B251M

| 薬品名      | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|----------|-------|-------------------|------|--------|
| メソトレキセート | 40    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| エンドキサン   | 500   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| 5-FU     | 500   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
|          |       |                   |      |        |
|          |       |                   |      |        |
|          |       |                   |      |        |

投与周期 28日

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量  | 手技                | 投与ルー | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) |
|----|------------|------|-------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |            |      |                   |      |      |          |          |          |          |          |          |          |
| 1  | 生食         | 100  | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |          |          |          |          |          |
| 2  | パロノセトロンバッグ | 0.75 | mg                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン      | 6.6  | mg                | 点滴静注 | 15分  | ●        | ●        |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食         | 50   | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |          |          |          |          |          |
|    | メソトレキセート   | 40   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 20分  | ●        | ●        |          |          |          |          |          |
| 4  | 生食         | 100  | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |          |          |          |          |          |
|    | エンドキサン     | 500  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分  | ●        | ●        |          |          |          |          |          |
| 5  | 生食         | 50   | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        |          |          |          |          |          |
|    | 5-FU       | 500  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 20分  | ●        | ●        |          |          |          |          |          |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B260M

診療科

レジメン名

対象疾患名

### 治療目的

## 治療内容

**申請醫師**

備考欄

\_\_\_\_\_

CPT-11 original(3投2休)

**乳癌**

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

**イリノテカン**

80-100

0 mg/m<sup>2</sup>

点滴静注

|           |
|-----------|
| day1,8,15 |
|-----------|

投与周期 35日

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量    | 手技                | 投与ルー | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day( 15 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|------------|--------|-------------------|------|------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |            |        |                   |      |      |          |          |           |        |        |        |        |        |
| 1  | 生食         | 100    | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        | ●         |        |        |        |        |        |
| 2  | パロノセトロンバッグ | 0.75   | mg                | 点滴静注 |      | ●        | ●        | ●         |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン      | 6.6    | mg                | 点滴静注 | 15分  | ●        | ●        | ●         |        |        |        |        |        |
| 3  | 5%糖液       | 500    | mL                | 点滴静注 |      | ●        | ●        | ●         |        |        |        |        |        |
|    | イリノテカン     | 80-100 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 90分  | ●        | ●        | ●         |        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                    |
|--------------------|
|                    |
| TC+Trastuzumab(初回) |
| 乳癌                 |

申請医師

備考欄

登録番号 B272M

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日     |
|-----------|-------|-------------------|------|---------|
| ドセタキセル    | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1    |
| エンドキサン    | 600   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1    |
| トラスツズマブBS | 4     | mg/kg             | 点滴静注 | day1    |
| トラスツズマブBS | 2     | mg/kg             | 点滴静注 | day8,15 |
|           |       |                   |      |         |
|           |       |                   |      |         |
|           |       |                   |      |         |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量  | 単位                | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day( 8 ) | Day( 15 ) | Day(   ) | Day(   ) |
|----|------------|------|-------------------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|    |            |      |                   |       |        |          |          |          |          |           |          |          |
| 1  | 生食         | 100  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          | ●        | ●         |          |          |
| 2  | パロノセトロンバッグ | 0.75 | mg                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |           |          |          |
|    | デカドロン      | 6.6  | mg                | 点滴静注  | 15分    | ●        |          |          |          |           |          |          |
| 3  | 5%糖液       | 250  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |           |          |          |
|    | ドセタキセル     | 75   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分    | ●        |          |          |          |           |          |          |
| 4  | 生食         | 100  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |           |          |          |
|    | エンドキサン     | 600  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 15分    | ●        |          |          |          |           |          |          |
| 5  | 生食         | 250  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |           |          |          |
|    | トラスツズマブBS  | 4    | mg/kg             | 点滴静注  | 90分    | ●        |          |          |          |           |          |          |
| 5  | 生食         | 250  | mL                | 点滴静注  |        |          |          |          | ●        | ●         |          |          |
|    | トラスツズマブBS  | 2    | mg/kg             | 点滴静注  | 90→30分 |          |          |          | ●        | ●         |          |          |
|    | デカドロン      | 8    | mg                | 内服    |        |          | ●        | ●        |          |           |          |          |

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                       |
|-----------------------|
|                       |
| TC+Trastuzumab(2回目以降) |
| 乳癌                    |

申請医師

備考欄

登録番号 B273M

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日       |
|-----------|-------|-------------------|------|-----------|
| ドセタキセル    | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1      |
| エンドキサン    | 600   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1      |
| トラスツズマブBS | 2     | mg/kg             | 点滴静注 | day1,8,15 |
|           |       |                   |      |           |
|           |       |                   |      |           |
|           |       |                   |      |           |
|           |       |                   |      |           |

投与周期 21日  
休薬

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量  | 単位                | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day( 8 ) | Day( 15 ) | Day( ) | Day( ) |
|----|------------|------|-------------------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|
| 1  | 生食         | 100  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          | ●        | ●         |        |        |
| 2  | パロノセトロンバッグ | 0.75 | mg                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |           |        |        |
|    | デカドロン      | 6.6  | mg                | 点滴静注  | 15分    | ●        |          |          |          |           |        |        |
| 3  | 5%糖液       | 250  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |           |        |        |
|    | ドセタキセル     | 75   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分    | ●        |          |          |          |           |        |        |
| 4  | 生食         | 100  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |           |        |        |
|    | エンドキサン     | 600  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 15分    | ●        |          |          |          |           |        |        |
| 5  | 生食         | 250  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          | ●        | ●         |        |        |
|    | トラスツズマブBS  | 2    | mg/kg             | 点滴静注  | 90→30分 | ●        |          |          | ●        | ●         |        |        |
|    | デカドロン      | 8    | mg                | 内服    |        |          | ●        | ●        |          |           |        |        |



## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eribulin+Trastuzumab (初回)                                                                           |
| 乳癌                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行 |

申請医師

備考欄

登録番号 B280L

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|-----------|-------|-------------------|------|--------|
| ハラヴェン     | 1.4   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| トラスツズマブBS | 8     | mg/kg             | 点滴静注 | day1   |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |

投与周期 21日  
休薬

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 単位                | 投与ルート | 点滴時間  | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|-----|-------------------|-------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注  |       | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注  |       | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン     | 6.6 | mg                | 点滴静注  | 15分   | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 3  | 生食        | 30  | mL                | 点滴静注  | 全開    | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | ハラヴェン     | 1.4 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 約2～5分 | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 4  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |       | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 8   | mg/kg             | 点滴静注  | 90分   | ●        |          |        |        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B281L

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容    |
|-----|----------|----------|-------|---------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の改善 | 外用薬、内服薬 |

申請医師

備考欄

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Eribulin+Trastuzumab(2回目以降) |  |
|-----------------------------|--|

乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

### 標準投与量

單位

## 投与経路

投与日

ハラヴェン

1.4

 $\text{mg/m}^2$ 

点滴静注

|        |
|--------|
| day1,8 |
|--------|

トラスツズマブBS

6

mg/kg

点滴静注

|      |
|------|
| day1 |
|------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

---

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

投与周期 21日

休薬

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 単位                | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|-----|-------------------|-------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注  |        | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注  |        | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン     | 6.6 | mg                | 点滴静注  | 15分    | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 3  | 生食        | 30  | mL                | 点滴静注  | 全開     | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | ハラヴェン     | 1.4 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 約2～5分  | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 4  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 6   | mg/kg             | 点滴静注  | 90→30分 | ●        |          |        |        |        |        |        |        |

# レジメン記入フォーマット

登録番号 B282L

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)  
HER2陽性転移再発乳癌  
☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|-----------|-------|-------------------|------|--------|
| ハラヴェン     | 1.4   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| パージェタ     | 840   | mg/body           | 点滴静注 | day1   |
| トラスツズマブBS | 8     | mg/kg             | 点滴静注 | day1   |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |

投与周期 21日  
休薬

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 単位                | 投与ルート | 点滴時間  | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|-----|-------------------|-------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注  |       | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注  |       | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン     | 6.6 | mg                | 点滴静注  | 15分   | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 3  | 生食        | 30  | mL                | 点滴静注  | 全開    | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
|    | ハラヴェン     | 1.4 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 約2～5分 | ●        | ●        |        |        |        |        |        |        |
| 4  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |       | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
|    | パージェタ     | 840 | mg                | 点滴静注  | 60分   | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
| 5  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |       | ●        |          |        |        |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 8   | mg/kg             | 点滴静注  | 90分   | ●        |          |        |        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                     | 申請医師 |  |
| Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)                                                             |      |  |
| HER2陽性転移再発乳癌                                                                                        |      |  |
| <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行 |      |  |

  

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|-----------|-------|-------------------|------|--------|
| ハラヴェン     | 1.4   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| パージェタ     | 420   | mg/body           | 点滴静注 | day1   |
| トラスツズマブBS | 6     | mg/kg             | 点滴静注 | day1   |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |
|           |       |                   |      |        |

備考欄

登録番号 B283L

投与周期 21日  
休薬

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量 | 単位                | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) |
|----|-----------|-----|-------------------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 生食        | 100 | mL                | 点滴静注  |        | ●        | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 2  | 生食        | 50  | mL                | 点滴静注  |        | ●        | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン     | 6.6 | mg                | 点滴静注  | 15分    | ●        | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食        | 30  | mL                | 点滴静注  | 全開     | ●        | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | ハラヴェン     | 1.4 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 約2～5分  | ●        | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 4  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | パージェタ     | 420 | mg                | 点滴静注  | 60→30分 | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 5  | 生食        | 250 | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | トラスツズマブBS | 6   | mg/kg             | 点滴静注  | 90→30分 | ●        |          |          |          |          |          |          |          |

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                           |      |
|---------------------------|------|
|                           | 申請医師 |
| DTX+CBDCA+Trastuzumab(初回) |      |
| 乳癌                        |      |

備考欄

登録番号 B292M

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|-----------|-------|-------------------|------|------|
| トラスツズマブBS | 8     | mg/kg             | 点滴静注 | day1 |
| ドセタキセル    | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン   | AUC 6 |                   | 点滴静注 | day1 |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量   | 単位                | 投与ルート | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) |
|----|------------|-------|-------------------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |            |       |                   |       |      |          |          |          |          |          |          |          |
| 1  | 生食         | 100   | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 2  | パロノセトロンバッグ | 0.75  | mg                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | アロカリス      | 235   | mg                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン      | 6.6   | mg                | 点滴静注  | 30分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食         | 50    | mL                | フラッシュ |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 4  | 5%糖液       | 250   | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | ドセタキセル     | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 5  | 5%糖液       | 250   | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | カルボプラチン    | AUC 6 |                   | 点滴静注  | 60分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 6  | 生食         | 250   | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | トラスツズマブBS  | 8     | mg/kg             | 点滴静注  | 90分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン      | 8     | mg                | 内服    |      |          | ●        | ●        |          |          |          |          |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B293M

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

申請医師

備考欄

DTX+CBDCA+Trastuzumab (2回目以降)

乳癌

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-----|-------|----|------|-----|
|-----|-------|----|------|-----|

|           |       |                   |      |      |
|-----------|-------|-------------------|------|------|
| トラスツズマブBS | 6     | mg/kg             | 点滴静注 | day1 |
| ドセタキセル    | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン   | AUC 6 |                   | 点滴静注 | day1 |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |

投与周期 21日

休薬

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量   | 単位                | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|------------|-------|-------------------|-------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
|    |            |       |                   |       |        |          |          |          |        |        |        |        |
| 1  | 生食         | 100   | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 2  | パロノセトロンバッグ | 0.75  | mg                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | アロカリス      | 235   | mg                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | デカドロン      | 6.6   | mg                | 点滴静注  | 30分    | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 3  | 生食         | 50    | mL                | フラッシュ |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 4  | 5%糖液       | 250   | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | ドセタキセル     | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分    | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 5  | 5%糖液       | 250   | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | カルボプラチン    | AUC 6 |                   | 点滴静注  | 60分    | ●        |          |          |        |        |        |        |
| 6  | 生食         | 250   | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS  | 6     | mg/kg             | 点滴静注  | 90→30分 | ●        |          |          |        |        |        |        |
|    | デカドロン      | 8     | mg                | 内服    |        |          | ●        | ●        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B300S

|       |  |
|-------|--|
| 診療科   |  |
| レジメン名 |  |
| 対象疾患名 |  |
| 治療目的  |  |
| 治療内容  |  |

## 申請医師

備考欄

Capecitabine+Trastuzumab(初回)

HER2陽性轉移再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-----|-------|----|------|-----|
|-----|-------|----|------|-----|

|           |         |      |      |
|-----------|---------|------|------|
| トラスツズマブBS | 8 mg/kg | 点滴静注 | day1 |
|-----------|---------|------|------|

|        |      |                        |    |         |
|--------|------|------------------------|----|---------|
| カペシタビン | 2500 | mg/m <sup>2</sup> /day | 経口 | day1-14 |
|--------|------|------------------------|----|---------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

投与周期 21日

休薬 7日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B301S

|       |  |
|-------|--|
| 診療科   |  |
| レジメン名 |  |
| 対象疾患名 |  |
| 治療目的  |  |
| 治療内容  |  |

申請医師

備考欄

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Capecitabine+Trastuzumab(2回目以降) |
|--|---------------------------------|

HER2陽性轉移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

トラスツズマブBS

6

mg/kg

点滴静注

|      |
|------|
| day1 |
|------|

カペシタビン

2500

 $\text{mg/m}^2/\text{day}$ 

|    |  |
|----|--|
| 經口 |  |
|----|--|

|         |
|---------|
| day1-14 |
|---------|

投与周期 21日

休薬

7日

| Rp | 薬品名・規格    | 投与量  | 単位                     | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 14 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|-----------|------|------------------------|-------|--------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 生食        | 100  | mL                     | 点滴静注  |        | ●        |           |        |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食        | 250  | mL                     | 点滴静注  |        | ●        |           |        |        |        |        |        |        |
|    | トラスツズマブBS | 6    | mg/kg                  | 点滴静注  | 90→30分 | ●        |           |        |        |        |        |        |        |
|    | カペシタビン    | 2500 | mg/m <sup>2</sup> /day | 経口    |        | ————→    |           |        |        |        |        |        |        |



レジメン記入フォーマット

登録番号 B310L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Atezolizumab+nab-PTX

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

| 薬品名    | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日       |
|--------|-------|-------------------|------|-----------|
| テセントリク | 1680  | mg/body           | 点滴静注 | day1,15   |
| アブラキサン | 100   | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8,15 |
|        |       |                   |      |           |
|        |       |                   |      |           |
|        |       |                   |      |           |
|        |       |                   |      |           |
|        |       |                   |      |           |
|        |       |                   |      |           |
|        |       |                   |      |           |

投与周期

28日

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量  |                   | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 8 ) | Day( 15 ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) |
|----|--------|------|-------------------|-------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |        |      |                   |       |        |          |          |           |          |          |          |          |          |
| 1  | 生食     | 100  | mL                | 点滴静注  |        | ●        | ●        | ●         |          |          |          |          |          |
| 2  | 生食     | 250  | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |           |          |          |          |          |          |
|    | テセントリク | 1680 | mg/body           | 点滴静注  | 60→30分 | ●        |          |           |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食     | 50   | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          | ●         |          |          |          |          |          |
| 4  | 生食     | 50   | mL                | 点滴静注  |        | ●        | ●        | ●         |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン  | 6.6  | mg                | 点滴静注  | 15分    | ●        | ●        | ●         |          |          |          |          |          |
| 5  | 生食     | 50   | mL                | 点滴静注  |        | ●        | ●        | ●         |          |          |          |          |          |
| 6  | 生食     | 20   | mL/m <sup>2</sup> | 点滴静注  |        | ●        | ●        | ●         |          |          |          |          |          |
|    | アブラキサン | 100  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 30分    | ●        | ●        | ●         |          |          |          |          |          |

レジメン記入フォーマット

登録番号 B320H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

| 薬品名   | 標準投与量 | 単位    | 投与経路 | 投与日  |
|-------|-------|-------|------|------|
| エンハーツ | 5.4   | mg/kg | 点滴静注 | day1 |
|       |       |       |      |      |
|       |       |       |      |      |
|       |       |       |      |      |
|       |       |       |      |      |
|       |       |       |      |      |

投与周期 21日

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量  |       | 投与ルー | 点滴時間  | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day( 4 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|------------|------|-------|------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
|    |            |      |       |      |       |          |          |          |          |        |        |        |        |
| 1  | 5%糖液       | 100  | mL    | 点滴静注 |       | ●        |          |          |          |        |        |        |        |
| 2  | パロノセトロンバッグ | 0.75 | mg    | 点滴静注 |       | ●        |          |          |          |        |        |        |        |
|    | アロカリス      | 235  | mg    | 点滴静注 |       | ●        |          |          |          |        |        |        |        |
|    | デカドロン      | 9.9  | mg    | 点滴静注 | 30分   | ●        |          |          |          |        |        |        |        |
| 3  | 5%糖液       | 100  | mL    | 点滴静注 | フラッシュ | ●        |          |          |          |        |        |        |        |
| 4  | 5%糖液       | 100  | mL    | 点滴静注 |       | ●        |          |          |          |        |        |        |        |
|    | 注射用水       | 0.27 | mL/kg | 点滴静注 |       | ●        |          |          |          |        |        |        |        |
|    | エンハーツ      | 5.4  | mg/kg | 点滴静注 | 90分   | ●        |          |          |          |        |        |        |        |
|    | デカドロン      | 8    | mg    | 内服   |       |          | ●        | ●        | ●        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

|       |                                                                                                     |      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 診療科   |                                                                                                     | 申請医師 |  |
| レジメン名 | Pembrolizumab+PTX                                                                                   |      |  |
| 対象疾患名 | PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌                                                                |      |  |
| 治療目的  | <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行 |      |  |
| 治療内容  |                                                                                                     |      |  |

登録番号 B330L

備考欄

| 薬品名                 | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日           |
|---------------------|-------|-------------------|------|---------------|
| キイトルーダ <sup>®</sup> | 200   | mg/body           | 点滴静注 | day1 q3w      |
| パクリタキセル             | 90    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8,15 q4w |
|                     |       |                   |      |               |
|                     |       |                   |      |               |
|                     |       |                   |      |               |
|                     |       |                   |      |               |
|                     |       |                   |      |               |

投与周期 84日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B340M

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容        |
|-----|----------|----------|-------|-------------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の改善 | 外用薬、内服薬、保湿剤 |

申請醫師

備考欄

| Pembrolizumab+GEM+CBDCA |     |
|-------------------------|-----|
| 1                       | 1   |
| 2                       | 2   |
| 3                       | 3   |
| 4                       | 4   |
| 5                       | 5   |
| 6                       | 6   |
| 7                       | 7   |
| 8                       | 8   |
| 9                       | 9   |
| 10                      | 10  |
| 11                      | 11  |
| 12                      | 12  |
| 13                      | 13  |
| 14                      | 14  |
| 15                      | 15  |
| 16                      | 16  |
| 17                      | 17  |
| 18                      | 18  |
| 19                      | 19  |
| 20                      | 20  |
| 21                      | 21  |
| 22                      | 22  |
| 23                      | 23  |
| 24                      | 24  |
| 25                      | 25  |
| 26                      | 26  |
| 27                      | 27  |
| 28                      | 28  |
| 29                      | 29  |
| 30                      | 30  |
| 31                      | 31  |
| 32                      | 32  |
| 33                      | 33  |
| 34                      | 34  |
| 35                      | 35  |
| 36                      | 36  |
| 37                      | 37  |
| 38                      | 38  |
| 39                      | 39  |
| 40                      | 40  |
| 41                      | 41  |
| 42                      | 42  |
| 43                      | 43  |
| 44                      | 44  |
| 45                      | 45  |
| 46                      | 46  |
| 47                      | 47  |
| 48                      | 48  |
| 49                      | 49  |
| 50                      | 50  |
| 51                      | 51  |
| 52                      | 52  |
| 53                      | 53  |
| 54                      | 54  |
| 55                      | 55  |
| 56                      | 56  |
| 57                      | 57  |
| 58                      | 58  |
| 59                      | 59  |
| 60                      | 60  |
| 61                      | 61  |
| 62                      | 62  |
| 63                      | 63  |
| 64                      | 64  |
| 65                      | 65  |
| 66                      | 66  |
| 67                      | 67  |
| 68                      | 68  |
| 69                      | 69  |
| 70                      | 70  |
| 71                      | 71  |
| 72                      | 72  |
| 73                      | 73  |
| 74                      | 74  |
| 75                      | 75  |
| 76                      | 76  |
| 77                      | 77  |
| 78                      | 78  |
| 79                      | 79  |
| 80                      | 80  |
| 81                      | 81  |
| 82                      | 82  |
| 83                      | 83  |
| 84                      | 84  |
| 85                      | 85  |
| 86                      | 86  |
| 87                      | 87  |
| 88                      | 88  |
| 89                      | 89  |
| 90                      | 90  |
| 91                      | 91  |
| 92                      | 92  |
| 93                      | 93  |
| 94                      | 94  |
| 95                      | 95  |
| 96                      | 96  |
| 97                      | 97  |
| 98                      | 98  |
| 99                      | 99  |
| 100                     | 100 |

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

| 薬品名     | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|---------|-------|-------------------|------|--------|
| キイトルーダ  | 200   | mg/body           | 点滴静注 | day1   |
| ゲムシタビン  | 1000  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
| カルボプラチン | AUC 2 |                   | 点滴静注 | day1,8 |
|         |       |                   |      |        |
|         |       |                   |      |        |
|         |       |                   |      |        |
|         |       |                   |      |        |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B350M

|       |                             |      |  |
|-------|-----------------------------|------|--|
| 診療科   |                             | 申請医師 |  |
| レジメン名 | Pembrolizumab+PTX+CBDCA(3W) |      |  |
| 対象疾患名 | ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌  |      |  |
| 治療目的  | ■術前 □術後補助 □再発・進行            |      |  |
| 治療内容  |                             |      |  |

備考欄

| 薬品名     | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日       |
|---------|-------|-------------------|------|-----------|
| キイトルーダ  | 200   | mg/body           | 点滴静注 | day1      |
| パクリタキセル | 80    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8,15 |
| カルボプラチン | AUC5  |                   | 点滴静注 | day1      |
|         |       |                   |      |           |
|         |       |                   |      |           |
|         |       |                   |      |           |
|         |       |                   |      |           |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B360M

|       |  |
|-------|--|
| 診療科   |  |
| レジメン名 |  |
| 対象疾患名 |  |
| 治療目的  |  |
| 治療内容  |  |

申請医師

備考欄

|                             |
|-----------------------------|
| Pembrolizumab+PTX+CBDCA(1W) |
|-----------------------------|

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

| 薬品名     | 標準投与量  | 単位                | 投与経路 | 投与日       |
|---------|--------|-------------------|------|-----------|
| キイトルーダ  | 200    | mg/body           | 点滴静注 | day1      |
| パクリタキセル | 80     | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8,15 |
| カルボプラチン | AUC1.5 |                   | 点滴静注 | day1,8,15 |
|         |        |                   |      |           |
|         |        |                   |      |           |
|         |        |                   |      |           |
|         |        |                   |      |           |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B370H

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容        |
|-----|----------|----------|-------|-------------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の軽減 | 外用薬、内服薬、保湿剤 |

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+EC

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

藥品名

### 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

|        |     |                   |      |      |
|--------|-----|-------------------|------|------|
| キイトルーダ | 200 | mg/body           | 点滴静注 | day1 |
| エピルビシン | 90  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| エンドキサン | 600 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|        |     |                   |      |      |
|        |     |                   |      |      |
|        |     |                   |      |      |
|        |     |                   |      |      |

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B380S

|       |  |
|-------|--|
| 診療科   |  |
| レジメン名 |  |
| 対象疾患名 |  |
| 治療目的  |  |
| 治療内容  |  |

申請医師

備考欄

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Pembrolizumab単剤(術後)(3W) |  |
|-------------------------|--|

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

☐術前 ☒術後補助 ☐再発・進行

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-----|-------|----|------|-----|
|-----|-------|----|------|-----|

|        |     |         |      |      |
|--------|-----|---------|------|------|
| キイトルーダ | 200 | mg/body | 点滴静注 | day1 |
|--------|-----|---------|------|------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

投与周期 21日

[illegible]



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B381S

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容        |
|-----|----------|----------|-------|-------------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の改善 | 外用薬、内服薬、保湿剤 |

申請医師

備考欄

|                         |
|-------------------------|
| Pembrolizumab単剤(術後)(6W) |
|-------------------------|

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

□術前 ■術後補助 □再発・進行

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-----|-------|----|------|-----|
|-----|-------|----|------|-----|

|                     |     |         |      |      |
|---------------------|-----|---------|------|------|
| キイトルーダ <sup>®</sup> | 400 | mg/body | 点滴静注 | day1 |
|---------------------|-----|---------|------|------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

投与周期 42日

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B390S

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容    |
|-----|----------|----------|-------|---------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の軽減 | 外用薬、内服薬 |

申請医師

備考欄

PHESGO(初回)

HER2陽性乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

## 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

フェスゴ<sup>u</sup>IN

ヘルツスマフ 1200

|         |
|---------|
| mg/body |
|---------|

皮下注

day1

|          |     |
|----------|-----|
| トラスツズ・マブ | 600 |
|----------|-----|

|         |
|---------|
| mg/body |
|---------|

投与周期 21日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B391S

| 診療科 | レジメン名 | 対象疾患名 | 治療目的    | 治療内容           |
|-----|-------|-------|---------|----------------|
| 皮膚科 | メソメソ  | 尋常性乾癬 | 皮膚病変の改善 | メソメソ錠 1錠 1回 毎日 |

申請医師

備考欄

PHESGO(2回目以降)

HER2陽性乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

### 標準投与量

单位

## 投与経路

投与日

フェスゴ<sup>TM</sup>MA

ヘルツスマフ 600

|         |
|---------|
| mg/body |
|---------|

皮下注

day1

トラスツスマブ 600

mg/body

|     |  |
|-----|--|
| 反下注 |  |
|-----|--|

| Day 1 |
|-------|
|-------|

投与周期 21日

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B400L

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容        |
|-----|----------|----------|-------|-------------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の改善 | 外用薬、内服薬、保湿剤 |

|                |  |
|----------------|--|
|                |  |
| PHESGO+PTX(初回) |  |
| HER2陽性乳癌       |  |

申請医師 

備考欄

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

| 薬品名     | 標準投与量      | 単位                | 投与経路 | 投与日       |
|---------|------------|-------------------|------|-----------|
| フェスゴIN  | ヘルツマフ 1200 | mg/body           | 皮下注  | day1      |
|         | トラスツマフ 600 | mg/body           |      |           |
| パクリタキセル | 80         | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8,15 |
|         |            |                   |      |           |
|         |            |                   |      |           |
|         |            |                   |      |           |
|         |            |                   |      |           |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B401L

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容        |
|-----|----------|----------|-------|-------------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の改善 | 外用薬、内服薬、保湿剤 |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   |  |
| PHESGO+PTX(2回目以降) |  |
| HER2陽性乳癌          |  |

申請医師 

備考欄

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

| 薬品名     | 標準投与量       | 単位                | 投与経路 | 投与日       |
|---------|-------------|-------------------|------|-----------|
| フェスゴMA  | ヘルツスマブ 600  | mg/body           | 皮下注  | day1      |
|         | トラスツスマブ 600 | mg/body           |      |           |
| パクリタキセル | 80          | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8,15 |
|         |             |                   |      |           |
|         |             |                   |      |           |
|         |             |                   |      |           |
|         |             |                   |      |           |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B410L

| 診療科 | レジメン名 | 対象疾患名 | 治療目的 | 治療内容 |
|-----|-------|-------|------|------|
|-----|-------|-------|------|------|

申請医師

備考欄

PHESGO+DTX(初回)

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

| 薬品名    | 標準投与量       | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|--------|-------------|-------------------|------|------|
| フェスゴIN | ヘルツスマブ 1200 | mg/body           | 皮下注  | day1 |
|        | トラスツスマブ 600 | mg/body           |      |      |
| ドセタキセル | 75          | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|        |             |                   |      |      |
|        |             |                   |      |      |
|        |             |                   |      |      |
|        |             |                   |      |      |

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B411L

| 診療科 | レジメン名 | 対象疾患名 | 治療目的 | 治療内容 |
|-----|-------|-------|------|------|
|-----|-------|-------|------|------|

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   |  |
| PHESGO+DTX(2回目以降) |  |
| HER2陽性乳癌          |  |

申請医師 

備考欄

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

| 薬品名    | 標準投与量       | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|--------|-------------|-------------------|------|------|
| フェスゴMA | ヘルツスマブ 600  | mg/body           | 皮下注  | day1 |
|        | トラスツスマブ 600 | mg/body           |      |      |
| ドセタキセル | 75          | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
|        |             |                   |      |      |
|        |             |                   |      |      |
|        |             |                   |      |      |
|        |             |                   |      |      |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B420L

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容        |
|-----|----------|----------|-------|-------------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の改善 | 外用薬、内服薬、保湿剤 |

申請医師

備考欄

## PHESGO+Eribulin(初回)

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

| 薬品名    | 標準投与量       | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|--------|-------------|-------------------|------|--------|
| フェスゴIN | ヘルツスマブ 1200 | mg/body           | 皮下注  | day1   |
|        | トラスツスマブ 600 | mg/body           |      |        |
| ハラヴェン  | 1.4         | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
|        |             |                   |      |        |
|        |             |                   |      |        |
|        |             |                   |      |        |
|        |             |                   |      |        |

投与周期 21日

休薬

[illegible]



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B421L

| 診療科 | レジメン名 | 対象疾患名 | 治療目的 | 治療内容 |
|-----|-------|-------|------|------|
|-----|-------|-------|------|------|

申請医師

備考欄

PHESGO+Eribulin(2回目以降)

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

| 薬品名    | 標準投与量       | 単位                | 投与経路 | 投与日    |
|--------|-------------|-------------------|------|--------|
| フェスゴMA | ヘルツスマブ 600  | mg/body           | 皮下注  | day1   |
|        | トラスツスマブ 600 | mg/body           |      |        |
| ハラヴェン  | 1.4         | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8 |
|        |             |                   |      |        |
|        |             |                   |      |        |
|        |             |                   |      |        |
|        |             |                   |      |        |

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                                                                                                                |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                                | 申請医師 |  |
| DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)                                                                          |      |  |
| HER2陽性乳癌                                                                                                       |      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行 |      |  |

  

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|-----------|-------|-------------------|------|------|
| パージェタ     | 840   | mg/body           | 点滴静注 | day1 |
| トラスツズマブBS | 8     | mg/kg             | 点滴静注 | day1 |
| ドセタキセル    | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン   | AUC 6 |                   | 点滴静注 | day1 |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |
|           |       |                   |      |      |

備考欄

登録番号 B430M

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量   | 単位                | 投与ルート | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) |
|----|------------|-------|-------------------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |            |       |                   |       |      |          |          |          |          |          |          |          |
| 1  | 生食         | 100   | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 2  | 生食         | 250   | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | パージェタ      | 840   | mg                | 点滴静注  | 60分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食         | 250   | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | トラスツズマブBS  | 8     | mg/kg             | 点滴静注  | 90分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食         | 50    | mL                | フラッシュ |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 2  | パロノセトロンバッグ | 0.75  | mg                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | アロカリス      | 235   | mg                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン      | 6.6   | mg                | 点滴静注  | 30分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食         | 50    | mL                | フラッシュ |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 4  | 5%糖液       | 250   | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | ドセタキセル     | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
| 5  | 5%糖液       | 250   | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | カルボプラチン    | AUC 6 |                   | 点滴静注  | 60分  | ●        |          |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン      | 8     | mg                | 内服    |      |          | ●        | ●        |          |          |          |          |

# レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                                                                                                                |       |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                |       | 申請医師              |           |
| DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)                                                                        |       |                   |           |
| HER2陽性乳癌                                                                                                       |       |                   |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行 |       |                   |           |
| 薬品名                                                                                                            | 標準投与量 | 単位                | 投与経路 投与日  |
| パージェタ                                                                                                          | 420   | mg/body           | 点滴静注 day1 |
| トラスツズマブBS                                                                                                      | 6     | mg/kg             | 点滴静注 day1 |
| ドセタキセル                                                                                                         | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 day1 |
| カルボプラチン                                                                                                        | AUC 6 |                   | 点滴静注 day1 |
|                                                                                                                |       |                   |           |
|                                                                                                                |       |                   |           |
|                                                                                                                |       |                   |           |

備考欄

登録番号 B431M

投与周期 21日  
休薬

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量   | 単位                | 投与ルート | 点滴時間   | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) | Day(   ) |
|----|------------|-------|-------------------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |            |       |                   |       |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1  | 生食         | 100   | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 2  | 生食         | 250   | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | パージェタ      | 420   | mg                | 点滴静注  | 60→30分 | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食         | 250   | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | トラスツズマブBS  | 6     | mg/kg             | 点滴静注  | 90→30分 | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食         | 50    | mL                | フラッシュ |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 2  | パロノセトロンバッグ | 0.75  | mg                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | アロカリス      | 235   | mg                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン      | 6.6   | mg                | 点滴静注  | 30分    | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 3  | 生食         | 50    | mL                | フラッシュ |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 4  | 5%糖液       | 250   | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | ドセタキセル     | 75    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分    | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
| 5  | 5%糖液       | 250   | mL                | 点滴静注  |        | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | カルボプラチン    | AUC 6 |                   | 点滴静注  | 60分    | ●        |          |          |          |          |          |          |          |
|    | デカドロン      | 8     | mg                | 内服    |        |          | ●        | ●        |          |          |          |          |          |

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                      |
|----------------------|
| PHESGO+DTX+CBDCA(初回) |
| HER2陽性乳癌             |

申請医師

備考欄

登録番号 B432M

■術前 ■術後補助 □再発・進行

| 薬品名     | 標準投与量       | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|---------|-------------|-------------------|------|------|
| フェスゴIN  | ヘルツスマブ 1200 | mg/body           | 皮下注  | day1 |
|         | トラスツスマブ 600 | mg/body           |      |      |
| ドセタキセル  | 75          | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン | AUC 6       |                   | 点滴静注 | day1 |
|         |             |                   |      |      |
|         |             |                   |      |      |
|         |             |                   |      |      |

投与周期 21日  
休薬

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量         | 単位                | 投与ルート | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|------------|-------------|-------------------|-------|------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |            |             |                   |       |      |          |          |          |        |        |        |        |        |
| 1  | フェスゴIN     | ヘルツスマブ 1200 | mg/body           | 皮下注   | 8分以上 | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    |            | トラスツスマブ 600 | mg/body           |       |      |          |          |          |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食         | 100         | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    |            |             |                   |       |      |          |          |          |        |        |        |        |        |
| 3  | パロノセトロンバッグ | 0.75        | mg                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | アロカリス      | 235         | mg                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン      | 6.6         | mg                | 点滴静注  | 30分  | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 4  | 生食         | 50          | mL                | フラッシュ |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    |            |             |                   |       |      |          |          |          |        |        |        |        |        |
| 5  | 5%糖液       | 250         | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | ドセタキセル     | 75          | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分  | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 6  | 5%糖液       | 250         | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | カルボプラチン    | AUC 6       |                   | 点滴静注  | 60分  | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン      | 8           | mg                | 内服    |      |          | ●        | ●        |        |        |        |        |        |
|    |            |             |                   |       |      |          |          |          |        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

診療科  
レジメン名  
対象疾患名  
治療目的  
治療内容

|                         |
|-------------------------|
| PHESGO+DTX+CBDCA(2回目以降) |
| HER2陽性乳癌                |

■術前 ■術後補助 □再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 B433M

| 薬品名     | 標準投与量        | 単位                | 投与経路 | 投与日  |
|---------|--------------|-------------------|------|------|
| フェスゴMA  | ヘルツス・マブ 600  | mg/body           | 皮下注  | day1 |
|         | トラスツス・マブ 600 | mg/body           |      |      |
| ドセタキセル  | 75           | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1 |
| カルボプラチン | AUC 6        |                   | 点滴静注 | day1 |
|         |              |                   |      |      |
|         |              |                   |      |      |
|         |              |                   |      |      |

投与周期 21日  
休薬

| Rp | 薬品名・規格     | 投与量          | 単位                | 投与ルート | 点滴時間 | Day( 1 ) | Day( 2 ) | Day( 3 ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) | Day( ) |
|----|------------|--------------|-------------------|-------|------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |            |              |                   |       |      |          |          |          |        |        |        |        |        |
| 1  | フェスゴMA     | ヘルツス・マブ 600  | mg/body           | 皮下注   | 5分以上 | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    |            | トラスツス・マブ 600 | mg/body           |       |      |          |          |          |        |        |        |        |        |
| 2  | 生食         | 100          | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    |            |              |                   |       |      |          |          |          |        |        |        |        |        |
| 3  | パロノセトロンバッグ | 0.75         | mg                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | アロカリス      | 235          | mg                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン      | 6.6          | mg                | 点滴静注  | 30分  | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 4  | 生食         | 50           | mL                | フラッシュ |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    |            |              |                   |       |      |          |          |          |        |        |        |        |        |
| 5  | 5%糖液       | 250          | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | ドセタキセル     | 75           | mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | 60分  | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
| 6  | 5%糖液       | 250          | mL                | 点滴静注  |      | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | カルボプラチン    | AUC 6        |                   | 点滴静注  | 60分  | ●        |          |          |        |        |        |        |        |
|    | デカドロン      | 8            | mg                | 内服    |      |          | ●        | ●        |        |        |        |        |        |
|    |            |              |                   |       |      |          |          |          |        |        |        |        |        |

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B440M

備考欄

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容        |
|-----|----------|----------|-------|-------------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の改善 | 外用薬、内服薬、保湿剤 |

|                                   |      |  |
|-----------------------------------|------|--|
|                                   | 申請医師 |  |
| Sacituzumab Govitecan（投与量850mg未満） |      |  |
| 化学療法歴のあるHER2陰性乳癌                  |      |  |

□術前 □術後補助 ■再発・進行

[illegible]

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B441M

備考欄

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容        |
|-----|----------|----------|-------|-------------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の改善 | 外用薬、内服薬、保湿剤 |

|                                   |      |  |
|-----------------------------------|------|--|
|                                   | 申請医師 |  |
| Sacituzumab Govitecan（投与量850mg以上） |      |  |
| 化学療法歴のあるHER2陰性乳癌                  |      |  |

□術前 □術後補助 ■再発・進行

[illegible]

|      |     |
|------|-----|
| 投与周期 | 21日 |
| 休薬   |     |

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B450M

|     |  |      |  |     |
|-----|--|------|--|-----|
| 診療科 |  | 申請医師 |  | 備考欄 |
|-----|--|------|--|-----|

|       |                        |
|-------|------------------------|
| レジメン名 | Datopotamab Deruxtecan |
|-------|------------------------|

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 対象疾患名 | 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性HER2陰性の手術不能又は再発乳癌 |
|-------|------------------------------------|

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

## 治療内容

治法：清熱解毒。

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-----|-------|----|------|-----|
|-----|-------|----|------|-----|

| 薬名     | 投与量     | 投与経路 | 投与日  |
|--------|---------|------|------|
| ダトロウエイ | 6 mg/kg | 点滴静注 | day1 |
|        |         |      |      |
|        |         |      |      |
|        |         |      |      |
|        |         |      |      |
|        |         |      |      |

投与周期 21日

[illegible]



## レジメン記入フォーマット

登録番号 B460S

| 診療科 | レジメン名    | 対象疾患名    | 治療目的  | 治療内容    |
|-----|----------|----------|-------|---------|
| 皮膚科 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 症状の軽減 | 外用薬、内服薬 |

申請医師

備考欄

Tucatinib+Trastuzumab+Capecitabine (初回)

化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

| 薬品名       | 標準投与量 | 単位                     | 投与経路 | 投与日     |
|-----------|-------|------------------------|------|---------|
| トラスツズマブBS | 8     | mg/kg                  | 点滴静注 | day1    |
| カペシタビン    | 2000  | mg/m <sup>2</sup> /day | 経口   | day1-14 |
| ツカイザ      | 600   | mg/day                 | 経口   | day1-21 |
|           |       |                        |      |         |
|           |       |                        |      |         |
|           |       |                        |      |         |
|           |       |                        |      |         |
|           |       |                        |      |         |

投与周期 21日

[illegible]

## レジメン記入フォーマット

登録番号 B461S

| 診療科  | レジメン名   | 対象疾患名  | 治療目的 | 治療内容          |
|------|---------|--------|------|---------------|
| 消化器科 | エタナセリット | 潰瘍性大腸炎 | 炎症抑制 | エタナセリット 5mg/週 |

申請医師

備考欄

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Tucatinib+Trastuzumab+Capecitabine(2回目以降) |
|-------------------------------------------|

化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能又は再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

## 投与経路

投与日

|          |      |                        |      |         |
|----------|------|------------------------|------|---------|
| トラスツマブBS | 6    | mg/kg                  | 点滴静注 | day1    |
| カペシタビン   | 2000 | mg/m <sup>2</sup> /day | 経口   | day1-14 |
| ツカイザ     | 600  | mg/day                 | 経口   | day1-21 |
|          |      |                        |      |         |
|          |      |                        |      |         |
|          |      |                        |      |         |
|          |      |                        |      |         |
|          |      |                        |      |         |

投与周期 21日

[illegible]