

code	レジメン名
B020S	Trastuzumab(3w)(初回)
B021S	Trastuzumab(3w)(2回目以降)
B040L	Weekly PTX(3投1休)
B041L	Weekly PTX(12w)
B050L	PTX+Bevacizumab
B060L	Eribulin単剤
B070L	PTX+Trastuzumab
B080L	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
B081L	DTX+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
B090S	Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
B091S	Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
B100L	nab-PTX
B110H	ADR単剤
B120H	AC
B121H	dose-dense AC
B131M	TC
B143H	EC100
B144H	EC75
B145H	dose-dense EC
B146H	EC90
B150L	dose-dense PTX
B160L	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
B161L	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
B170L	T-DM1
B180L	DTX75
B192L	DTX75+Trastuzumab(3w)(初回)
B193L	DTX75+Trastuzumab(3w)(2回目以降)
B200L	GEM(2投1休)
B212L	GEM(2投1休)+Trastuzumab(初回)
B213L	GEM(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)
B220L	GEM+PTX
B230L	VNR(2投1休)
B242L	VNR(2投1休)+Trastuzumab(初回)
B243L	VNR(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)
B244L	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
B245L	VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
B251M	CMF(modified)
B260M	CPT-11 original(3投2休)
B272M	TC+Trastuzumab(初回)
B273M	TC+Trastuzumab(2回目以降)
B280L	Eribulin+Trastuzumab(初回)
B281L	Eribulin+Trastuzumab(2回目以降)
B282L	Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
B283L	Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
B292M	DTX+CBDCA+Trastuzumab(初回)
B293M	DTX+CBDCA+Trastuzumab(2回目以降)
B300S	Capecitabine+Trastuzumab(初回)
B301S	Capecitabine+Trastuzumab(2回目以降)

code	レジメン名
B310L	Atezolizumab+nab-PTX
B320H	Trastuzumab Deruxtecan
B330L	Pembrolizumab+PTX
B340M	Pembrolizumab+GEM+CBDCA
B350M	Pembrolizumab+PTX+CBDCA(3W)
B360M	Pembrolizumab+PTX+CBDCA(1W)
B370H	Pembrolizumab+EC
B380S	Pembrolizumab単剤(術後)(3W)
B381S	Pembrolizumab単剤(術後)(6W)
B390S	PHESGO(初回)
B391S	PHESGO(2回目以降)
B400L	PHESGO+PTX(初回)
B401L	PHESGO+PTX(2回目以降)
B410L	PHESGO+DTX(初回)
B411L	PHESGO+DTX(2回目以降)
B420L	PHESGO+Eribulin(初回)
B421L	PHESGO+Eribulin(2回目以降)
B430M	DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)
B431M	DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)
B432M	PHESGO+DTX+CBDCA(初回)
B433M	PHESGO+DTX+CBDCA(2回目以降)
B440M	Sacituzumab Govitecan(投与量850mg未満)
B441M	Sacituzumab Govitecan(投与量850mg以上)
B450M	Datopotamab Deruxtecan
B460S	Tucatinib+Trastuzumab+Capecitabine(初回)
B461S	Tucatinib+Trastuzumab+Capecitabine(2回目以降)
B470H	Trastuzumab Deruxtecan+Pertuzumab(初回)
B471H	Trastuzumab Deruxtecan+Pertuzumab(2回目以降)
B480S	PHESGO(初回)+Palbociclib+(ET)
B481S	PHESGO(2回目以降)+Palbociclib+(ET)

レジメン記入フォーマット

登録番号 B020S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab (3w) (初回)	
-----------------------	--

HER2陽性乳癌

薬品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

トラスツズマブBS

8

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B021S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Trastuzumab (3w) (2回目以降)	
--------------------------	--

HER2陽性乳癌

薬品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

トラスツズマブBS

6

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科	内科	申請医師	
レジメン名	Weekly PTX (12w)		
対象疾患名	乳癌		
治療目的	☒ 術前 ☒ 術後補助 ☐ 再発・進行		

備考欄

登録番号 B041L

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78

投与周期 84日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B050L

診療科	
レジメン名	PTX+Bevacizumab
対象疾患名	乳癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	パクリタキセル	90	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
	ベバシズマブBS	10	mg/kg	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

休薬	
----	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B060L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Eribulin単剤

乳癌、惡性軟部腫瘍

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

Eribulin

1.4

 mg/m^2

点滴静注

dav1.8

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B070L

診療科	
レジメン名	PTX+Trastuzumab
対象疾患名	乳癌
治療目的	☒ 術前 ☒ 術後補助 ☒ 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

バクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78
トラスツズマブBS(初回)	4	mg/kg	点滴静注	day1
トラスツズマブBS(2～12回)	2	mg/kg	点滴静注	day8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78

投与周期 84日

休薬	
----	--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B080L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)

HER2陽性乳癌

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	デカドロン錠	8	mg	経口	分1		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B081L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師	
DTX+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)	
HER2陽性乳癌	

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	デカドロン錠	8	mg	経口	分2		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B090S

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Trastuzumab+Pertuzumab(初回)	
----------------------------	--

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ページエタ	840	mg/body	点滴静注	day1
-------	-----	---------	------	------

トラスツズマブBS	8 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B091S

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)	
--------------------------------	--

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

パーゼタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B100L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎治療薬	アトピー性皮膚炎	皮膚の炎症を抑え、かゆみを軽減する	外用薬（ステロイド剤、保湿剤）の塗布、保湿ケア
内科	高血圧治療薬	高血圧症	血圧を正常範囲に下げ、心血管系を保護する	経口薬（利尿剤、カルシウム拮抗剤、ACE阻害剤など）の投与
外科	関節置換療法	変形性関節症	痛みを軽減し、関節機能を回復させる	人工関節の手術（人工股関節置換術、人工膝関節置換術）
小児科	喘息治療薬	喘息	気管支の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（気管支拡張剤、吸入ステロイド剤）の使用
産婦人科	避妊薬	避妊	妊娠を防ぐ	経口避妊薬（ピル）の服用、避妊具の使用
泌尿器科	腎臓病治療薬	慢性腎臓病	腎臓機能を改善し、症状を軽減する	経口薬（利尿剤、降圧剤、リン酸調整剤など）の投与
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の手術（白内障摘出術）
耳鼻咽喉科	アレルギー性鼻炎治療薬	アレルギー性鼻炎	鼻の炎症を抑え、症状を軽減する	経鼻薬（ステロイド剤、抗アレルギー剤）の投与
精神科	抗うつ薬	うつ病	気分を改善し、症状を軽減する	経口薬（SSRI、SNRI）の投与
放射線科	放射線治療	がん	がん細胞を破壊し、腫瘍を縮小させる	外部照射（X線、γ線）または内部照射（放射性同位元素）
歯科	歯周病治療	歯周病	歯肉の炎症を抑え、歯を支える骨を保護する	歯のクリーニング（スケーリング）、歯周ポケットの洗浄
皮膚科	皮膚がん治療	基底細胞癌、有棘細胞癌	がん細胞を切除し、再発を防ぐ	手術（切除術）、放射線治療、化学療法
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン分泌促進剤、インスリン感受性増進剤）またはインスリン注射
小児科	小児がん治療	白血病、神経母細胞腫、骨肉腫	がん細胞を破壊し、生存率を向上させる	手術、化学療法（抗がん剤）、放射線治療
産婦人科	子宮がん治療	子宮頸がん、子宮体がん	がん細胞を切除し、再発を防ぐ	手術（子宮切除術）、放射線治療、化学療法
泌尿器科	前立腺がん治療	前立腺がん	がん細胞を破壊し、再発を防ぐ	手術（前立腺切除術）、放射線治療、ホルモン療法
眼科	緑内障治療	緑内障	眼圧を下げ、視神経を保護する	経点薬（降圧剤）の点眼、手術（小梁切除術）
耳鼻咽喉科	中耳炎治療	急性中耳炎	炎症を抑え、聴力を回復させる	経口薬（抗生剤）、点眼薬（抗生剤）
精神科	統合失調症治療薬	統合失調症	症状を軽減し、社会生活を営めるようにする	経口薬（抗精神病薬）の投与
放射線科	放射線治療	がん	がん細胞を破壊し、腫瘍を縮小させる	外部照射（X線、γ線）または内部照射（放射性同位元素）
歯科	歯周病治療	歯周病	歯肉の炎症を抑え、歯を支える骨を保護する	歯のクリーニング（スケーリング）、歯周ポケットの洗浄
皮膚科	皮膚がん治療	基底細胞癌、有棘細胞癌	がん細胞を切除し、再発を防ぐ	手術（切除術）、放射線治療、化学療法
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン分泌促進剤、インスリン感受性増進剤）またはインスリン注射
小児科	小児がん治療	白血病、神経母細胞腫、骨肉腫	がん細胞を破壊し、生存率を向上させる	手術、化学療法（抗がん剤）、放射線治療
産婦人科	子宮がん治療	子宮頸がん、子宮体がん	がん細胞を切除し、再発を防ぐ	手術（子宮切除術）、放射線治療、化学療法
泌尿器科	前立腺がん治療	前立腺がん	がん細胞を破壊し、再発を防ぐ	手術（前立腺切除術）、放射線治療、ホルモン療法
眼科	緑内障治療	緑内障	眼圧を下げ、視神経を保護する	経点薬（降圧剤）の点眼、手術（小梁切除術）
耳鼻咽喉科	中耳炎治療	急性中耳炎	炎症を抑え、聴力を回復させる	経口薬（抗生剤）、点眼薬（抗生剤）
精神科	統合失調症治療薬	統合失調症	症状を軽減し、社会生活を営めるようにする	経口薬（抗精神病薬）の投与
放射線科	放射線治療	がん	がん細胞を破壊し、腫瘍を縮小させる	外部照射（X線、γ線）または内部照射（放射性同位元素）
歯科	歯周病治療	歯周病	歯肉の炎症を抑え、歯を支える骨を保護する	歯のクリーニング（スケーリング）、歯周ポケットの洗浄
皮膚科	皮膚がん治療	基底細胞癌、有棘細胞癌	がん細胞を切除し、再発を防ぐ	手術（切除術）、放射線治療、化学療法
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン分泌促進剤、インスリン感受性増進剤）またはインスリン注射
小児科	小児がん治療	白血病、神経母細胞腫、骨肉腫	がん細胞を破壊し、生存率を向上させる	手術、化学療法（抗がん剤）、放射線治療
産婦人科	子宮がん治療	子宮頸がん、子宮体がん	がん細胞を切除し、再発を防ぐ	手術（子宮切除術）、放射線治療、化学療法
泌尿器科	前立腺がん治療	前立腺がん	がん細胞を破壊し、再発を防ぐ	手術（前立腺切除術）、放射線治療、ホルモン療法
眼科	緑内障治療	緑内障	眼圧を下げ、視神経を保護する	経点薬（降圧剤）の点眼、手術（小梁切除術）
耳鼻咽喉科	中耳炎治療	急性中耳炎	炎症を抑え、聴力を回復させる	経口薬（抗生剤）、点眼薬（抗生剤）
精神科	統合失調症治療薬	統合失調症	症状を軽減し、社会生活を営めるようにする	経口薬（抗精神病薬）の投与
放射線科	放射線治療	がん	がん細胞を破壊し、腫瘍を縮小させる	外部照射（X線、γ線）または内部照射（放射性同位元素）
歯科	歯周病治療	歯周病	歯肉の炎症を抑え、歯を支える骨を保護する	歯のクリーニング（スケーリング）、歯周ポケットの洗浄
皮膚科	皮膚がん治療	基底細胞癌、有棘細胞癌	がん細胞を切除し、再発を防ぐ	手術（切除術）、放射線治療、化学療法
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン分泌促進剤、インスリン感受性増進剤）またはインスリン注射
小児科	小児がん治療	白血病、神経母細胞腫、骨肉腫	がん細胞を破壊し、生存率を向上させる	手術、化学療法（抗がん剤）、放射線治療
産婦人科	子宮がん治療	子宮頸がん、子宮体がん	がん細胞を切除し、再発を防ぐ	手術（子宮切除術）、放射線治療、化学療法
泌尿器科	前立腺がん治療	前立腺がん	がん細胞を破壊し、再発を防ぐ	手術（前立腺切除術）、放射線治療、ホルモン療法
眼科	緑内障治療	緑内障	眼圧を下げ、視神経を保護する	経点薬（降圧剤）の点眼、手術（小梁切除術）
耳鼻咽喉科	中耳炎治療	急性中耳炎	炎症を抑え、聴力を回復させる	経口薬（抗生剤）、点眼薬（抗生剤）
精神科	統合失調症治療薬	統合失調症	症状を軽減し、社会生活を営めるようにする	経口薬（抗精神病薬）の投与
放射線科	放射線治療	がん	がん細胞を破壊し、腫瘍を縮小させる	外部照射（X線、γ線）または内部照射（放射性同位元素）
歯科	歯周病治療	歯周病	歯肉の炎症を抑え、歯を支える骨を保護する	歯のクリーニング（スケーリング）、歯周ポケットの洗浄
皮膚科	皮膚がん治療	基底細胞癌、有棘細胞癌	がん細胞を切除し、再発を防ぐ	手術（切除術）、放射線治療、化学療法
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン分泌促進剤、インスリン感受性増進剤）またはインスリン注射
小児科	小児がん治療	白血病、神経母細胞腫、骨肉腫	がん細胞を破壊し、生存率を向上させる	手術、化学療法（抗がん剤）、放射線治療
産婦人科	子宮がん治療	子宮頸がん、子宮体がん	がん細胞を切除し、再発を防ぐ	手術（子宮切除術）、放射線治療、化学療法
泌尿				

申請医師

備考欄

nab-PTX

乳癌

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

アブラキサン

260

 mg/m^2

点滴静注

day 1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B110H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎治療薬	アトピー性皮膚炎	皮膚の炎症を抑え、かゆみを軽減する	外用薬（ステロイド、保湿剤）の塗布、保湿ケア
内科	高血圧治療薬	高血圧症	血圧を正常範囲に下げ、心血管リスクを減らす	経口薬（利尿剤、カルシウム拮抗薬など）の投与
小児科	喘息治療薬	喘息	気道の炎症を抑え、呼吸を楽にする	吸入薬（ブロム化ナトリウム、ステロイド）の使用
産婦人科	避妊薬	避妊目的	妊娠を防ぐ	経口避妊薬（ピル）の服用、避妊具の使用
外科	手術療法	胆石症	胆石を除去し、胆管を確保する	胆管切開術、胆嚢切除術
眼科	近視矯正	近視	視力を矯正し、目の負担を減らす	眼鏡の処方、コンタクトレンズの使用
耳鼻科	中耳炎治療薬	中耳炎	中耳の炎症を抑え、聴力を回復させる	点眼薬（抗生物質、ステロイド）の投与
泌尿科	腎臓病治療薬	慢性腎臓病	腎機能を改善し、毒素を排出する	経口薬（利尿剤、降圧薬）の投与、透析
精神科	抗うつ薬	うつ病	気分を改善し、生活の質を向上させる	経口薬（SSRI、SNRI）の投与、心理療法
皮膚科	ニキビ治療薬	ニキビ	皮脂分泌を抑え、炎症を抑える	外用薬（ビタミンA誘導体、抗生物質）の塗布
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン、降糖薬）の投与、食事療法
産婦人科	産後ケア	産後うつ	産後の心身の回復を促す	心理療法、サポートグループの参加
小児科	アレルギー薬	アレルギー性鼻炎	アレルギー反応を抑え、症状を軽減する	経鼻薬（ステロイド、抗ヒスタミン薬）の投与
外科	手術療法	胆嚢炎	胆嚢の炎症を抑え、胆管を確保する	胆嚢切除術
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の移植手術
耳鼻科	中耳炎手術	慢性中耳炎	中耳の炎症を抑え、聴力を回復させる	鼓膜切開術、通気管挿入術
泌尿科	腎臓病手術	慢性腎臓病	腎機能を改善し、毒素を排出する	透析、腎臓移植
精神科	抗うつ薬	うつ病	気分を改善し、生活の質を向上させる	経口薬（SSRI、SNRI）の投与、心理療法
皮膚科	ニキビ治療薬	ニキビ	皮脂分泌を抑え、炎症を抑える	外用薬（ビタミンA誘導体、抗生物質）の塗布
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン、降糖薬）の投与、食事療法
産婦人科	産後ケア	産後うつ	産後の心身の回復を促す	心理療法、サポートグループの参加
小児科	アレルギー薬	アレルギー性鼻炎	アレルギー反応を抑え、症状を軽減する	経鼻薬（ステロイド、抗ヒスタミン薬）の投与
外科	手術療法	胆嚢炎	胆嚢の炎症を抑え、胆管を確保する	胆嚢切除術
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の移植手術
耳鼻科	中耳炎手術	慢性中耳炎	中耳の炎症を抑え、聴力を回復させる	鼓膜切開術、通気管挿入術
泌尿科	腎臓病手術	慢性腎臓病	腎機能を改善し、毒素を排出する	透析、腎臓移植
精神科	抗うつ薬	うつ病	気分を改善し、生活の質を向上させる	経口薬（SSRI、SNRI）の投与、心理療法
皮膚科	ニキビ治療薬	ニキビ	皮脂分泌を抑え、炎症を抑える	外用薬（ビタミンA誘導体、抗生物質）の塗布
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン、降糖薬）の投与、食事療法
産婦人科	産後ケア	産後うつ	産後の心身の回復を促す	心理療法、サポートグループの参加
小児科	アレルギー薬	アレルギー性鼻炎	アレルギー反応を抑え、症状を軽減する	経鼻薬（ステロイド、抗ヒスタミン薬）の投与
外科	手術療法	胆嚢炎	胆嚢の炎症を抑え、胆管を確保する	胆嚢切除術
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の移植手術
耳鼻科	中耳炎手術	慢性中耳炎	中耳の炎症を抑え、聴力を回復させる	鼓膜切開術、通気管挿入術
泌尿科	腎臓病手術	慢性腎臓病	腎機能を改善し、毒素を排出する	透析、腎臓移植
精神科	抗うつ薬	うつ病	気分を改善し、生活の質を向上させる	経口薬（SSRI、SNRI）の投与、心理療法
皮膚科	ニキビ治療薬	ニキビ	皮脂分泌を抑え、炎症を抑える	外用薬（ビタミンA誘導体、抗生物質）の塗布
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン、降糖薬）の投与、食事療法
産婦人科	産後ケア	産後うつ	産後の心身の回復を促す	心理療法、サポートグループの参加
小児科	アレルギー薬	アレルギー性鼻炎	アレルギー反応を抑え、症状を軽減する	経鼻薬（ステロイド、抗ヒスタミン薬）の投与
外科	手術療法	胆嚢炎	胆嚢の炎症を抑え、胆管を確保する	胆嚢切除術
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の移植手術
耳鼻科	中耳炎手術	慢性中耳炎	中耳の炎症を抑え、聴力を回復させる	鼓膜切開術、通気管挿入術
泌尿科	腎臓病手術	慢性腎臓病	腎機能を改善し、毒素を排出する	透析、腎臓移植
精神科	抗うつ薬	うつ病	気分を改善し、生活の質を向上させる	経口薬（SSRI、SNRI）の投与、心理療法
皮膚科	ニキビ治療薬	ニキビ	皮脂分泌を抑え、炎症を抑える	外用薬（ビタミンA誘導体、抗生物質）の塗布
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン、降糖薬）の投与、食事療法
産婦人科	産後ケア	産後うつ	産後の心身の回復を促す	心理療法、サポートグループの参加
小児科	アレルギー薬	アレルギー性鼻炎	アレルギー反応を抑え、症状を軽減する	経鼻薬（ステロイド、抗ヒスタミン薬）の投与
外科	手術療法	胆嚢炎	胆嚢の炎症を抑え、胆管を確保する	胆嚢切除術
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の移植手術
耳鼻科	中耳炎手術	慢性中耳炎	中耳の炎症を抑え、聴力を回復させる	鼓膜切開術、通気管挿入術
泌尿科	腎臓病手術	慢性腎臓病	腎機能を改善し、毒素を排出する	透析、腎臓移植
精神科	抗うつ薬	うつ病	気分を改善し、生活の質を向上させる	経口薬（SSRI、SNRI）の投与、心理療法
皮膚科	ニキビ治療薬	ニキビ	皮脂分泌を抑え、炎症を抑える	外用薬（ビタミンA誘導体、抗生物質）の塗布
内科	糖尿病治療薬	糖尿病	血糖値をコントロールし、合併症を予防する	経口薬（インスリン、降糖薬）の投与、食事療法
産婦人科	産後ケア	産後うつ	産後の心身の回復を促す	心理療法、サポートグループの参加
小児科	アレルギー薬	アレルギー性鼻炎	アレルギー反応を抑え、症状を軽減する	経鼻薬（ステロイド、抗ヒスタミン薬）の投与
外科	手術療法	胆嚢炎	胆嚢の炎症を抑え、胆管を確保する	胆嚢切除術
眼科	白内障手術	白内障	視力を回復させる	人工水晶体の移植手術
耳鼻科	中耳炎手術	慢性中耳炎	中耳の炎症を抑え、聴力を回復させる	鼓膜切開術、通気管挿入術
泌尿科				

申請医師

備考欄

ADR单剂

轉移性乳癌

術前	術後補	再発・進
----	-----	------

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドキソルビン

75

$$\text{mg/m}^2$$

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B120H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

AC

乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

ドキソルビン

60

 mg/m^2

点滴静注

day 1

エンドキサン

600

 mg/m^2

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B121H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請醫師

備考欄

dose-dense AC

乳癌

■術前 ■術後補助 □再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドキソルビシン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B131M

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

TC
副處長 術後補 再登・准

申請医師

備考欄

[illegible]

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B143H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

EC100

乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

エピルビシン

100

 mg/m^2

点滴静注

day1

エンドキサン

500

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B144H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

EC75
乳癌
□術前 ■術後補助 ■再発・進行

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エピルビシン	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B145H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

☐ dose-dense EC
☒ 乳癌
☒ 術前 ☒ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エビルビシン	90	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B146H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

EC90
乳癌
■術前 ■術後補助 ■再発・進行

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エピルビシン	90	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B150L

診療科	
レジメン名	dose-dense PTX
対象疾患名	乳癌
治療目的	

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50	mg	内服		●							
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	ファモチジン	20	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	500	mL	点滴静注		●							
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B160L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)

HER2陽性乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B161L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

	PTX+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)	
--	-----------------------------------	--

HER2陽性乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B170L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

T-DM1

HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

カドサイラ

3.6

mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B180L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

DTX75

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドセタキセル

75

 mg/m^2

点滴静注

day 1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B193L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬

DTX75+Trastuzumab(3w)(2回目以降)
乳癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
3	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服	分1		●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B200L

[illegible]

申請医師

備考欄

GEM(2投1休)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

ゲムシタビン

1250

0 mg/m²

点滴静注

day 1,8

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B212L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

GEM(2投1休)+Trastuzumab(初回)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B213L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

GEM(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ゲムシタビン	1250	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B220L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

GEM+PTX

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与目

ゲムシタビン

1250

 mg/m^2

点滴静注

dav1.8

パクリタキセル

175

 mg/m^2

点滴静注

day 1

--

	8

水洞前江	
------	--

day 1	
-------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 **21日**

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
0	レスタミンコーワ	50mg		内服		●							
1	生食	100mL		点滴静注		●	●						
2	生食	50mL		点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6mg		点滴静注		●	●						
	ファモチジン	20mg		点滴静注	15分	●							
3	5%糖液	250mL		点滴静注		●							
	パクリタキセル	175mg/m ²		点滴静注	180分	●							
4	生食	100mL		点滴静注		●	●						
	ゲムシタビン	1250mg/m ²		点滴静注	30分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B230L

診療科

レジメン名	VNR(2投1休)
-------	-----------

対象疾患名 **乳癌**

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

治療内容

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B242L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

VNR(2投1休)+Trastuzumab(初回)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B243L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

VNR(2投1休)+Trastuzumab(2回目以降)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B244L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(初回)

HER2陽性転移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B245L

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

VNR+Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)

HER2陽性転移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	day1,8
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	ロゼウス	25	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 B251M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

CMF (modified)

乳癌

☐術前 ☒術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与目

メソトレキセート

40

 mg/m^2

点滴静注

day1.8

エンドキサン

500

 mg/m^2

点滴静注

day1.8

5-FU

500

 mg/m^2

点滴静注

day1.8

投与周期 28日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●					
3	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	メソトレキセート	40	mg/m ²	点滴静注	20分	●	●					
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	エンドキサン	500	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	5-FU	500	mg/m ²	点滴静注	20分	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B260M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

CPT-11 original(3投2休)
乳癌
☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	80-100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 35日

Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	パロノセトロンバッグ デカドロン	0.75 mg 6.6 mg		点滴静注 点滴静注	15分	●	●	●					
3	5%糖液 イリノテカン	500 80-100	mL mg/m ²	点滴静注 点滴静注	90分	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TC+Trastuzumab (初回)
乳癌

申請医師

備考欄

登録番号 B272M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	4	mg/kg	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	day8,15

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●		
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	4	mg/kg	点滴静注	90分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注					●	●		
	トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	90→30分				●	●		
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B273M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

TC+Trastuzumab (2回目以降)

乳癌

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	day1,8,15

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●			●	●		
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●						
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	15分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●			●	●		
	トラスツズマブBS	2	mg/kg	点滴静注	90→30分	●			●	●		
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B280L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab (初回)

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ハラヴェン

1.4

 mg/m^2

点滴静注

day1,8

トラスツズマブBS

8

mg/kg

点滴静注

day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B281L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab (2回目以降)	
------------------------------	--

乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ハラヴェン	1.4 mg/m ²	点滴静注	day1,8
-------	-----------------------	------	--------

トラスツズマブBS	6 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

--	--	--	--	--

投与周期 **21日**

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食 デカドロン	50 6.6	mL mg	点滴静注 点滴静注		●	●						
3	生食 ハラヴェン	30 1.4	mL mg/m ²	点滴静注 点滴静注	全開 約2～5分	●	●						
4	生食 トラスツズマブBS	250 6	mL mg/kg	点滴静注 点滴静注		●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B282L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)

HER2陽性転移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B283L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容

申請医師

備考欄

Eribulin+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)

HER2陽性転移再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	30	mL	点滴静注	全開	●	●						
	ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	約2～5分	●	●						
4	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B292M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

	申請医師
DTX+CBDCA+Trastuzumab (初回)	
乳癌	

備考欄

--

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B293M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

DTX+CBDCA+Trastuzumab (2回目以降)

乳癌

藥品名

標準投与量

單位

投与経路 投与日

トラスツズマブBS

6

mg/kg

点滴静注

day 1

ドセタキセル

75

 mg/m^2

点滴静注

day 1

カルボプラチ

AUC 6

[illegible]

点滴静注

day 1

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 B300S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Capecitabine+Trastuzumab(初回)

HER2陽性転移再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
カペシタビン	2500	mg/m ² /day	経口	day1-14

投与周期 21日

休藥

21日
7日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B301S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Capecitabine+Trastuzumab(2回目以降)

HER2陽性転移再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	6 mg/kg	点滴静注	day1
-----------	---------	------	------

カペシタビン	2500	mg/m ² /day	経口	day1-14
--------	------	------------------------	----	---------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

休薬	7日
----	----

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
	カペシタビン	2500	mg/m ² /day	経口		———>							

レジメン記入フォーマット

登録番号 B310L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請醫師

備考欄

Atezolizumab+nab-PTX	
----------------------	--

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行[illegible]

投与周期	28日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●					
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	テセントリク	1680	mg/body	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●		●					
4	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●					
5	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●					
6	生食	20	mL/m ²	点滴静注		●	●	●					
	アブラキサン	100	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B320H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Trastuzumab Deruxtecan

HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

エンハーツ

5.4

4 mg/kg

点滴静注

day 1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+PTX		
対象疾患名	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌		
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 再発・進行		
治療内容			

登録番号 B330L

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1 q3w
パクリタキセル	90	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15 q4w

投与周期 84日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B340M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+GEM+CBDCA

PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	day1,8

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	生食	100	mL	点滴静注		●						
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●					
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●					
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●					
5	生食	250	mL	点滴静注		●	●					
	カルボプラチン	AUC 2		点滴静注	60分	●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B370H

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Pembrolizumab+EC

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

■術前 □術後補助 □再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
エピルビシン	90	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	600	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B380S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Pembrolizumab単剤(術後)(3W)

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

□術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ [®]	200	mg/body	点滴静注	day1
---------------------	-----	---------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B381S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

Pembrolizumab単剤(術後)(6W)

ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の再発高リスク乳癌

□術前 ■術後補助 □再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

キイトルーダ [®]	400 mg/body	点滴静注	day1
---------------------	-------------	------	------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

投与周期 42日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B390S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PHESGO (初回)

HER2陽性乳癌

□術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

フェスゴIN

ヘルツスマフ 1200

mg/body

虫下注

day:1

トラスツスマブ 600

mg/body

皮下注

day 1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B391S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PHESGO (2回目以降)
HER2陽性乳癌
□術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴMA	ヘルツスマブ 600	mg/body	皮下注	day1
	トラスツスマブ 600	mg/body		

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B400L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PHESGO+PTX(初回)

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

フェスゴIN

ヘルツスマフ	1200
ヘルツスマフ	2000

mg/body

皮下注

day 1

パクリタキセル

トラスツス マフ	600
	8

mg/body
mg/m ²

点滴静

day 1.8.15

--	--

--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B401L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PHESGO+PTX(2回目以降)

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴMA	ヘルツス'マフ 600	mg/body	皮下注	day1
	トラスツス'マフ 600	mg/body		
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B410L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PHESGO+DTX(初回)

HER2陽性乳癌

■術前 ■術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴIN	ヘルツス'マフ 1200	mg/body	皮下注	day1
	トラスツス'マフ 600	mg/body		
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B411L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

PHESGO+DTX(2回目以降)	
HER2陽性乳癌	
■術前 ■術後補助 ■再発・進行	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴMA	ヘルツス'マフ 600	mg/body	皮下注	day1
	トラスツス'マフ 600	mg/body		
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B420L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

PHESGO+Eribulin (初回)	
HER2陽性乳癌	
■術前 ■術後補助 ■再発・進行	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴIN	ヘルツス'マブ 1200	mg/body	皮下注	day1
	トラスツス'マブ 600	mg/body		
ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B421L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

PHESGO+Eribulin(2回目以降)	
HER2陽性乳癌	
■術前 ■術後補助 ■再発・進行	

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴMA	ヘルツス'マフ 600	mg/body	皮下注	day1
	トラスツス'マフ 600	mg/body		
ハラヴェン	1.4	mg/m ²	点滴静注	day1,8

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

		申請医師	
DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)			
HER2陽性乳癌			
☒ 術前 ☒ 術後補助 ☐ 再発・進行			
薬品名	標準投与量	単位	投与経路 投与日
バージェタ	840	mg/body	点滴静注 day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注 day1
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注 day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注 day1

備考欄

登録番号 B430M

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	250	mL	点滴静注		●						
	バージェタ	840	mg	点滴静注	60分	●						
3	生食	250	mL	点滴静注		●						
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●						
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●				

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

		申請医師			
DTX+CBDCA+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)					
HER2陽性乳癌					
☒ 術前 ☒ 術後補助 ☐ 再発・進行					
薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日	
パージェタ	420	mg/body	点滴静注	day1	
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1	
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1	
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1	

備考欄

登録番号 B431M

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	250	mL	点滴静注		●							
	パージェタ	420	mg	点滴静注	60→30分	●							
3	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

PHESGO+DTX+CBDCA (初回)
HER2陽性乳癌
☒ 術前 ☒ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 B432M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴIN	ヘルツス'マフ' 1200	mg/body	皮下注	day1
	トラスツス'マフ' 600	mg/body		
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	フェスゴIN	ヘルツス'マフ' 1200	mg/body	皮下注	8分以上	●							
		トラスツス'マフ' 600	mg/body										
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

PHESGO+DTX+CBDCA(2回目以降)
HER2陽性乳癌
☒ 術前 ☒ 術後補助 ☐ 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 B433M

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
フェスゴMA	ヘルツス'マフ' 600	mg/body	皮下注	day1
	トラスツス'マフ' 600	mg/body		
ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	day1

投与周期 21日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	フェスゴMA	ヘルツス'マフ' 600	mg/body	皮下注	5分以上	●							
		トラスツス'マフ' 600	mg/body										
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	30分	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	75	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	カルボプラチン	AUC 6		点滴静注	60分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 B440M

備考欄

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

Sacituzumab Govitecan (投与量850mg未満)	
------------------------------------	--

化学療法歴のあるHER2陰性乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トロデルビ	10	mg/kg	点滴静注	day1,8

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B441M

備考欄

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

Sacituzumab Govitecan	(投与量850mg以上)
-----------------------	--------------

化学療法歴のあるHER2陰性乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トロデルビ	10	mg/kg	点滴静注	day1,8

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B450M

診療科
レジメン名
対象疾患名

申請医師

備考欄

Datopotamab Deruxtecan	
------------------------	--

化学療法歴のあるホルモン受容体陽性HER2陰性の手術不能又は再発乳癌

ホルモン受容体陰性HER2陰性の手術不能又は再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療目的
治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

投与日

ダトロウェイ

6

mg/kg

点滴静注

day 1

2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

	110	120

承前附注	
------	--

day 1	
-------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B460S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

Tucatinib+Trastuzumab+Capecitabine(初回)

化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能又は再発乳癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
カペシタビン	2000	mg/m ² /day	経口	day1-14
ツカイザ	600	mg/day	経口	day1-21

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B461S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	透析療法
眼科	緑内障	緑内障	眼圧のコントロール	点眼薬、手術療法
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	点耳薬、手術療法
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術療法
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術療法、化学療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術療法、化学療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	がん	がん	がんの切除	手術療法
泌尿科	がん	がん	がんの切除	手術療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	がん	がん	がんの切除	手術療法
泌尿科	がん	がん	がんの切除	手術療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	がん	がん	がんの切除	手術療法
泌尿科	がん	がん	がんの切除	手術療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	がん	がん	がんの切除	手術療法
泌尿科	がん	がん	がんの切除	手術療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	がん	がん	がんの切除	手術療法
泌尿科	がん	がん	がんの切除	手術療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	がん	がん	がんの切除	手術療法
泌尿科	がん	がん	がんの切除	手術療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	がん	がん	がんの切除	手術療法
泌尿科	がん	がん	がんの切除	手術療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	がん	がん	がんの切除	手術療法
泌尿科	がん	がん	がんの切除	手術療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	がん	がん	がんの切除	手術療法
泌尿科	がん	がん	がんの切除	手術療法
眼科	がん	がん	がんの切除	手術療法
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術療法
皮膚科	がん	がん	がんの切除	手術療法
小児科	がん	がん	がんの切除	手術療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術療法
婦人科	がん	がん	がんの切除	手術療法
泌尿科	がん	がん	がんの切除	手術療法
眼科	がん	がん		

申請医師

備考欄

Tucatinib+Trastuzumab+Capecitabine (2回目以降)

化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能又は再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
カベシタビン	2000	mg/m ² /day	経口	day1-14
ツカイザ [®]	600	mg/day	経口	day1-21

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Trastuzumab Deruxtecan+Pertuzumab (初回)

対象疾患名 HER2陽性の手術不能または再発乳癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

登録番号 B470H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	day1
パージェタ	840	mg/body	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●								
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●								
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●								
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●								
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●								
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●								
	注射用水	0.27	mL/kg	点滴静注		●								
	エンハーツ	5.4	mg/kg	点滴静注	90分→30分	●								
5	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●								
6	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●								
7	生食	250	mL	点滴静注		●								
	パージェタ	840	mg	点滴静注	60→30分	●								

レジメン記入フォーマット

登録番号 B480S

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬

申請医師

備考欄

PHESGO (初回) + Palbociclib + (ET)

ホルモン受容体陽性かつHER2陽性の手術不能または再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

フェスゴIN	ヘルツスマブ 1200	mg/body	皮下注	day1
	トラスツスマブ 600	mg/body		
パルボシクリブ	125	mg	経口	3投1休
内分泌療法				

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 B481S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

PHESGO (2回目以降) + Palbociclib + (ET)

ホルモン受容体陽性かつHER2陽性の手術不能または再発乳癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路 投与日

フェスゴTMMA

ヘルツスマフ 600

mg/body

皮下注

day1

トラスツスマブ 600

mg/body

パルボシクリブ

125

經口	
----	--

3投1休

内分泌療法

投与周期 21日

休薬

[illegible]