

| code | レジメン名 |
|-------------------------|------------------------------|
| U010L | ドセタキセル100%(L) |
| U020H | GC(ウロ) |
| U030H | EP |
| U040H | BEP |
| U050H | MVAC |
| U050-1L | MVAC単独15 |
| U060H | MVACmini |
| U070M | modified GC |
| U080H | MVPCAB |
| U090M | CBDCA/VP-16 |
| U100H | DOC + CDDP |
| U110H | 泌尿器科NM |
| U120L | ジェブタナ療法 |
| U130S | トーリセル療法(S) |
| U140S | Pembrolizumab単剤(尿路上皮癌) |
| U150S | Nivolumab単剤(腎細胞癌) |
| U160S | Ipilimumab + Nivolumab(腎細胞癌) |

レジメン記入フォーマット

登録番号

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 投与日 |
|------|--------|-------|--------|
| | ラステット | 100 | day1-5 |
| | シスプラチン | 20 | day1-5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

投与周期

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 点滴時間 | Day(1) | Day(2) | Day(3) | Day(4) | Day(5) | Day() | Day() | Day() |
|----|-------------|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | アロキシ | 0.75 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | 15分 | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | 15分 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 3 | ラステット | 100 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | 生食 | 500 | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 4 | シスプラチン | 20 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | 生食 | 500 | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 5 | マンニトールS 300 | 300 | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | | ●(125) | ●(80) | ●(80) | ●(80) | ●(80) | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 U040H

診療科 泌尿器科
 レジメン名 BEP
 対象疾患名 胚細胞腫瘍
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 投与日 |
|------|--------|-------|-----------|
| | ラステット | 100 | day1-5 |
| | シスプラチン | 20 | day1-5 |
| | ブレオ | 30 | day2.9.16 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

投与周期 21日

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 点滴時間 | Day(1) | Day(2) | Day(3) | Day(4) | Day(5) | Day(9) | Day(16) | Day() |
|----|-------------|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | 生食 | 100 | | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | アロキシ | 0.75 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | 15分 | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | 15分 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 3 | ラステット | 100 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | 生食 | 500 | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 4 | ブレオ | 30 | | | ● | | | | ● | ● | |
| | 生食 | 100 | 1時間 | | ● | | | | ● | ● | |
| 5 | シスプラチン | 20 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | 生食 | 500 | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 6 | マンニトールS 300 | 300 | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | | ●(125) | ●(80) | ●(80) | ●(80) | ●(80) | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 U050H

診療科 泌尿器科
 レジメン名 MVAC
 対象疾患名 尿路上皮癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 投与日 |
|------|----------|-------|------------|
| | メソトレキセート | 30 | day1.15.22 |
| | エクザール | 3 | day2.15.22 |
| | ドキシソルピシン | 30 | day2 |
| | シスプラチン | 70 | day2 |
| | | | |
| | | | |

投与周期 28日

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 点滴時間 | Day(1) | Day(2) | Day(3-4) | Day(5) | Day(15) | Day(22) | Day() | Day() |
|----|----------|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 | 生食 | 100 | | | ● | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | アロキシ | 0.75 | | | ● | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | 15分 | | ● | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | 15分 | ● | | | | ● | ● | | |
| 3 | メソトレキセート | 30 | | ● | | | | ● | ● | | |
| | 生食 | 100 | 1時間 | ● | | | | ● | ● | | |
| 4 | 生食 | 100 | | | ● | | | | | | |
| | ドキシソルピシン | 30 | 1時間 | | ● | | | | | | |
| 5 | 生食 | 100 | | | ● | | | ● | ● | | |
| | エクザール | 3 | 1時間 | | ● | | | ● | ● | | |
| 6 | 生食 | 400 | | | ● | | | | | | |
| | シスプラチン | 70 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | | | ●(125) | ●(80) | | | | | |
| | デカドロン | 8 | | | | ● | ● | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 U050-1L

診療科 泌尿器科
 レジメン名 MVAC単独15
 対象疾患名 尿路上皮癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 投与日 |
|------|----------|-------|------|
| | メソトレキセート | 30 | day1 |
| | エクザール | 3 | day1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

投与周期 7日

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 点滴時間 | Day(1) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|----------|-----|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | ● | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 3 | ソルデム1 | 200 | | ● | | | | | | | |
| | メイロン7% | 20 | 45分 | ● | | | | | | | |
| 4 | メソトレキセート | 30 | | ● | | | | | | | |
| | 生食 | 100 | 1時間 | ● | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 100 | | ● | | | | | | | |
| | エクザール | 3 | 1時間 | ● | | | | | | | |
| 6 | ソルデム1 | 200 | | ● | | | | | | | |
| | メイロン7% | 20 | 45分 | ● | | | | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 U060H

診療科 泌尿器科
 レジメン名 MVACmini
 対象疾患名 尿路上皮癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 投与日 |
|------|----------|-------|------|
| | メソトレキセート | 30 | day1 |
| | エクザール | 3 | day2 |
| | ドキソルビシン | 30 | day2 |
| | シスプラチン | 70 | day2 |
| | | | |
| | | | |

投与周期 28日

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 点滴時間 | Day(1) | Day(2) | Day(3-4) | Day(5) | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|----------|--------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 | | | ● | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | | ● | ● | | | | | | |
| | アロキシ | 0.75 | | | ● | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | 15分 | | ● | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 3 | メソトレキセート | 30 | | ● | | | | | | | |
| | 生食 | 100 | 1時間 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 100 | | | ● | | | | | | |
| | ドキソルビシン | 30 | 1時間 | | ● | | | | | | |
| 5 | 生食 | 100 | | | ● | | | | | | |
| | エクザール | 3 | 1時間 | | ● | | | | | | |
| 6 | 生食 | 400 | | | ● | | | | | | |
| | シスプラチン | 70 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | | | ●(125) | ●(80) | | | | | |
| | デカドロン | 8 | | | | ● | ● | | | | |

レジメン記入フォーマット

| 診療科 | 泌尿器科 | 備考欄 | 登録番号 U110H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|------------|-------|-----|--------|----|--------------|-------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| レジメン名 | 泌尿器科NM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象疾患名 | 尿路上皮癌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治療目的 | <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治療内容 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">薬品名</th> <th style="width: 20%;">標準投与量</th> <th style="width: 50%;">投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シスプラチン</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>day1,8,15,22</td> </tr> <tr> <td>ピノルビン</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>day1,8</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | | 薬品名 | 標準投与量 | 投与日 | シスプラチン | 10 | day1,8,15,22 | ピノルビン | 10 | day1,8 | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名 | 標準投与量 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン | 10 | day1,8,15,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピノルビン | 10 | day1,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 投与周期 | 28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 休薬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 点滴時間 | Day(1) | Day(8) | Day(15) | Day(22) | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|------------|------|-------|----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ソルラクト | 1000 | 4時間 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 2 | 水溶性プレドニン | 10 | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | 生食 | 10 | フラッシュ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 3 | ピノルビン | 10 | | ● | ● | | | | | | |
| | 糖液5% | 40 | 1時間 | ● | ● | | | | | | |
| 4 | 生食 | 10 | フラッシュ | ● | ● | | | | | | |
| 5 | シスプラチン | 10 | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | 生食 | 20 | 1時間 | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 6 | ヘパリン5000単位 | 5 | フラッシュ | ● | ● | ● | ● | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 U120L

診療科 泌尿器科
 レジメン名 ジェブタナ療法
 対象疾患名 去勢抵抗性前立腺癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 投与日 |
|------|-------|-------|------|
| | ジェブタナ | 25 | day1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

投与周期 21日

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 点滴時間 | Day(1) | Day(2-21) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|--------|-----|------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | 生食 | 100 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | | ● | | | | | | | |
| | ファモチジン | 20 | | ● | | | | | | | |
| | ポララミン | 5 | 30分 | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 100 | 30分 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食 | 250 | | ● | | | | | | | |
| | ジェブタナ | 25 | 60分 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50 | 10分 | ● | | | | | | | |
| | プレドニン | 10 | | ● | ● | | | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 U160S

診療科 腫瘍血液内科 申請医師 須藤 洋崇 備考欄

レジメン名 Ipilimumab + Nivolumab (腎細胞癌)

対象疾患名 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-------|-------|---------|------|------|
| オブジーボ | 240 | mg/body | 点滴静注 | day1 |
| ヤーボイ | 1 | mg/kg | 点滴静注 | day1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投与周期 21日

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|--------|-----|---------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | ● | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | オブジーボ | 240 | mg/body | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| 3 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 25 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | ヤーボイ | 1 | mg/kg | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |