

| code | レジメン名 |
|-------------------------|------------------------------|
| U010L | DTX100% |
| U020H | GC(ウロ) |
| U030H | EP |
| U040H | BEP |
| U050H | MVAC |
| U050-1L | MVAC単独15 |
| U060H | MVACmini |
| U070M | modified GC |
| U080H | MVPCAB |
| U090M | CBDCA/VP-16 |
| U100H | DTX + CDDP |
| U120L | Cabazitaxel |
| U140S | Pembrolizumab単剤(尿路上皮癌) |
| U150S | Nivolumab単剤(腎細胞癌) |
| U160S | Ipilimumab + Nivolumab(腎細胞癌) |
| U170S | Pembrolizumab+Lenvatinib |

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|--------|-------|-------------------|------|--------|
| | ラステット | 100 | mg/m ² | 点滴静注 | day1-5 |
| | シスプラチン | 20 | mg/m ² | 点滴静注 | day1-5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2) | Day(3) | Day(4) | Day(5) | Day() | Day() | Day() |
|----|-------------|--------|-------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | アロキシ | 0.75 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | 15分 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 3 | ラステット | 100 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | 生食 | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 4 | シスプラチン | 20 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | 生食 | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 5 | マンニトールS 300 | 300 | mL | 点滴静注 | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | mg | 内服 | | ●(125) | ●(80) | ●(80) | ●(80) | ●(80) | | | |

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|--------|-------|-------------------|------|-----------|
| | ラステット | 100 | mg/m ² | 点滴静注 | day1-5 |
| | シスプラチン | 20 | mg/m ² | 点滴静注 | day1-5 |
| | ブレオ | 30 | mg/body | 点滴静注 | day2.9.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2) | Day(3) | Day(4) | Day(5) | Day(9) | Day(16) | Day() |
|----|-------------|--------|-------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | アロキシ | 0.75 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | 15分 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 3 | ラステット | 100 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | 生食 | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 4 | ブレオ | 30 | mg/body | 点滴静注 | | | ● | | | | ● | ● | |
| | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | ● | ● | |
| 5 | シスプラチン | 20 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | 生食 | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 6 | マンニトールS 300 | 300 | mL | 点滴静注 | 30分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | mg | 内服 | | ●(125) | ●(80) | ●(80) | ●(80) | ●(80) | | | |

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|----------|-------|-------------------|------|------------|
| | メソトレキセート | 30 | mg/m ² | 点滴静注 | day1.15.22 |
| | エクザール | 3 | mg/m ² | 点滴静注 | day2.15.22 |
| | ドキソルビシン | 30 | mg/m ² | 点滴静注 | day2 |
| | シスプラチン | 70 | mg/m ² | 点滴静注 | day2 |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2) | Day(3-4) | Day(5) | Day(15) | Day(22) | Day() | Day() |
|----|----------|--------|-------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | アロキシ | 0.75 | mg | 点滴静注 | | | ● | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | mg | 点滴静注 | 15分 | | ● | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | ● | ● | | |
| 3 | メソトレキセート | 30 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | ● | ● | | |
| | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 1時間 | ● | | | | ● | ● | | |
| 4 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | | ● | | | | | | |
| | ドキソルビシン | 30 | mg/m ² | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | |
| 5 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | | ● | | | ● | ● | | |
| | エクザール | 3 | mg/m ² | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | ● | ● | | |
| 6 | 生食 | 400 | mL | 点滴静注 | | | ● | | | | | | |
| | シスプラチン | 70 | mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | mg | 内服 | | | ●(125) | ●(80) | | | | | |
| | デカドロン | 8 | mg | 内服 | | | | ● | ● | | | | |

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|----------|-------|-------------------|------|------|
| | メソトレキセート | 30 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | エクザール | 3 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|----------|-----|-------------------|-------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 3 | ソルデム1 | 200 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | メイロン7% | 20 | mL | 点滴静注 | 45分 | ● | | | | | | | |
| 4 | メソトレキセート | 30 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 1時間 | ● | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | エクザール | 3 | mg/m ² | 点滴静注 | 1時間 | ● | | | | | | | |
| 6 | ソルデム1 | 200 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | メイロン7% | 20 | mL | 点滴静注 | 45分 | ● | | | | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 U060H

| | | | |
|-------|--|------|--|
| 診療科 | | 申請医師 | |
| レジメン名 | MVACmini | | |
| 対象疾患名 | 尿路上皮癌 | | |
| 治療目的 | <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行 | | |

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|----------|-------|-------------------|------|------|
| | メソトレキセート | 30 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | エクザール | 3 | mg/m ² | 点滴静注 | day2 |
| | ドキソルビシン | 30 | mg/m ² | 点滴静注 | day2 |
| | シスプラチン | 70 | mg/m ² | 点滴静注 | day2 |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期 28日 休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2) | Day(3-4) | Day(5) | Day() | Day() | Day() |
|----|----------|--------|-------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | ● | | | | | |
| | アロキシ | 0.75 | mg | 点滴静注 | | | ● | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | mg | 点滴静注 | 15分 | | ● | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | |
| 3 | メソトレキセート | 30 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 1時間 | ● | | | | | | |
| 4 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | | ● | | | | | |
| | ドキソルビシン | 30 | mg/m ² | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | |
| 5 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | | ● | | | | | |
| | エクザール | 3 | mg/m ² | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | |
| 6 | 生食 | 400 | mL | 点滴静注 | | | ● | | | | | |
| | シスプラチン | 70 | mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | mg | 内服 | | | ●(125) | ●(80) | | | | |
| | デカドロン | 8 | mg | 内服 | | | | ● | ● | | | |

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|----------|-------|-------------------|------|-------|
| | メソトレキセート | 20 | mg/m ² | 点滴静注 | day 1 |
| | ドキソルビシン | 20 | mg/m ² | 点滴静注 | day 1 |
| | オンコビン | 0.6 | mg/m ² | 点滴静注 | day 1 |
| | エンドキサン | 500 | mg/m ² | 点滴静注 | day 1 |
| | ブレオ | 30 | mg/body | 点滴静注 | day 1 |
| | シスプラチン | 50 | mg/m ² | 点滴静注 | day 2 |

投与周期

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2) | Day(3-4) | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|----------|--------|-------------------|-------|----------------|----------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | ● | | | | | |
| | アロキシ | 0.75 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | ● | | | | | |
| 3 | 糖液5% | 250 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| | メソトレキセート | 20 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| | ドキソルビシン | 20 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| | オンコビン | 0.6 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| | エンドキサン | 500 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| | ブレオ | 30 | mg/body | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | |
| 4 | 生食 | 400 | mL | 点滴静注 | | | ● | | | | | |
| | シスプラチン | 50 | mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | mg | | | | ●(125) | ●(80) | | | | |

レジメン記入フォーマット

| | | | | | |
|-------|--|------|--|-----|------------|
| 診療科 | | 申請医師 | | 備考欄 | 登録番号 U120L |
| レジメン名 | Cabazitaxel | | | | |
| 対象疾患名 | 去勢抵抗性前立腺癌 | | | | |
| 治療目的 | <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行 | | | | |

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|-------|-------|-------------------|------|------|
| | ジェブタナ | 25 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期 休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2-21) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|--------|-----|-------------------|-------|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | × | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | ファモチジン | 20 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | ポララミン | 5 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 3 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 250 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | ジェブタナ | 25 | mg/m ² | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | |
| | プレドニン | 10 | mg | 内服 | | ● | ● | | | | | | |

