

code	レジメン名
<u>G010M</u>	weeklyTC
<u>G020M</u>	bi-weeklyDC AUC2
<u>G030M</u>	bi-weeklyDC AUC3
<u>G040M</u>	tri-weeklyTC
<u>G050M</u>	tri-weeklyDC
<u>G060L</u>	weeklyPTX
<u>G070L</u>	bi-weeklyDTX
<u>G080M</u>	CPT-11 + MMC
<u>G090H</u>	AP(ADM + CDDP)
<u>G100M</u>	PLD
<u>G110H</u>	CPT-11 + CDDP
<u>G120M</u>	MA
<u>G130M</u>	MEA
<u>G131M</u>	mMEA
<u>G140M</u>	ACT-D単独
<u>G150M</u>	CBDCA+PLD
<u>G160M</u>	PLD+Bev
<u>G170L</u>	Topo単剤
<u>G180L</u>	Topo+mBev
<u>G190L</u>	wPTX+mBev
<u>G200M</u>	GCB+mBev
<u>G210M</u>	TCB+mBev (1サイクル目)
<u>G211M</u>	TCB+mBev (2-6サイクル目)
<u>G212S</u>	TCB+mBev (7サイクル目以降)
<u>G220M</u>	dose-dence TC
<u>G230L</u>	Topo+PTX+mBev
<u>G240H</u>	CDDP+PTX+mBev
<u>G250S</u>	MTX単独療法
<u>G260S</u>	MTX単回投与法

レジメン記入フォーマット

登録番号 G010M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

weeklyTC

婦人科癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

パクリタキセル

60

 mg/m^2

点滴静注

day1.8.15

カルボプラチン

AUC2

2 mg

点滴静注

day1.8.15

投与周期 28日

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G020M

診療科		申
レジメン名	bi-weeklyDC AUC2	
対象疾患名	婦人科癌	
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行	
治療内容		

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	30	mg/m ²	点滴静注	day1.15
カルボプラチン	AUC2	mg	点滴静注	day1.15

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G030M

診療科	
レジメン名	bi-weeklyDC AUC3
対象疾患名	婦人科癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	30	mg/m ²	点滴静注	day1.15
カルボプラチン	AUC3	mg	点滴静注	day1.15

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G040M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

tri-weeklyTC	
婦人科癌	
☐ 術前	☐ 術後補助
☐ 再発・進行	

申請醫師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G050M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬、保湿剤

申請医師

備考欄

tri-weeklyDC

婦人科癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドセタキセル

75

$$\text{mg/m}^2$$

点滴静注

day1

カルボプラチ

JC5

mg

点滴静注

day1

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994
...	...	...	...	...	...

--	--

[illegible][illegible]

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期 21日

休藥

21 目

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G060L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

weeklyPTX

婦人科癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

パクリタキセル

80

 mg/m^2

点滴静注

day1,8,15

投与周期 **21日**

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号	G070L
------	-------

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬

申請醫師

備考欄

bi-weeklyDTX

婦人科癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドセタキセル

40

mg/m²

点滴静注

day1.15

投与周期
休薬

28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G080M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

CPT-11+MMC

婦人科癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イリノテカン

100

 mg/m^2

点滴静注

day	1	8	15
day1,8,15			

マイトマイシン

10

 mg/m^2

点滴静注

day1

[illegible]

[illegible][illegible]

--	--

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

登録番号 G090H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキソルビシン	45	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●							
3	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	100	mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	45	mg/m ²	点滴静注	30分	●							
6	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	120分	●							
7	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	120分	●							
8	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●							
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間		● 1						
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間		● 2						
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間		● 3						
	アブレピタント	125/80	mg	内服		● (125)	● (80)	● (80)					
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 G100M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、透析
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の軽減	点眼薬、点耳薬
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、透析
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の軽減	点眼薬、点耳薬

申請医師

備考欄

PLD

婦人科癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドキシル

50

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 **28日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

CPT-11+CDDP
婦人科癌

申請医師

備考欄

登録番号 G110H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルール	点滴時間	Day(0)	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(8)	Day(15)	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 		●				●	●	
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	15分		●						
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注							●	●	
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分						●	●	
3	生食500mL	500	mL	点滴静注			●				●	●	
	イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	120分		●				●	●	
4	生食500mL	400	mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	180分		●						
5	ソルデム3A	500	mL	点滴静注			●						
	フロセミド	1	mL	点滴静注	180分		●						
6	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間		●						
7	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間	●		● 1					
8	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間	●		● 2					
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	5時間			● 3					
	アブレピタント	125/80	mg	内服			● (125)	● (80)	● (80)				
	デカドロン	8	mg	内服				●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 G120M

診療科	
レジメン名	MA
対象疾患名	婦人科癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メソトレキセート	0.4	mg/Kg	点滴静注	day1-4
コスメゲン	10	μ g/Kg	点滴静注	day1-4

投与周期	14日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G130M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

MEA
婦人科癌
☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メソトレキセート	150	mg/body	点滴静注	day1
メソトレキセート	300	mg/body	点滴静注	day1
コスメゲン	0.5	mg/body	点滴静注	day1-5
ラステット	100	mg/body	点滴静注	day1-5

投与周期 19日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(0)	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×		●						
2	生食	500	mL	点滴静注			●						
	メイロン7%	40	mL	点滴静注	3時間		●						
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
	生食	50	mL	点滴静注				●	●	●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●	●	●	●		
4	生食	20	mL	静脈注射			●						
	メソトレキセート	150	mg	静脈注射			●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	メソトレキセート	300	mg	点滴静注	4時間		●						
6	生食	100	mL	点滴静注			●	●	●	●	●		
	コスメゲン	0.5	mg	点滴静注			●	●	●	●	●		
			血管痛のない範囲で全開自然滴下まで可										
7	生食	500	mL	点滴静注			●	●	●	●	●		
	ラステット	100	mg	点滴静注	2時間		●	●	●	●	●		
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●						
	メイロン7%	40	mL	点滴静注	3時間	●	●						
9	生食	100	mL	点滴静注	30分			●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 G131M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

mMEA
婦人科癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メソトレキセート	0.4	mg/Kg	点滴静注	day1
コスメゲン	10	μ g/Kg	点滴静注	day1-5
ラスデット	100	mg/body	点滴静注	day1-5

投与周期	19日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ 生食 デカドロン	0.75 50 6.6	mg mL mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	15分 15分	● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●			
3	生食 メソトレキセート	20 0.4	mL mg/Kg	静脈注射 静脈注射		● ●							
4	生食 コスメゲン	100 10	mL μ g/Kg	点滴静注 点滴静注		● ●	● ●	● ●	● ●	● ●			
			血管痛のない範囲で全開自然滴下まで可										
5	生食 ラステット	500 100	mL mg	点滴静注 点滴静注	 2時間	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●			
6	生食	100	mL	点滴静注	30分		●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 G140M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

ACT-D单独

奇胎後hCG存続症

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

コスメゲン

0.5

mg/day

点滴静注

day1-5

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G150M

診療科	
レジメン名	CBDCA+PLD
対象疾患名	卵巣癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキシル	30	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC5	mg	点滴静注	day1

投与周期	28日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G160M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

PLD+Bev

卵巢癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ドキシル

40

$$\text{mg/m}^2$$

点滴静注

day1

アバスチン

10

mg/kg

点滴静注

day 1	
day 1,15	

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **G170L**

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Topo单剂

卵巢癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

ハイカムチン

1.5 mg/m² mg/m^2

点滴静注

day1-5

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G180L

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Topo+mBev

卵巢癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

单位

投与経路

投与日

ハイカムチン

1.25 mg/m² mg/m^2

点滴静注

day1-5

アバスチン

15	mg/kg
----	-------

mg/kg

点滴静注

day1

投与周期 21日

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 G190L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬

wPTX+mBev	
卵巣癌	
☐ 術前	☐ 術後補助
☐ 再発・進行	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22
アバステン	10	mg/kg	点滴静注	day1,15

投与周期	28日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day(22)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●	●	●	●			
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●			
3	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	アバステン	10	mg/kg	点滴静注	90→30分	●		●				
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●	●	●	●			
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●	●	●			
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 G200M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

GCB+mBev

卵巣癌

☐術前
☐術後補助
☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8
カルボプラチン	AUC4	mg	点滴静注	day1
アバスチン	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●				
	生食	50	mL	点滴静注	15分			●				
3	生食	100	mL	点滴静注		●						
	アバスチン	15	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●				
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC4	mg	点滴静注	60分	●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					

レジメン記入フォーマット

登録番号 G210M

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

TCB+mBev (1サイクル目)

卵巣癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		● (125)	● (80)					

レジメン記入フォーマット

登録番号 G211M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

TCB+mBev (2-6サイクル目)

卵巣癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1
アバスチン	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	点滴時間	●						
2	生食	50	mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●						
	アバスチン	15	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
5	5%糖液	250	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
6	生食	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●						
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					

レジメン記入フォーマット

登録番号 G212S

診療科	
レジメン名	TCB+mBev (7サイクル目以降)
対象疾患名	卵巣癌
治療目的	☐ 術前 ☐ 術後補助 ☐ 再発・進行
治療内容	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
アバステン	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **G220M**

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

☐術前
 ☐術後補助
 ☐再発・進行

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●		●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注		●		●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●		●	●			
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●		●	●			
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●						
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●		●	●			
	バクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●		●	●			
5	生食	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●		●	●			
	アプレピタント	125/80	mg	内服		●(125)	●(80)					

レジメン記入フォーマット

登録番号 G230L

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

Topo+PTX+mBev

子宮頸癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

ハイカムチン

0.75

 mg/m^2

点滴静注

day1-3

パクリタキセル

175

 mg/m^2

点滴静注

day1

アバスチン

15

mg/kg

点滴静注

day1

投与周期

21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●					
	デカドロン	16.5	mg	点滴静注		●	●					
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●					
	ハイカムチン	0.75	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●					
5	生食	100	mL	点滴静注		●						
	アバスチン	15	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●						

登録番号	G240H
------	-------

申請醫師

備考欄

CDDP+PTX+mBev

子宮頸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

標準投与量 単位

投与経路

投与日

day1

パクリタキセル

175	mg/m ²
-----	-------------------

5	mg/kg
---	-------

点滴静注

day1

--	--

--	--

--	--

--	--

投与周期

21日

休藥

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	120分	●						
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●						
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●	●					
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	20	mL	点滴静注	120分	●	●					
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注		●						
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●						
5	生食	500	mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	180分	●						
6	生食	400	mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	120分	●						
7	生食	100	mL	点滴静注		●						
	アバスチン	15	mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
8	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●						
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●						
10	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分	●						
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	120分		●					
12	ソルラクト	500	mL	点滴静注	120分		●					
	アプレピタント	125/80		内服		●125	●80					
	レスタミンコーワ錠	50	mg			●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 **G250S**

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

MTX单独療法

侵入奇胎・臨床的侵入奇胎・奇胎後hCG存続症

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

メソトレキセート

0.4

4 mg/Kg

肌肉注射

day1-5

投与周期 14日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 **G260S**

診療科	
レジメン名	
対象疾患名	
治療目的	
治療内容	

申請医師

備考欄

MTX单回投与法

異所性妊娠

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

薬品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

メソトレキセート

50

 mg/m^2

肌肉注射

day1

投与周期 7日

休薬

[illegible]