

code	レジメン名
G010M	weeklyTC
G020M	bi-weeklyDC AUC2
G030M	bi-weeklyDC AUC3
G040M	tri-weeklyTC
G050M	tri-weeklyDC
G060L	weeklyPTX
G070L	bi-weeklyDTX
G080M	CPT-11 + MMC
G090H	AP(ADM + CDDP)
G100M	PLD
G110H	CPT-11 + CDDP
G120M	MA
G130M	MEA
G131M	mMEA
G140M	ACT-D単独
G150M	CBDCA+PLD
G160M	PLD+Bev
G170L	Topo単剤
G180L	Topo+mBev
G190L	wPTX+mBev
G200M	GCB+mBev
G210M	TCB+mBev (1サイクル目)
G211M	TCB+mBev (2-6サイクル目)
G212S	TCB+mBev (7サイクル目以降)
G220M	dose-dence TC
G230L	Topo+PTX+mBev
G240H	CDDP+PTX+mBev
G250S	MTX単独療法
G260S	MTX単回投与法

レジメン記入フォーマット

登録番号 G090H

診療科 申請医師 備考欄
 レジメン名 AP(ADM+CDDP)
 対象疾患名 婦人科癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキソルビシン	45	mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	ソルラクト	500 mL	点滴静注	120分	●							
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	120分	●							
3	生食	100 mL	点滴静注	30分	●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ		●							
6	生食	100 mL	点滴静注		●							
	ドキソルビシン	45 mg/m ²	点滴静注	30分	●							
7	生食	400 mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注	120分	●							
8	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	120分	●							
9	ソルラクト	500 mL	点滴静注	120分	●							
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	5時間		●1						
11	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	5時間		●2						
12	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	5時間		●3						
	デカドロン	8 mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 | G110H

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
イリノテカン	60	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 28日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルー	点滴時間	Day(0)	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(8)	Day(15)	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	30分		●				●	●	
2	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注			●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分		●						
3	生食	50 mL	フラッシュ			●						
4	生食	50 mL	点滴静注							●	●	
	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注							●	●	
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注	15分						●	●	
5	生食500mL	500 mL	点滴静注			●				●	●	
	イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	120分		●				●	●	
6	生食500mL	400 mL	点滴静注			●						
	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	180分		●						
7	ソルデム3A	500 mL	点滴静注			●						
	フロセミド	1 mL	点滴静注	180分		●						
8	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	5時間		●						
9	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	5時間	●		● 1					
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	5時間	●		● 2					
11	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	5時間			● 3					
	デカドロン	8 mg	内服				●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 G130M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

MEA	
婦人科癌	
<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行	

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メトレキセート	150	mg/body	点滴静注	day1
メトレキセート	300	mg/body	点滴静注	day1
コスメゲン	0.5	mg/body	点滴静注	day1-5
ラステット	100	mg/body	点滴静注	day1-5

投与周期 19日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(0)	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	3時間		●						
2	生食	500	mL	点滴静注			●						
	メイロン7%	40	mL	点滴静注	3時間		●						
3	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
	生食	50	mL	点滴静注				●	●	●	●		
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●	●	●	●		
4	生食	20	mL	静脈注射			●						
	メトレキセート	150	mg	静脈注射			●						
5	生食	500	mL	点滴静注			●						
	メトレキセート	300	mg	点滴静注	4時間		●						
6	生食	100	mL	点滴静注			●	●	●	●	●		
	コスメゲン	0.5	mg	点滴静注			●	●	●	●	●		
				血管痛のない範囲で全開自然滴下まで可									
7	生食	500	mL	点滴静注			●	●	●	●	●		
	ラステット	100	mg	点滴静注	2時間		●	●	●	●	●		
8	生食	500	mL	点滴静注		●	●						
	メイロン7%	40	mL	点滴静注	3時間	●	●						
9	生食	100	mL	点滴静注	30分			●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 G131M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

mMEA
婦人科癌

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
メソトレキセート	0.4	mg/Kg	点滴静注	day1
コスメゲン	10	μg/Kg	点滴静注	day1-5
ラストテツ	100	mg/body	点滴静注	day1-5

投与周期 19日
休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day(5)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
	生食	50	mL	点滴静注			●	●	●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●	●			
3	生食	20	mL	静脈注射		●							
	メソトレキセート	0.4	mg/Kg	静脈注射		●							
4	生食	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
	コスメゲン	10	μg/Kg	点滴静注		●	●	●	●	●			
					血管痛のない範囲で全開自然滴下まで可								
5	生食	500	mL	点滴静注		●	●	●	●	●			
	ラストテツ	100	mg	点滴静注	2時間	●	●	●	●	●			
6	生食	100	mL	点滴静注	30分		●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 G190L

診療科		申請医師	
レジメン名	wPTX+mBev		
対象疾患名	卵巣癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22
ベバシズマブBS	10	mg/kg	点滴静注	day1,15

投与周期	28日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day(22)	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●	●			
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●	●			
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●	●	●	●			
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●	●	●	●			
3	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ベバシズマブBS	10	mg/kg	点滴静注	90→30分	●		●				
4	5%糖液	250	mL	点滴静注		●	●	●	●			
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●	●	●			
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 G210M

診療科		申請医師	
レジメン名	TCB+mBev (1サイクル目)		
対象疾患名	卵巣癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		
治療内容			

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1

投与周期	21日
休薬	

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()					
					●						
1	生食	100 mL	点滴静注	15分	●						
2	生食	50 mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注		●						
	ファモチジン	20 mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50 mL	フラッシュ		●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ		●						
6	5%糖液	250 mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	180分	●						
7	生食	250 mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6 mg	点滴静注	60分	●						
	レスタミンコーワ錠	50 mg	内服		●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 G211M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 TCB+mBev (2-6サイクル目)

対象疾患名 卵巣癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1
ベバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day()					
					●						
1	生食	100 mL	点滴静注	×	●						
2	生食	50 mL	点滴静注		●						
	デカドロン	6.6 mg	点滴静注		●						
	ファモチジン	20 mg	点滴静注	15分	●						
3	生食	50 mL	フラッシュ		●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ		●						
6	生食	100 mL	点滴静注		●						
	ベバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
7	5%糖液	250 mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	180分	●						
8	生食	250 mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6 mg	点滴静注	60分	●						
	レスタミンコーワ錠	50 mg	内服		●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 G220M

診療科
 レジメン名 dose-dence TC
 対象疾患名 卵巣癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行
 治療内容

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	day1

投与周期 21日
 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●	●				
1	生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●				
2	生食	50	mL	点滴静注		●	●	●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注		●	●	●				
	ファモチジン	20	mg	点滴静注	15分	●	●	●				
3	生食	50	mL	フラッシュ		●						
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注	30分	●						
5	生食	50	mL	フラッシュ		●						
6	5%糖液	250	mL	点滴静注		●	●	●				
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	60分	●	●	●				
7	生食	250	mL	点滴静注		●						
	カルボプラチン	AUC6	mg	点滴静注	60分	●						
	レスタミンコーワ錠	50	mg	内服		●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 G240H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 CDDP+PTX+mBev

対象疾患名 子宮頸癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
シスプラチン	50	mg/m ²	点滴静注	day1
パクリタキセル	175	mg/m ²	点滴静注	day1
ペバシズマブBS	15	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ル-ト	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()				
1	生食	100 mL	点滴静注	120分	●						
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	120分	●						
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●	●					
	硫酸Mg補正液(1mEq/mL)	20 mL	点滴静注	120分	●	●					
4	生食	50 mL	点滴静注		●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注		●						
	ファモチジン	20 mg	点滴静注	15分	●						
5	生食	50 mL	フラッシュ		●						
6	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注		●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注	30分	●						
7	生食	50 mL	フラッシュ		●						
8	生食	500 mL	点滴静注		●						
	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	180分	●						
9	生食	400 mL	点滴静注		●						
	シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注	120分	●						
10	生食	100 mL	点滴静注		●						
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	点滴静注	90→30分	●						
11	ソルラクト	500 mL	点滴静注	120分	●						
12	ソルラクト	500 mL	点滴静注	120分	●						
13	ソルラクト	500 mL	点滴静注	120分	●						
14	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	120分		●					
15	ソルラクト	500 mL	点滴静注	120分		●					
	レスタミンコーワ錠	50 mg			●						

