

code	レジメン名
S010H	S-1 + CDDP
S020L	S-1+DTX (進行再発)
S040L	weekly PTX
S060M	biweekly CPT-11
S080M	CPT-11単剤
S090H	XP + Trastuzumab(初回)
S091H	XP + Trastuzumab(2回目以降)
S100S	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(初回)
S101S	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(2回目以降)
S110L	nab-PTX
S120H	SP+Trastuzumab (初回)
S121H	SP+Trastuzumab (2回目以降)
S130M	胃癌SOX
S140S	Ramucirumab
S150L	Ramucirumab+PTX
S160M	胃癌XELOX
S170S	Nivolumab単剤(胃癌)(2W)
S171S	Nivolumab単剤(胃癌)(4W)
S180M	XELOX + Trastuzumab(初回)
S181M	XELOX + Trastuzumab (2回目以降)
S190L	Weekly nab-PTX
S200M	SOX + Trastuzumab (初回)
S201M	SOX + Trastuzumab (2回目以降)
S210M	mFOLFOX6(胃癌)
S220L	Ramucirumab+nab-PTX
S230L	S-1+DTX(術後補助)
S240H	Trastuzumab Deruxtecan(胃癌)
S250M	Nivolumab+SOX
S260M	Nivolumab+XELOX
S270M	Nivolumab+FOLFOX
S280H	Zolbetuximab+XELOX(初回)
S281H	Zolbetuximab+XELOX(2回目以降)
S290H	Zolbetuximab+mFOLFOX6(初回)
S291H	Zolbetuximab+mFOLFOX6(2回目以降)
S300M	Pembrolizumab+XELOX
S330M	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (初回)
S331M	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (2回目以降)
S332S	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (OX抜き)(2回目以降)
S340M	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (初回)
S341M	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (2回目以降)
S342S	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (OX抜き)(2回目以降)

レジメン記入フォーマット

登録番号

診療科
 レジメン名
 申請医師
 対象疾患名
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴	8
	S-1	80	mg/m ²	内服	1-21

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9-10)	Day(11)	Day(12-21)	Day(22-35)	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	2時間		●						
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50 mL	フラッシュ			●						
5	パロノセトロンバック	0.75 mg	点滴静注			●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分		●						
6	生食	50 mL	フラッシュ			●						
7	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	400 mL	点滴静注	2時間		●						
8	ソルラクト	500 mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間		●						
9	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間			●					
	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間			●					
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間			●					
	S-1	80 mg/m ²	内服		●	●	●	●	●			
	デカドロン	8 mg					●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 S090H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 XP+Trastuzumab (初回)

対象疾患名 進行胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服	1-14

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
8	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S091H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 XP+Trastuzumab (2回目以降)

対象疾患名 進行胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服	1-14

投与周期 21日

休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
8	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S120H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 SP+Trastuzumab (初回)

対象疾患名 胃癌 (HER2-positive)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg/m ²	内服	day1-14
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg		day1

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
					●							
1	生食	100 mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンバツ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ		●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8 mg/kg	点滴静注	90分	●							
8	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400 mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120 mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S121H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 SP+Trastuzumab(2回目以降)

対象疾患名 胃癌(HER2-positive)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg/m ²	内服	day1-14
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	6	mg/kg		day1

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(4-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパック	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ		●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6 mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
8	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400 mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120 mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S210M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 mFOLFOX6(胃癌)

対象疾患名 進行再発胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2,3)	Day()					
						●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	ポート	 	●							
2	パロノセトロンバック	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3-1	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
3-2	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
4	5FU	400	mg/m ²	ポート		●							
	生食	50	mL	ポート	5分	●							
5	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●	●						
	ヘパリンナトリウム注M	5000	単位	ポート		●	●						
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S240H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Trastuzumab Deruxtecan(胃癌)

対象疾患名 HER2陽性の手術不能又は再発胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
エンハーツ	6.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day(1)	Day(2-4)	Day()					
						●	●	●	●	●	●	●	●
1	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	5%糖液	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.32	mL/kg	点滴静注		●							
	エンハーツ	6.4	mg/kg	点滴静注	90分	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●						

投与開始日
 服薬指導 有 無

化学療法委員会承認月日 登録年月日
 削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 S270M

診療科 申請医師

レジメン名 Nivolumab+FOLFOX

対象疾患名 Her2陰性切除不能進行再発胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()					
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
5-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
6	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	5分	●							
7	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注M	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 | S290H

診療科 申請医師
 レジメン名 Zolbetuximab+mFOLFOX6(初回)
 対象疾患名 HER2陰性 CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ピロイ	800	mg/m ²	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 | 14日

休薬 |

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()				
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	ポララミン	5	mg	shot	shot	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	生食	360	mL/m ²	点滴静注		●							
	注射用水	40	mL/m ²	点滴静注		●							
	ピロイ	800	mg/m ²	点滴静注	院内プロトコル参照	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
8	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	5分	●							
9	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●							
10	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S291H

診療科 申請医師

レジメン名 Zolbetuximab+mFOLFOX6(2回目以降)

対象疾患名 HER2陰性 CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ピロイ	400	mg/m ²	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()				
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	ポララミン	5	mg	shot	shot	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	生食	180	mL/m ²	点滴静注		●							
	注射用水	20	mL/m ²	点滴静注		●							
	ピロイ	400	mg/m ²	点滴静注	院内プロトコル参照	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
8	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	5分	●							
9	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●							
10	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S310H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Pembrolizumab + SP

対象疾患名 HER2陰性 進行再発胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100 mL	点滴静注	30分	●							
2	生食	100 mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	●							
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
4	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
5	生食	50 mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンパッチ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50 mL	フラッシュ		●							
8	シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400 mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80 mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					

