

code	レジメン名
S010H	S-1 + CDDP
S020L	S-1+DTX (進行再発)
S040L	weekly PTX
S060M	biweekly CPT-11
S080M	CPT-11単剤
S090H	XP + Trastuzumab(初回)
S091H	XP + Trastuzumab(2回目以降)
S100S	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(初回)
S101S	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(2回目以降)
S110L	nab-PTX
S120H	SP+Trastuzumab (初回)
S121H	SP+Trastuzumab (2回目以降)
S130M	胃癌SOX
S140S	Ramucirumab
S150L	Ramucirumab+PTX
S160M	胃癌XELOX
S170S	Nivolumab単剤(胃癌)(2W)
S171S	Nivolumab単剤(胃癌)(4W)
S180M	XELOX + Trastuzumab(初回)
S181M	XELOX + Trastuzumab (2回目以降)
S190L	Weekly nab-PTX
S200M	SOX + Trastuzumab (初回)
S201M	SOX + Trastuzumab (2回目以降)
S210M	mFOLFOX6(胃癌)
S220L	Ramucirumab+nab-PTX
S230L	S-1+DTX(術後補助)
S240H	Trastuzumab Deruxtecan(胃癌)
S250M	Nivolumab+SOX
S260M	Nivolumab+XELOX
S270M	Nivolumab+FOLFOX
S280H	Zolbetuximab+XELOX(初回)
S281H	Zolbetuximab+XELOX(2回目以降)
S290H	Zolbetuximab+mFOLFOX6(初回)
S291H	Zolbetuximab+mFOLFOX6(2回目以降)
S300M	Pembrolizumab+XELOX
S330M	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (初回)
S331M	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (2回目以降)
S332S	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (OX抜き)(2回目以降)
S340M	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (初回)
S341M	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (2回目以降)
S342S	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (OX抜き)(2回目以降)

レジメン記入フォーマット

登録番号 S010H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

S-1+CDDP


進行胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴	8
	S-1	80	mg/m ²	内服	1-21

投与周期 35日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day(8)	Day(9-10)	Day(11)	Day(12-21)	Day(22-35)	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注			●						
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50	mL	フラッシュ			●						
5	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注			●						
	アロカリス	235	mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分		●						
6	生食	50	mL	フラッシュ			●						
7	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	400	mL	点滴静注	2時間		●						
8	ソルラクト	500	mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間		●						
9	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間			●					
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間			●					
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間			●					
	S-1	80	mg/m ²	内服		●	●	●	●	●			
	デカドロン	8	mg					●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 S020L

診療科	
レジメン名	S-1+DTX(進行再発)
対象疾患名	進行胃癌
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師


備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴	1
S-1	60	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 **21日**

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day(15-21)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	50	mL	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	60分	●							
	S-1	60	mg/m ²	内服		●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S040L

診療科	
レジメン名	Weekly PTX
対象疾患名	進行胃癌 2nd-3rd line
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 28日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S060M

診療科		
レジメン名	biweekly CPT-11	
対象疾患名	進行再発胃癌	
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

申請医師

備考欄

[illegible]

投与周期 28日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S080M

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
-----	-------	-------	------	------

申請医師

備考欄

CPT-11单剂

進行・再発胃癌、大腸癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

イリノテカン

60

 mg/m^2

点滴

day 1, 8, 15

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

XP+Trastuzumab(初回)

進行胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

S090H

治療内容


薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服	1-14

投与周期

21日

休薬

7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
8	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

登録番号 S091H

XP+Trastuzumab(2回目以降)
進行胃癌
□術前 □術後補助 ■再発・進行

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服	1-14

投与周期

21日

休薬

7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
8	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カペシタビン	2000	mg/m ² /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S100S

診療科

申請医師

備考欄

レジメン名

SOX + Trastuzumab (OX抜き)(初回)

对象疾患名

進行胃癌

治療目的

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴	day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S101S

診療科		申請医師
レジメン名	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(2回目以降)	
対象疾患名	進行胃癌	
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行	

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴	day1

投与周期 21日

休薬

--

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S110L

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

nab-PTX

胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路 投与日

投与日

アブラキサン

260

 mg/m^2

点滴静注

day1

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

登録番号 S120H

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg/m ²	内服	day1-14
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg		day1

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパッチ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
8	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120	mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S121H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

SP+Trastuzumab(2回目以降)

胃癌(HER2-positive)

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg/m ²	内服	day1-14
シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	6	mg/kg		day1

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(4-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	2時間	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
8	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120	mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S130M

診療科	
レジメン名	胃癌SOX
対象疾患名	進行再発 切除不能胃癌
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請醫師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg	内服	day1-14
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S140S

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Ramucirumab

治癒切除不能な進行・再発胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☐再発・進行

藥品名

標準投与量

單位

投与経路

投与日

サイラムザ

8	mg/kg
---	-------

3 mg/kg

点滴静注

day 1,15

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S150L

診療科	
レジメン名	Ramucirumab+PTX
対象疾患名	治癒切除不能な進行・再発胃癌
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	サイラムザ	8	mg/kg	点滴静注	day1,15
	パクリタキセル	80	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 28日

休薬 [illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S160M

診療科

--

申請醫師

備考欄

レジメン名	胃癌XELOX
-------	---------

对象疾患	胃癌
------	----

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S170S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab	単剤(胃癌)(2W)
-----------	------------

化学療法後に増悪した切除不能進行・再発の胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

240

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 14日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S171S

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab	単剤(胃癌)(4W)
-----------	------------

化学療法後に増悪した切除不能進行・再発の胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

オプジーボ

480

mg/body

点滴静注

day1

投与周期 28日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S180M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

XELOX + Trastuzumab(初回)

切除不能進行再発HER2陽性胃癌

☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

トラスツズマブBS

8

mg/kg

点滴静注

1

オキサリプラチン

130

 mg/m^2

点滴静注

1

カペシタビン

2000

 mg/m^2

内服

1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S181M

診療科	
レジメン名	XELOX + Trastuzumab (2回目以降)
対象疾患名	切除不能進行再発HER2陽性胃癌
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
------	-----	-------	----	------	-----

トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S190L

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の軽減	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	痔瘻	痔瘻	症状の軽減	手術療法
婦人科	月経不調	月経不調	症状の軽減	ホルモン療法
泌尿科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	内服薬、食事療法
眼科	近視	近視	視力の矯正	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	症状の軽減	点眼薬、内服薬
皮膚科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	症状の軽減	点鼻薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立腺がん	がんの予防	手術療法
眼科	緑内障	緑内障	視力の維持	点眼薬
耳鼻科	聴覚障害	聴覚障害	聴力の向上	補聴器
皮膚科	乾癬	乾癬	症状の軽減	外用薬、内服薬
小児科	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	症状の軽減	外用薬、内服薬
内科	高血圧	高血圧	血圧のコントロール	内服薬
外科	胆石症	胆石症	症状の軽減	手術療法
婦人科	子宮頸がん	子宮頸がん	がんの予防	ワクチン接種
泌尿科	前立腺がん	前立		

申請医師

備考欄

Weekly nab-PTX

切除不能進行再発胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

藥品名

標準投与量 単位

單位

投与経路

投与日

アブラキサン

100

mg/m²

点滴静注

day1,8,15

投与周期 28日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S200M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

SOX + Trastuzumab (初回)	
------------------------	--

切除不能進行再発HER2陽性胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

トラスツズマブBS

8	mg/kg
---	-------

 mg/m^2

点滴静注

1	
---	--

S-1

80	mg/m ²
----	-------------------

[illegible]

--	--

--	--

投与周期 21日

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S201M

診療科

レジメン名

对象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

SOX + Trastuzumab (2回目以降)	
---------------------------	--

切除不能進行再発HER2陽性胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

治療内容

藥品名

標準投与量

单位

投与経路

投与日

トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	1
S-1	80	mg/m ²	内服	1-14

投与周期 **21日**

休薬

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S210M

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2,3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	ポート		●							
2	パロノセトロンバック	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3-1	レボホリナート	200	mg/m ²	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
3-2	オキサリプラチン	85	mg/m ²	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
4	5FU	400	mg/m ²	ポート		●							
	生食	50	mL	ポート	5分	●							
5	5FU	2400	mg/m ²	ポート		●	●						
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	ポート		●	●						
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S220L

診療科		申請医師	
レジメン名	Ramucirumab+nab-PTX		
対象疾患名	治癒切除不能な進行・再発胃癌(アルコール不耐患者)		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	サイラムザ	8	mg/kg	点滴静注	day1,15
	nab-PTX	100	mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

投与周期 **28日**

休藥

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S230L

診療科	
レジメン名	S-1+DTX (術後補助)
対象疾患名	胃癌StageⅢ術後補助療法
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 再発・進行

申請医師

備考欄

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
Cycle 1				
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
Cycle 2-7				
ドセタキセル	40	mg/m ²	点滴静注	day1
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14
Cycle 8-				
S-1	80	mg/m ²	内服	day1-28

投与周期	21日	(Cycle 1-7)
	42日	(Cycle 8-)

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S240H

診療科	レジメン名	対象疾患名	治療目的	治療内容
皮膚科	アトピー性皮膚炎	アトピー性皮膚炎	症状の改善	外用薬、内服薬
小児科	喘息	喘息	症状の改善	吸入薬、内服薬
内科	糖尿病	糖尿病	血糖値のコントロール	内服薬、食事療法
外科	骨折	骨折	骨折の治癒	手術、固定
産婦人科	妊娠	妊娠	健康な赤ちゃんの誕生	定期的な検診
泌尿器科	腎臓病	腎臓病	腎機能の維持	食事療法、透析
神経科	脳卒中	脳卒中	神経機能の回復	薬物療法、リハビリテーション
眼科	近視	近視	視力の改善	眼鏡、コンタクト
耳鼻科	中耳炎	中耳炎	炎症の抑制	点眼薬、点耳薬
皮膚科	皮膚がん	皮膚がん	がんの切除	手術
小児科	小児がん	小児がん	がんの切除	手術、化学療法
内科	がん	がん	がんの切除	手術、化学療法
外科	がん	がん	がんの切除	手術
産婦人科	がん	がん	がんの切除	手術
泌尿器科	がん	がん	がんの切除	手術
神経科	がん	がん	がんの切除	手術
眼科	がん	がん	がんの切除	手術
耳鼻科	がん	がん	がんの切除	手術

申請医師

備考欄

Trastuzumab Deruxtecan(胃癌)

HER2陽性の手術不能又は再発胃癌

□術前 □術後補助 ■再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
-----	-------	----	------	-----

エンハーツ	6.4	mg/kg	点滴静注	day1

投与周期 **21日**

[illegible]

投与開始日

服藥指導

有口

無□

化学療法委員会承認月日

登録年月日

削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 S250M

診療科		申請医師	
レジメン名	Nivolumab+SOX		
対象疾患名	HER2陰性の切除不能進行再発胃癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1
	S-1	80-120	mg	内服	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	ml	点滴静注		●							
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
5	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	2時間	●							
	S-1	80-120	mg	朝夕食後									

レジメン記入フォーマット

登録番号 S260M

診療科 申請医師
 レジメン名 Nivolumab+XELOX
 対象疾患名 HER2陰性の切除不能進行再発胃癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オブジーボ	360	mg/body	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S270M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 Nivolumab+FOLFOX

対象疾患名 Her2陰性切除不能進行再発胃癌

治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
5-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
6	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	5分	●							
7	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 S280H

診療科 [] 申請医師 []
 レジメン名 Zolbetuximab+XELOX(初回)
 対象疾患名 HER2陰性 CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ビロイ	800	mg/m ²	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S281H

診療科 [] 申請医師 []
 レジメン名 Zolbetuximab+XELOX(2回目以降)
 対象疾患名 HER2陰性 CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ビロイ	600	mg/m ²	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S290H

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ビロイ	800	mg/m ²	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	ポララミン	5	mg	shot	shot	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	生食	500	mL	点滴静注		●							
	注射用水	40	mL/m ²	点滴静注		●							
	ビロイ	800	mg/m ²	点滴静注	院内プロトコル参照	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
8	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	5分	●							
9	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●							
10	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S291H

診療科

申請医師

レジメン名

対象疾患名

治療目的

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ビロイ	400	mg/m ²	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	ポララミン	5	mg	shot	shot	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	注射用水	20	mL/m ²	点滴静注		●							
	ビロイ	400	mg/m ²	点滴静注	院内プロトコル参照	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
7-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
8	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	5分	●							
9	5FU	2400	mg/m ²	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●							
10	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S300M

診療科 申請医師
 レジメン名 Pembrolizumab+XELOX
 対象疾患名 Trastuzumab2陰性の切除不能進行再発胃癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

診療科

レジメン名

対象疾患名

治療目的

申請医師

備考欄

登録番号 S310H

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日 休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-3)	Day(4)	Day(5-14)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
5	生食	50	mL	フラッシュ		●							
6	パロノセトロンパッチ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
7	生食	50	mL	フラッシュ		●							
8	シスプラチン	60	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80	mg/m ²	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 S320M

診療科 [] 申請医師 []
レジメン名 Pembrolizumab + SOX
対象疾患名 HER2陰性 進行再発胃癌
治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S330M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (初回)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S331M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (2回目以降)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット

登録番号 S332S

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + XELOX (OX抜き) (2回目以降)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
	カペシタビン	2000	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

[illegible]

レジメン記入フォーマット




登録番号 S340M

診療科 申請医師
 レジメン名 Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (初回)
 対象疾患名 HER2陽性 進行再発胃癌
 治療目的 ☐術前 ☐術後補助 ☒再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注		●							
2	生食	100	ml	点滴静注		●							
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
6	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	2時間	●							
	S-1	80	mg/m ²	内服									

レジメン記入フォーマット

登録番号 S341M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (2回目以降)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	×	●							
2	生食	100	ml	点滴静注		●							
	キイトルーダ [®]	200	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	×	●							
4	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	15分	●							
5	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
6	5%糖液	500	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	130	mg/m ²	点滴静注		●							
	デカドロン	3.3	mg	点滴静注	2時間	●							
	S-1	80	mg/m ²	内服		—————▶							

レジメン記入フォーマット

登録番号 S342S

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab + Trastuzumab + SOX (OX抜き) (2回目以降)		
対象疾患名	HER2陽性 進行再発胃癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	day1
	S-1	80	mg/m ²	内服	day1-14

投与周期 21日

[illegible]