

| code | レジメン名 |
|-----------------------|-----------------------------|
| D020S | Nivolumab単剤(悪性黒色腫)(2W) |
| D021S | Nivolumab単剤(悪性黒色腫)(4W) |
| D030S | Ipilimumab+Nivolumab(悪性黒色腫) |
| D040H | DTIC |

レジメン記入フォーマット

登録番号 D020S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab単剤(悪性黒色腫)(2W)

悪性黒色腫

術前 術後補助 再発・進行

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-------|-------|---------|------|------|
| オブジーボ | 240 | mg/body | 点滴静注 | day1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投与周期 14日

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|--------|-----|---------|-------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | オブジーボ | 240 | mg/body | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

投与開始日
服薬指導

有 無

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

レジメン記入フォーマット

登録番号 D021S

診療科
レジメン名
対象疾患名
治療目的
治療内容

申請医師

備考欄

Nivolumab単剤(悪性黒色腫)(4W)

悪性黒色腫

術前 術後補助 再発・進行

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-------|-------|---------|------|------|
| オブジーボ | 480 | mg/body | 点滴静注 | day1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投与周期 28日

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|--------|-------------|-------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 100 mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | オブジーボ | 480 mg/body | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

投与開始日
服薬指導

化学療法委員会承認月日

登録年月日
削除年月日

有 無

レジメン記入フォーマット

登録番号 D040H

診療科
 レジメン名
 対象疾患名
 治療目的
 治療内容

申請医師

備考欄

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|--------|-------|-------------------|------|------|
| ダカルバジン | 1000 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投与周期 21日

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2-3) | Day(4) | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|------------|--------|-------------------|-------|--------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| 2 | パロノセトロンバッグ | 0.75 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | |
| 3 | 生食 | 500 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | |
| | ダカルバジン | 1000 | mg/m ² | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | mg | 内服 | | ●(125) | ●(80) | | | | | |
| | デカドロン | 8 | mg | 内服 | | | ● | ● | | | | |