

| code | レジメン名 |
|-----------------------|---------------------------------|
| S010H | S-1 + CDDP |
| S020L | S-1+DTX (進行再発) |
| S030M | S-1 + CPT-11 |
| S040L | weekly PTX |
| S050H | CPT-11 + CDDP |
| S060M | biweekly CPT-11 |
| S070M | MTX + 5FU |
| S080M | CPT-11単剤 |
| S090H | XP + Trastuzumab(初回) |
| S091H | XP + Trastuzumab(2回目以降) |
| S100S | SOX + Trastuzumab (OX抜き)(初回) |
| S101S | SOX + Trastuzumab (OX抜き)(2回目以降) |
| S110L | nab-PTX |
| S120H | SP+Trastuzumab(初回) |
| S121H | SP+Trastuzumab(2回目以降) |
| S130M | 胃癌SOX |
| S140S | Ramucirumab |
| S150L | Ramucirumab+PTX |
| S160M | 胃癌XELOX |
| S170S | Nivolumab単剤(胃癌)(2W) |
| S171S | Nivolumab単剤(胃癌)(4W) |
| S180M | XELOX + Trastuzumab(初回) |
| S181M | XELOX + Trastuzumab(2回目以降) |
| S190L | Weekly nab-PTX |
| S200M | SOX + Trastuzumab (初回) |
| S201M | SOX + Trastuzumab (2回目以降) |
| S210M | mFOLFOX6(胃癌) |
| S220L | Ramucirumab+nab-PTX |
| S230L | S-1+DTX(術後補助) |
| S240M | Trastuzumab Deruxtecan(胃癌) |
| S250M | Nivolumab+SOX |
| S260M | Nivolumab+XELOX |

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 S-1+CDDP
 対象疾患名 進行胃癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 S010H

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|--------|-------|-------------------|------|------|
| シスプラチン | 60 | mg/m ² | 点滴 | 8 |
| S-1 | 80 | mg/m ² | 内服 | 1-21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投与周期 35日

休業

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1-7) | Day(8) | Day(9-10) | Day(11) | Day(12-21) | Day(22-35) | Day() | Day() |
|----|---------|----------------------|-------|----------------|----------|----------|------------|---------|------------|------------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| 2 | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| 3 | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50 mL | 点滴静注 | | | ● | | | | | | |
| | アロキシ | 0.75 mg | 点滴静注 | | | ● | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 mg | 点滴静注 | 15分 | | ● | | | | | | |
| 5 | シスプラチン | 60 mg/m ² | 点滴静注 | | | ● | | | | | | |
| | 生食 | 400 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| 6 | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | | | ● | | | | | | |
| | フロセミド | 20 mg | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| 7 | ソルデム3A | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| 8 | ソルデム3A | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | | | ● | | | | | |
| | ソルデム3A | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | | | ● | | | | | |
| | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | | | ● | | | | | |
| | S-1 | 80 mg/m ² | 内服 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | アブレピタント | 125/80 | | | | ●125 | ●80 | | | | | |
| | デカドロン | 8 mg | | | | | ● | ● | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 S050H

診療科
 レジメン名 CPT-11+CDDP
 対象疾患名 進行胃癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師 備考欄

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|--------|-------|-------------------|------|------|
| | イリノテカン | 70 | mg/m ² | 点滴 | 1,15 |
| | シスプラチン | 80 | mg/m ² | 点滴 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期 28日

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2) | Day(3) | Day(4) | Day(15) | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|---------|----------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | ● | | | | |
| 2 | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | | |
| 3 | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50 mL | 点滴静注 | | ● | | | | ● | | | | |
| | アロキシ | 0.75 mg | 点滴静注 | | ● | | | | ● | | | | |
| | デカドロン | 9.9 mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 mg | 点滴静注 | 15分 | | | | | ● | | | | |
| 5 | イリノテカン | 70 mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | ● | | | | |
| | 5%糖液 | 250 mL | 点滴静注 | 90分 | ● | | | | ● | | | | |
| 6 | シスプラチン | 80 mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | | | |
| | 生食 | 400 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | | |
| 7 | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | プリンペラン | 1 A | 点滴静注 | 2時間 | ● | ● | ● | | | | | | |
| 8 | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | ● | ● | | | | | | |
| 9 | ソルデム3A | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | ● | ● | | | | | | |
| | デカドロン | 8 mg | 内服 | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 mg | 内服 | | ●125 | ●80 | ●80 | | | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 S090H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 XP+Trastuzumab (初回)

対象疾患名 進行胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|-----------|-------|----------------------|------|------|
| | トラスツズマブBS | 8 | mg/kg | 点滴静注 | 1 |
| | シスプラチン | 60-80 | mg/m ² | 点滴静注 | 1 |
| | カベシタピン | 2000 | mg/m ² /日 | 内服 | 1-14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期 21日 休薬 7日

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2-3) | Day(4) | Day(5-14) | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|-----------|--------|----------------------|-------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | ● | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 2 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 3 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | アロキシ | 0.75 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 250 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | トラスツズマブBS | 8 | mg/kg | 点滴静注 | 90分 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | ● | | | | | | | |
| 6 | 生食 | 400 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | シスプラチン | 80 | mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | ● | | | | | | | |
| 7 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | フロセミド | 20 | mg | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 8 | ソルデム3A | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 9 | ソルデム3A | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | ソルデム3A | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | カベシタピン | 2000 | mg/m ² /日 | 内服 | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | デカドロン | 8 | mg | 内服 | | | ● | ● | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | | 内服 | | ●125 | ●80 | | | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 S091H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 XP+Trastuzumab(2回目以降)

対象疾患名 進行胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-----------|-------|----------------------|------|------|
| トラスツズマブBS | 6 | mg/kg | 点滴静注 | 1 |
| シスプラチン | 60-80 | mg/m ² | 点滴静注 | 1 |
| カペシタビン | 2000 | mg/m ² /日 | 内服 | 1-14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投与周期 21日

休薬 7日

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2-3) | Day(4) | Day(5-14) | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|-----------|--------|----------------------|-------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 2 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 3 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | アロキシ | 0.75 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 250 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | トラスツズマブBS | 6 | mg/kg | 点滴静注 | 90→30分 | ● | | | | | | | |
| | | | | | | ● | | | | | | | |
| 6 | 生食 | 400 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | シスプラチン | 80 | mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 7 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | フロセミド | 20 | mg | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 8 | ソルデム3A | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 9 | ソルデム3A | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | ソルデム3A | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | カペシタビン | 2000 | mg/m ² /日 | 内服 | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | デカドロン | 8 | mg | 内服 | | | ● | ● | | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | | 内服 | | ●125 | ●80 | | | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 S120H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 SP+Trastuzumab(初回)

対象疾患名 胃癌(Trastuzumab2-positive)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|-----------|--------|-------------------|------|---------|
| | S-1 | 80-120 | mg/m ² | 内服 | day1-14 |
| | シスプラチン | 60 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | トラスツズマブBS | 8 | mg/kg | | day1 |
| | | | | | |

投与周期 休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2-3) | Day(4) | Day(5-14) | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|-----------|--------|-------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 2 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 3 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | アロキシ | 0.75 | mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 250 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | トラスツズマブBS | 8 | mg/kg | 点滴静注 | 90分 | ● | | | | | | | |
| 6 | シスプラチン | 60 | mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | 生食 | 400 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 7 | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | フロセミド | 20 | mg | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 8 | ソルデム3A | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 9 | ソルデム3A | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | ソルデム3A | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | ソルラクト | 500 | mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | S-1 | 80-120 | mg/m ² | 内服 | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 | mg | 内服 | | ●125 | ●80 | | | | | | |
| | デカドロン | 8 | mg | 内服 | | | ● | ● | | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 S121H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 SP+Trastuzumab (2回目以降)

対象疾患名 胃癌 (Trastuzumab2-positive)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

| 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-----------|--------|-------------------|------|---------|
| S-1 | 80-120 | mg/m ² | 内服 | day1-14 |
| シスプラチン | 60 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| トラスツズマブBS | 6 | mg/kg | | day1 |
| | | | | |

投与周期 休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2-3) | Day(4) | Day(4-14) | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|-----------|--------------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 2 | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 3 | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50 mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | アロキシ | 0.75 mg | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 9.9 mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 250 mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | トラスツズマブBS | 6 mg/kg | 点滴静注 | 90→30分 | ● | | | | | | | |
| 6 | シスプラチン | 60 mg/m ² | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | 生食 | 400 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 7 | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | フロセミド | 20 mg | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 8 | ソルデム3A | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 9 | ソルデム3A | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | ● | | | | | | | |
| | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | ソルデム3A | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | ソルラクト | 500 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| | S-1 | 80-120 mg/m ² | 内服 | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | アプレピタント | 125/80 mg | 内服 | | ●125 | ●80 | | | | | | |
| | デカドロン | 8 mg | 内服 | | | ● | ● | | | | | |

レジメン記入フォーマット

診療科
 レジメン名 mFOLFOX6(胃癌)
 対象疾患名 進行再発胃癌
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|------|----------|-------|-------------------|------|--------|
| | レボホリナート | 200 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | オキサリプラチン | 85 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | 5FU | 400 | mg/m ² | 急速静注 | day1 |
| | 5FU | 2400 | mg/m ² | 持続点滴 | day1-2 |
| | | | | | |
| | | | | | |

投与周期

休薬

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2,3) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|-----|------------|--------|-------------------|-------|--------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 100 | mL | ポート | × | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | ポート | | ● | | | | | | | |
| | アロキシ | 0.75 | mg | ポート | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | ポート | 15分 | ● | | | | | | | |
| 3-1 | レボホリナート | 200 | mg/m ² | ポート | | ● | | | | | | | |
| | 5%糖液 | 250 | mL | ポート | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 3-2 | オキサリプラチン | 85 | mg/m ² | ポート | | ● | | | | | | | |
| | 5%糖液 | 250 | mL | ポート | 2時間 | ● | | | | | | | |
| 4 | 5FU | 400 | mg/m ² | ポート | | ● | | | | | | | |
| | 生食 | 50 | mL | ポート | 5分 | ● | | | | | | | |
| 5 | 5FU | 2400 | mg/m ² | ポート | | ● | ● | | | | | | |
| | ヘパリンナトリウム注 | 5000 | 単位 | ポート | | ● | ● | | | | | | |
| | 生食 | 合計で200 | mL | ポート | 4mL/h | ● | ● | | | | | | |

レジメン記入フォーマット

登録番号 S230L

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 S-1+DTX (術後補助)

対象疾患名 胃癌StageⅢ術後補助療法

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

| 治療内容 | 薬品名 | 標準投与量 | 単位 | 投与経路 | 投与日 |
|-----------|--------|-------|-------------------|------|---------|
| Cycle 1 | | | | | |
| | S-1 | 80 | mg/m ² | 内服 | day1-14 |
| Cycle 2-7 | | | | | |
| | ドセタキセル | 40 | mg/m ² | 点滴静注 | day1 |
| | S-1 | 80 | mg/m ² | 内服 | day1-14 |
| Cycle 8- | | | | | |
| | S-1 | 80 | mg/m ² | 内服 | day1-28 |

投与周期 21日 (Cycle 1-7)
42日 (Cycle 8-)

| Rp | 薬品名・規格 | 投与量 | 単位 | 投与ルート | 点滴時間 | Day(1) | Day(2-14) | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() | Day() |
|----|--------|-----|-------------------|-------|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 生食 | 100 | mL | 点滴静注 | × | ● | | | | | | | |
| 2 | 生食 | 50 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | デカドロン | 6.6 | mg | 点滴静注 | 15分 | ● | | | | | | | |
| 3 | 5%糖液 | 250 | mL | 点滴静注 | | ● | | | | | | | |
| | ドセタキセル | 40 | mg/m ² | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | | | | |
| | S-1 | 80 | mg/m ² | 内服 | | ● | ● | | | | | | |

